

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Cen 164.3









SCHON BRUNN'S

FLORA.

ODER

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICH-NISS DER IM KAIS. KÖNIGL. HOLLÄNDISCH-BOTANISCHEN HOFGARTEN ZU SCHÖN-BRUNN CULTIVIRTEN GEWÄCHSE

'Y O N

Jos. Boos,

k. k. Hofgartenassistenten.

WIEN and TRIEST,
im Verlag der Geistingerschen Buchhandlusg.

(CM)

on the second of the second of

Seiner Fürstlichen Gnaden dem hochgebornen Fürsten und Herrn

Ferdinand Fürsten zu Trauttmansdorff - Weinsberg und Neustadt am Kocher, gefürsteten Grafen von Umffenbach. Freyherrn auf Gleichenberg, Negau, Burgau etc. etc. Ritter des goldenen Vliesses. Grosskrenze des königl. Ungarischen St. Stephan - Ordens, der königl. Französischen Ehrenlegion, und des königl. Bayrischen Hubertus - Ordens, k. k. wirklichen geheimen Rathe, Kämmerer, Staats-und Conferenzminister; Obersten sämmtlicher kaiskönigl. Leibgarden, und Seiner kais.

königl. apost. Majestät

Erstem Obersthofmeister.

dem hohen Beförderer und Beschützer der Künste und Wissenschaften

seinem erhabenen Chef und Gönner in dankbarster Ehrfurcht

gewidmet

vom

Verfasser.

Kurze Vorerinnerung.

Es sind nun bereits zwey und sechzig Jahre verflossen, seit welchen der k. k. Holländisch - botanische Hofgarten gegründet ist. Jeder Botaniker und Kunstverständige weiß nur zu genau, als daß ich hier erst Erwähnung davon machen dürfte, wie derselbe von jener Zeit an bis auf heutigen Tag durch die besondere Aufmerksamkeit und Gnade unserer höchstseeligen Beherscher, und wie ganz vorzüglich derselbe durch den so allgemein bekannten Schutz und die

Unterstützung unseres jetztregierenden gnädigsten Kaisers, deren sich das Fach der Gartenkunst und Botanik erfreuet, mit den auserlesensten Pflanzenschätzen Indiens und Amerikas sowohl, als jenen vom Cap und den Inseln des Indischen Oceans bereichert wurde; wie er sich später durch Tausch mit den vorzüglichsten Gärten Deutschlands und anderer Länder immer mehr vervollkommte und erhob; und was für eine Auswahl an höchst seltenen und schönen Vegatabilien aller Art und aus allen Zonen und Ländern derselbe jetzt einschließt.

Doch wozu nützt dieser Reichthum diese Vollkommenheit eines Gartens, wenn die Kenntniss desselben nicht allgemein ist, wenn nicht Jedem, dem an ihr gelegen ist, ein Weg geöffnet wird ihr zu huldigen und seine Wissbegierde zu befriedigen?

Um zu diesem Zwecke leichter gelangen zu können, habe ich gegenwärtiges Verzeichnis aller mir bekazuten im hiesigen k. k. Hofgarten befindlichen inn und ausländischen Gartengewächse (in soferne jene nicht gar zu gemein sind) verfasst, und habe das srohe Bewusstseyn, den Verehrern dieses Hofgartens einen nicht ganz unbedeutenden Dienst geleistet zu haben.

In Rücksicht des Leitfadens bev Bearbeitung meines Verzeichnisses, bin ich dem Linneischen Systeme nach der Ausgabe C. H. Persoon's gefolgt; theils. weil es das neueste botanische Universalwerk ist, welches die meisten Berichtigungen enthält; theils, weil es sich doch jeder nur einigermassen bemittelte Kräuterkenner anschaffen, und die im Verzeichnisse enthaltenen Gewächse wenigstens in Persoon's Synopsis, in so ferne sie in dieser enthalten sind, aufsuchen und nachlesen kann. Aus dibsen-Grunden, und um das Aufsuchen zu erleichtern, habe ich bey jeder Pflanze den Band, und die Seite worin sie in erstgenanntem Werke beschrieben ist, angeführt. Nur solche bey welchen Persoon's Benennung offenbar irrig ist, benannte ich nach jenen Autoran die diese Irrungen zuerst berichtiget haben, und setzte, Persoon's Benennung als Synonym darum ter. Ganz neue Arten aber benammte ich nach jenen Autoren, die sie zuerst bekannt machten, — Soustabbe ich auch noch die vorzüglichsten Synonymen angegeben.

Was die Deutschen Benennungentder Gewächse, welche ich beygesetzet habe, anbelangt, bin ich größtentheils der Willdenow'schen Uebersetzung gefolgt. Bey den neuen aber, und solchen, die ich nirgends verdeutschet fand, war mein Bestreben immer dahin gerichtet, durch eine genaue und wörtliche Deutsche Uibersetzung die Herleitung des Lateinischen oder Griechischen Nahmens so viel als möglich auffallend zu machen.

Um das Volumen dieses Verzeichnisses sowohl, als dessen Preis, so viel es nur immer thunlich war, zu verringern, habe ich keine Beschreibungen beygefügt, (diess wäre auch nicht der Zweck eines Verzeichnisses) sondern nur kleine für Jeden interessante Angaben: der Deutschen Benennung, des

Vaterlandes, der Blüthezeit, des Standortes im hiesigen Hofgarten, und der Ausdauer.

Die Dauer und den Standort, welchen die Gewächse im k. k. Hofgarten einnehmen, habe ich durch folgende gewöhnliche Zeichen und Buchstaben ausgedrückt:

- Tür jährige Gewächse.
- ď zweyjährige -
- 24 perennirende -
- holzige
- W. H. Warmes Haus, Bey solchen, die über Winter beyläufig to 15 Grade ober Null nach Reaumur's Thermometer erfordern und auch den Sommer über im Gewächshause stehen bleiben.
- Ch. Caphaus, Beyjenen, die über Winter 5 10 Grade ober Null erfordern und den Sonmer über im Freyen stehen.
- K. H. Kaltes Haus. Bey solchen die in Winter 1 5 Grade oher Null verlangen und den

Sommer über gleichfalls im Freyen stehen.

Im F. Im Freyen. Bey jenen endlich welche das ganze Jahr hindurch im Freyen verbleiben.

Es befinden sich im hiesigen k. k. Hofgarten freylich noch viele, zum Theil sehr seltene Gewächse, die ich, da sie noch nicht geblüht haben, als noch unbeschriebene und gänzlich unbekannte leider nicht in mein Verzeichnifs aufnehmen konnte; ich behalte mir es aber ver, selbe zu einer anderen Zeit, wenn sie schon benennet seyn werden, im Nachtrage zu liefern, den ich über die bisher noch unbeschriebenen sobald als möglich heraus zu geben gedenke. Jene aber, von denen bloss die Species noch nicht benennet ist, setzte ich mit der Angahe ihres Vaterlandes an's Ende jener Gattung, zu welcher sie gehören, oder zu gehören doch scheinen.

Schönbrunn am 20, Aprill 1816.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

1. Canna, Blumenrohr.

- 1. C. variabilis. Willd. im Magaz. der Gesell. maturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 169. Veränderliehes Blumenrohr. In Carolina u. Florida. May — Jul. W. H. 24.
- C. indiea. Pers. syn. pl. 1. p. 1.

 a. rubra. Ait. hort. kew. 1. p. 1.
- 3. C. rubra. Willd. l. c. Rothblühendes Blumenrohr, In Westindien. May Jul. VV. H. 4. C. coccinea. Pers. I. c.
- indica y coccinea. Ait. l. c.
- 4. C. chinensis. Willd. l. c. p. 170. Chinesisches Blumenrehr. In Ostindien. May Jul. W. H. 4.
- C. indica. Pers. l. c.
- patens. Ait. l. c.

5. C. glauca. Pers. 1. c. Grangrünes Blumenrohr. In Sümpfen v. Carolina. May — July. W. H. 24.

2. Renealmia, Renealmie.

- 1. R. nutans. Willd. enum. 1. p. 3. Ueberhängende Renealmie. In China. Jun. Jul. WV. H. 24.
- 2. R. eresta. (Globbs erects. Redouté plantes liliac. 3. t. 173.) Aufrechtstehende Renealmie. In Ostindien. —, W. H. 4.
- 3. R. calcarata. Andrew. bot. reposit. t. 421. Gespornte Renealmie. In Ostindien. Septemb. W. H. 半. R. angustifolia. Hortulan.

3. Amomum, Ingwer.

- 1. A. Zingiber. Pers. l. c. 1. p. 2. Aechter Ingwer. In Ostindien und Jamaica, Sept. Oct. W. H. 21.
- 2. A. Zerambet. Pers. 1. c. Block-Ingwer. In Ostindien. Sept. Oct. W. H. 4.

4. Hedychium, Kranzblume,

1. H. coronarium. Pers. 1. c. Schöne Kranzblume. In Ostindien u. Java. Jul. — Sept. VV. H. 4.

5. Costus, Costwurz.

1. C. speciosus. Pers. l. c. 1. p. 3. Schöse Costwurz. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. 21. C. arabicus. Jacq. ic. rar. 1. t. 1.

6. Alpinia, Alpinie.

1. A. spiralis. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 1, Spiralformige Alpinie. Zu Caracas. Jul. Aug. VV. H. 4.

7. Maranta, Marante.

- 1. M. arundinacea. Pers. l. c. Rohrartige Marante. In Jamaica u. Brasilien. May Jul. W. H. 4.
- 2. M. lutea. Jacq. ic. rar, 2. t, 201. Gelbblühende Marante. Zu Caracas in feuchten Wäldern. May — Sept. W. H. 4.

8. Curcuma, Curcume.

1. C. longa. Pers. l. c. 1. p. 4. Lange Curcume. In Ostindien. May, Jun. W. H. 2.

9. Kaempferia, Kaempferie.

- 1. K. Galanga. Pers. 1. c. Sitzende Kämpferie. In Ostindien. May. W. H. 4.
- 2. K. angustifolia. Donn catalog. cantabrig. p. 1. Schmalblättrige Kämpferie. In Ostindien. —. W. H. 4.
- 3. K. rotunda. Pers. l. c. Gestielte Kämpferie. In Ostindien. May, Jun. W. H. 4. K. longa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 37. t. 317.

10. Thalia, Thalie.

1. Th. cannaeformis, Pers. 1. c. Rohrartige.
Thalie. In Ostindien u. Südamerica. May
Jul. W. H. 4.

11. Lopezia, Lopezie.

- 1. L. mexicana. Willd. sp. pl. 1. p. 18. Mexicanische Lopezie. In Mexico. May — Jul. VV. H. 21.
- L. racemosa. Pers. l. c.
- 2. L. hirsuta. Jacq. collect. suppl. p. 3. t. 15. f. 4. Rauhhaarige Lopezie. In Mexico. May Jul. VV. H. 4. L. racemosa & hirsuta. Pers. l. c.
- 3. L. fruticosa. Catalog. monach. p. 31. Strauchartige Lopezie. In Mexico? Jun. Jul. VV. H. h.

12. Salicornia, Glasschmalz.

- 1. S. herbacea. Pers. l, c. 1. p. 5. Krautartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. u. Virginien. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. S. fruticosa. Pers. 1. c. Strauchartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. Jun. Jul. K. H. b.

DIGYNIA.

13. Blitum, Erdbeerspinat.

- 1. B. capitatum. Pers. l. c. 1. p. 6. Achrentragender Erdbeerspinat. In Eur. hesonders in Tyrol u. der Schweiz! Jun. Jul. Im F. O.
- 2. B. virgatum. Pers. 1. c. Gemeiner Erdbeerspinat. In Deutschl. Spanien, Frankr. u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. O.

CLASSIS. II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

14. Jasminum, Jasmin.

1. J. Sambat. Pers. l. c. 1. p. 7. Arabischer Jasmin. In Ostindien. Blüht das ganze Jahr hindurch. W. H. h.

β. fl. pleno. Mit gefüllter Blüthe.

- 7. undulatum. Willd. enum. 1. p. 9. Mit wellenförmigen Blättern. J. undulatum. Pers. 1. c.
- 2. J. pubescens. Pers. l. c. Weichhaariger Jasmin. Zu Calcutta. —. W. H. 5.
- 3. J. gracile. Andrews bot. reposit. t. 127. Schlanker Jasmin. Auf der Insel Nordfolk. Jun.

 Aug. VV. H. 5.
 J. volubile. Jacq. hort. schoenbr. 3, p. 39. t. 321.
- 4. J. glaucum. Pers. l. c. Graugrüner Jasmin. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
- 5. J. tortuosum. VVilld. enum. 1. p. 10. Gedrehter Jasmin. In Ostindien. Jul. VV. H. 5.
 J. flexile. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 46. t. 430.
- 6. J. flexile. Pers. 1. c. 1. p. 8. Biegsamer Jasmin. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. 5.
- 7. J. azorieum. Pers. l. c. Azorischer Jasmin. Auf den Azorischen Inseln. May — Jul. Ch. 5.
- 8. J. fruticans. Pers. 1. c. Strauchartiger Jasmin. In Südeur. u. im Orient. May, Jun. Im F. ‡.

- 9. J. humile. Pers. 1. c. Niedriger Jasmin.
 -. May, Jun. Im F. 5.
- 10. J. odoratissimum. Pers. l. c. Wohlriechender Jasmin. Auf Madera. May — Aug. K. H. 5.
- 11. J. officinale. Pers. l. c. Gemeiner Jasmin. In Südenr. u. Ostindien. May — Aug. Im F. 5.
 - 19. J. grandiflorum. Pers. l. c. Großblühender Jasmin. In Ostindien. May Aug. Ch. 5.
 - 15. Ligustrum, Rainweide.
 - 1. L. vulgare. Pers. 1. c. Gemeine Rainweide. Auf sandigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. 5.
 - 6. Phillyrea, Steinlinde.
 - 1. Ph. media. Pers. I. c. Mittlere Steinlinde. In Sudeth. Jun. Jul. K. H. 7.
 - 2. Ph. angustifolia. Pers. 1. c. Schmalblättrige Steinlinde. In Portugall, Spanien u. Italien. Jun. Jul. K. H. 5.
 - 3. Ph. latifolia. Pers. 1. c. Breitblättrige Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.
 - 4. Ph. laevis. Willd. enum. 1. p. 12. Glatte Steinlinde. In Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. 5.
 - 17. Olea, Oelbaum.
 - 1. O. europaea. Pers. l. c. Gemeiner Oelbaum. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. 5.
 - 2. O. exasperata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 1. t. 251. Warziger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. h.

- 3. O. capensis. Pers. 1. c. Capischer Oelbaum. Am Cap. —. Ch. 5.
- 4. O. undulata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 2. Wellenblättriger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. 5.
- 5. O. americana. Pers. I. c. 1. p. 9. Americanischer Oelbaum. In Carolina. Jun. Jul. K. H. 5.
- 6. O. excelsa. Pers. 1. c. Hoher Oelbaum. Auf Madera. -. Ch. 5.
- 7. O. fragrans. Pers. 1. c. Wohlriechender Oelbaum. In Cochinchina, China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 5.
 - 8. Eine noch unbeschriebene Art.
 - 18. Chionanthus, Schneeblume.
- 1. Ch. virginica. Pers. l. c. Virginische Schneeblume. Von Pensylvan. bis Carolina. Jun. Jul. Im F. 5.
 - 19. Syringa, Flieder.
- 1. S. vulgaris. Pers. l. c. Gemeiner Flieder. In Persien. May. Im F. 9.
- 2. S. chinensis. Willd. arb. berol. p. 378. Chinesischer Flieder. In China. May. Im F. 5. S. dubia. Pers. l. c.
- 3. S. persica. Pers. 1. c. Persischer Flieder. In Persien. May. Im F. 7. B. laciniata. Mit zerschlitzten Blättern.
 - 20. Fontanesia, Fontanesie.
 - 1. F. phillyreoides. Pers. l. c. 1. p. 10. Stein-

23. Utricularia, Wasserschlauch.

1. U. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 18. Gemeiner Wasserschlauch. In stehenden Wassern v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehalter. 24.

24. Justicia, Justicie,

- 1. J. assargens. Pers. l. c. 1. p. 19. Aufsteigende Justicie. In Jamaica u. St. Crux. May Aug. VV. H. 5.
- 2. J. Echolium. Pers. l. c. 1. p. 20. Grünblühende Justicie. In Arabien, Malabar u. Ceylon, Jun. Jul. W. H. 5.
- 3. J. coccinea. Pers. l. c. Scharlachrothe Justicie. Zu Cayenne. Jun. Jul. VV. H. 5.
- 4. J. pulcherrima. Peri l. c. Prächtige Justicie. Im wärmeren Amer. Jun. Aug. W. H. 5.
- 5. J. oristate, Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 38. t. 320. Gekämmte Justicie. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. 5.
- 6. J. lucida. Vahl. enum. 2. p. 400. Glänzende Justicie. In Westindien. Aug. W. H. 5.
- 7. J. formosa. Jacq. eclog. ineditae. Schöne Justicie. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. h.
- 8. J. Gendarussa. Pers. 1. c. Weidenblättrige Justicie. Auf Ceylon, Java u. Malabar. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. 5.
- 9. J. nasuta. Pers. l. c. Schnabelförmige Justicie. In Ostindien. Jun. Aug. W. H. 5.
- 10. J. ciliaris. Pers. l. c. 1, p. 21, Gefranzte Justicie. In Peru, Jun, Jul, VV. H. O.

- 11. J. bracteolata. Pers. l. c. Mennigrothe Justicie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.
- 12. J. lithospermifolia. Pers. l. c. Steinsamenblättrige Justicie. —. Jun. — Aug. W. H. 5.
- 13. J. Adhatoda. Pers. l. c. 1. p. 22. Treibende Justicie. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. Jul. K. H. 5.
- 14. J. farcata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 2. t. 3. Zweyzackige Justicie. Zu Lima. Jun. Jul. W. H. 5. J. peruviana. Pers. l. c. 1. p. 22.
- 15. J. orchioides. Pers. l. c. Ragwurzartige Justicie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
- 16. J. microphylla, Pers. l. c. Kleinblättrige Justicie. Auf St. Crux. Jul. Aug. W. H. 5.
- 17. J. quadrifida. Vahl. enum. 1. p. 12. Viertheilige Justicie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 5.
 J. superba Hortulan.

25. Stachytarpheta, Fettähre.

- 1. St. jamaicensis. Pers. 1. c. 2. p. 139. Jamaikische Fettähre. Auf den Caraibischen Inseln u. zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. 24. Verbena jamaicensis. Jacq. obs. 4. t. 85.
- 2. St. mutabilis. Pers. l. c. 2. p. 140. Veränderliche Fettähre. In Südamer. Jul. Aug. 5. Verbena mutabilis. Jacq. ic. rar. 2. t. 207. Collect. 2. p. 334.
 - 26. Lycopus, Zigeunerkraut.
 - 1. L. europaeus. Lin. sp. pl. p. 30. Ge-

meines Zigeunerkraut. An feuchten Stellen in Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24. L. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 24.

27. Monarda, Monarde.

- 1. M. fistulosa. Pers. l. c. Purpurfarbige Mon-
- 2. M. oblongata. Pers. l. c. Langblättrige Monarde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. M. didyma. Pers. 1. c. Scharlachrothe Monarde. In Pensylvanien u. Florida. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 4. M. rugosa. Pers. 1. c. Weisse Monarde In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. M. clinopodia. Pers. l. c. Fleischfarbige Monarde. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 2.

28. Rosmarinus, Rosmarin.

1. R. officinalis. Pers. l. c. Gemeiner Rosmarin. Auf Hügeln in Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. 5.

29. Ziziphora, Zizikraut.

1. Z. dasyantha Bieberst. flor. taur. caucas.
1. p. 18. Rauhblumiges Zizikraut. Am Caucasus auf Bergen, Jun. Jul. Im F. 5.

30. Salvia, Salbey.

- 1. S. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 25. Gemeine Salbey. In Südeur, Jun. Jul. Im F. 5.
 - e. S. triloba, Lin. suppl. 88. Dreylappige

Salbey. Im Griechischen Archipelagus. Jun. Jul. K. H. 5.
S. Clusii, Pers. 1. c.

- 3. S. Chamaedrys. Willd. hort. berolin. 1. p. eg. t. 29. Gamanderblättrige Salbey. In Mexico. Sept. Oct. Ch. 5.
 S. chamaedryoides. Pers. l. c.
- 4. S. Horminum. Pers. l. c. 1. p. 26. Schar-lach-Salbey. In Griechenland u. Apulien. Jun. Jul. K. H. O.
- 5. S. oblongata. Vahl. enum. 1. p. 256. Länglichte Salbey. —. May. Im F. 24. S. micrantha. Desfont. hort. paris. p. 57.
- 6. S. austriaca, Pers. 1. c. Oesterreichische Salbey. In Oesterr, Ungarn u. der Moldau auf trockenen Heiden, Jun. Jul. 1m F. 24.
- 7. S. disermas. Pers. 1. c. Zottige Salbey, In Syrien. Jun. Jul. K. H. 2.
- 8. S. mexicana. Pers. l. c. 1. p. 27. Mexicanische Salbey. An feuchten Stellen in Mexico. Jun. Jul. Ch. 5.
- 9. S. Boosians. Jacq. eclog. pl. rar. fasc. 5. p. 69. n. 47. Boosische Salbey. In Peru auf Niederalpen. Bl. das ganze Jahr hindurch. VV. H. 15. S. Boosii. Trattinnick. observ. bot. fasc. 2. p. 58. n. 92.
 - 10. S. amarissima. Vahl enum. 1. p. 241. Bittere Salbey. In Mexico. Sept. — Dec. Ch. 3.
 - 11. S. reptans. Jacq. hort, schoenbr. 3 p. 38. t. 319. Auslaufende Salbey. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 2.
 - S. angustifolia. Vahl enum. 1. p. 253.
 - virgata. Qrtega. dec. 3.

- 12. S. formota. Willd. sp. pl. 1. p. 140. Prächtige Salbey. In Peru. Jul. Aug. Ch. 5. S. nodosa. Pers. l. c.
- 13. S. caccinea. Pers. l. c. Scharlachrothe Salbey. Neben Flüssen in Florida, Jul. Aug. Ch. 5.
- 14. S. hispanica. Pers. l. c. Spanische Salbey. In Span. u. Ital. Jul. Aug. Im. F. O.
- 15. S. glutinosa. Pers. l. c. 1. p. 28. Gelbe Salbey. Auf lehmigem Grunde in Eur. Jul. Aug. Im F. 24.
- 16. S. canariensis. Pers. l. c. Canarische Salbey. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. 5.
- 17. S. aurea. Pers. 1. c. Goldfarbige Salbey. Neben Flüssen am Cap. Jun. Ch. 5.
- 18. S. Sclarea. Pers. l. c. Muscateller Salbey. In Italien u. Syrien. Jun. Aug. Im F. J. B. caucasica. Muscateller Salbey vom Caucasus.
- 19. S. Aethiopis. Pers. 1. c. Ungarische Salbey. In Oesterr. Illyrien, Frankr. u. Africa auf Heiden. Jun. Jul. Im F. J.
- 20. S. blealor. Pers. l. c. 1. p. 29. Zwey-farbige Salbey. Bey Tanger in Africa. Jun. Jul. Ch. d'.
- 21. S. habliziana. Pers. 1. c. Hablizelsche Salbey. In Taurien. Jun. Jul. Ch. 24. S. scabiosaefolia. Lam. in diar. hist. nat. 2. p. 44. t. 27.
- 22. S. interrupta. Pers. 1. c. Unterbrochengesiederte Salbey. In der Barbarey. Jan. Jul. K. H. 5.

- 23. S. ceratophylla. Pers. 1. c. Schlitzblättige Salbey. In Syrien u. Persien, Jun. Jul. K. H. J.
- S. exasperai. Cav. ic. 6. p. 38 39. t. 558.
- 24. S. ceratophylloides. Pers. 1. c. Halbgefiederte Salbey. In Sizilien u. Aegypten, Jun. Jul. K. H. J.
- 25. S. Forskaelel. Pers. l. c. Forskälische Salbey. Im Orient. Jun. Aug. K. H. 4.
- 26. S. nutans. Pers. 1. c. Hängende Salbey. In Ungarn u. Rufsland. Jul. Aug. Im F. 24.

31. Collinsonia, Collinsonie.

1. C. canadensis. Pers. 1. c. Canadische Collinsonie. In schattigen Wäldern Virginiens u. Canadas. Jun. Jul. fm F. 24.

TRIGYNIA.

32. Piper, Pfeffer.

- 1. P. nigrum? Pers. l. c. 1. p. 31. Schwarzer Pfeffer. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. 5.
- 2. P. medium. Pers. l. c. Mittlerer Pfesser. Auf den Caraibischen Inseln, Jun. Jul. W. H. 5
- 3. P. decumanum. Pers. l. c. Herzblättriger Pfeffer. Auf Martinique u. zu Caracas. Jul. Aug. VV. H. h.
 P. marginatum. Jacq. collect. 4. p. 128. Jc. rar.
 2. t. 215.
- 4. P. prunifolium. Jacq. eclog. ined. Pflaumenblättriger. Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. VV. H. h.

- 5. P. flexuosum. Jaoq. eclog. ined. Gebogemer Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. VV. H. 5.
- 6. P. aduncum. Pers, l. c. 1. p. 32. Krummer Pfeffer. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. b.
- 7. P. Bredemeyeri, Jacq. eclog. ined. Bredemeyerscher Pfeffer. In Caracas. Jun. Aug. W. H. h.

P. rugosum. Bredemeyer mscrpt.

- 8. P. glaucescens, Jacq. eclog. fasc. 8. p. 112. n. 76. Graugrüner Pfeffer —. Bl. den ganzen Sommer hindurch, VV. H. †.
- 9. P. verrucosum. Pers. l. c. Warziger Pseffer. In Jamaica u. Gujana, Jun. Jul. VV. H. t.,
- 10. P. blandum. Pers. l. c. 1. p. 33. Geschmackloser Pfeffer. Zu Oaracas. Aug. Oct. W. H. 24.
- 11. P. magholiaefolium. Jacq. ic. rar. 2. t. 213. Collect. 3. p. 210. Magnolienblättriger Pfeffer. Auf Felsen zu Caracas. Jun. Aug. W. H. b.
- 12. P. obtusifolium. Pers. 1. c. Stumpfblättriger Pfeffer. In Westindien. Jun. Jul. W. H. t. P. clusiaefolium. Jacq. collect. 3. p. 209. Icon. far. 2. t. 412.
- 13. P. cancifolium. Jacq. ic. rar. 2. t. 214. Collect. 4. p. 127. Keilblättriger Pfeffer. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.
- 14. P. umbellatum Pers. 1. c. 1. p. 34 Doldenblüthiger Pfeffer, In Westindien. Jul. Aug. VV. H. b.
 - 15. P. pereskiaefolium Pers. l. c. Pereskien-

blättriger Pfeffer. Auf Venezuela. Jul. Aug. W. H. 24.

- 16. P. polystachyon Pers. 1. c. Vielähriger Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. Aug. W. H. 24.
- 17. P. verticillatum Pers. 1. c. Quirlblättriger Pfeffer, In Jamaica, Jul. Aug. W. H. 4.
- 18. P. pulchellum Pers. 1. c. Schöner Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 4.
- 19. P. inaequalifolium Pers. 1. c. Ungleichblättriger Pfeffer. Zu Limá. —. W. H. 4. P. anisatum. Hort. paris.

CLASSIS. III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

33. Boerhaavia, Boerhaavie,

- 1. B. diffusa Pers. 1. c. 1. p. 36. Verwirrtästige Boerhaavie. In Jamaica u. Veracrux. Jun. Jul. W. H. O.
- 2. B. hirsuta, Willd. phytog. 1. n. 3. Haarige Boerhaavie. In Jamaica. Jun. Jul., W. H. t. B. diffusa β hirsuta. Pers. I. c.
- 3. B. scandens Pers. l. c. Kletternde Boerhaavie. In Westindien. Jun. Jul. W. H. .
- 4. B. excelsa Pers. 1. c. Hohe Boerhaavie.

 —. May Sept. W. H. 5.

- 3. G. cardinalis. Curt. bot. mag. 135. prächtige Siegwurz. —. Ch. 4.
- 4. G. carneus. Pers. 1. c. Fleischfarbige Sieg-wurz. Apr. May. Ch. 4.
- 5. G. Merianus. Thunb. diss. n. 12. Große Siegwurz. Apr. May. Ch. 4. Watson, Meriana. Pers. I. c. 1. p. 42.
- 6. G. roseus. Jacq. icon. rar. 2.t. 261 Collect. suppl. p. 22. Rosenrothe Siegwurz. Apr. May. Ch. 4.
 Watsonia amoena. Pers. l. c. 1. p. 43.
- 7. G. tanellus. Pers. l. c. 1 p. 44. Zarte Siegwurz. May. Jun. Ch. 4.
- . 8. G. plicatus. Pers. 1. c. Gefaltene Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
- 9. G. albidus. Peri. l. c. 1. p. 45. Weissliche Siegwurz. Apr. Jun. Ch. 4.
- 10. G. cuspidatas. Pers. l. c. Zugespitzte Siegwurz. May, Jun. Ch. 4.
- 11. G. crispus. Pers. l. c. Krause Siegwurz. May. Jun. Ch. 4.
- 12. G. tubiflorus. Pers, l. c. Langröhrige Sieg-wurz. May, Jun. Ch. 4.
- 13. G. longiflorus. Pers. l. c. 1. p. 46. Langblüthige Siegwurz. May, Jun. Ch. 4. Ixia longiflora Ait. hort. kew 1. p. 58.
- 14. G. gramineus Pers. l. c. Grasartige Sieg-wurz. May, Jun. Ch. 4.

40. Ixia, Ixie.

- 1. I. ochroleuca. Pers. I. c. Grünlichweiße Ixie. Wächst sammt den meisten ubrigen am Cap. Apr; May. Ch. 4.
- 2. I. Bulbocodium, Pers. l. c. Europäische Ixie. Am Mittelländischen Meere. Apr. K. H. 24.
- 3. I. cruciata. Pers. l. c. 1. p. 47. Kreuzblättrige Ixie. May. Ch. 24.
- 4. I. heterophylla. Pers. 1. c. Verschiedenblättrige Ixie. May. Jun. Ch. 24. Galaxia plicata. Jacq. ic. rar. s. t. sg1. Collect. suppl. 30.
- 5. I. incarnata. Pers. l. c. Fleischfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 4.
- 6. I. angusta, Pers. 1. c. Schmale Ixie. May, Jun. Ch. 24.
- 7. I. leucantha. Pers. 1. c. 1. p. 48. Weisse Ixie. May, Jun. Ch. 4.
- 8. 1. erecta. Thunb. diss. n. 18. Aufrechte Ixie. May, Inn. Ch. 24. I. polystachya. Pers. 1. c.
- 9. I. maculata. Pers. l. c. Gefleckte Ixie. May, Jun. Ch. 2.
- 10. I. crocata Thunb. diss. n. 20 Safranfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 24. Gladiol. crocatus. Pers. l. c. 1. p. 44.
 - 11. I. deusta Pers. I. c. Verbrannte Ixie. May, Jnn. Ch. 2.
 - 12. I. miniata. Jacq. hort, schoenbr. 1. p. 10 t. 24. Mennigrothe Ixie. May, Jun. Ch. 4.

- 13. I. hyalina. Lin. suppl. 91. Darchscheimende Ixie. Apr. May. Ch. 24. Gladiolus hyalinus. Pers. l. c. 1. p. 44. Ixia fenestrata. Jacq. ic. rar. 2. 4. t. 289. Collect. 3. p. 270.
- 14. I. coerulescens. Pers. l. c. 1. p. 48 Weissblaue Ixie. May, Jun. Ch. 24. Ixia villosa. Ait. hort. kw. 1. p. 58.
- 15. I. rubro-cyanea. Jacq. ic. rar. 2. t. 485. Collect. 3. p. 469. Bunte Ixie. Apr. May. Ch. 24. J. cyanea Pers. l. c.
- 16. I. punicea. Pers. l. c. Dunkelrothe Ixie. Apr. May. Ch. 24.
- 17. I. bulbifera. Pers. l. c. 1. p. 49. Zwiebeltragende Ixie. Apr. Jun. Ch. 24.

41. Moraea, Moräa.

- 1. M. longifolia. Pers. l. c. Langblättrige Moraa. Am Cap. May, Jun. Ch. 24. Moraea flexuosa. Lin. suppl. 100. Ixia longifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 47.1.90.
- 2. M. elegans. Pers. l. c. Schöne Moräa. Am Cap. May, Jun. Ch. 4. Sisyrinchium elegans. Jacq. hort. schönbr. 1. p. 6. t. 12.
- 3. M. Northiana. Schneev. ic, t. 41 42. Northische Moräa. In Brasilien. May Jul. W. H. 24. Iris. Northiana. Pers. I. c. 1. p. 52.
 - 4. M. Iridioides. Lin. mant. 28. Schwertelartige Moraa. Im Orient. Apr. — Aug. Ch. 24. Iris orientalis. Pers. 1. c.

5. M. chinensis. Thunb. jap. 34. Bante Moraa. In China, Japan u. Ostindien. Jun. — Ang. Ch. 4. Ixia chinensis. Pers. l. c. 1. p. 48.

42. Iris, Schwertel.

- 1. 1. pumila. Pers. l. c. 1. p. 50. Niedriges Schwertel. Auf Hügeln in Oesterr. Deutschl. Frankreich. März, Apr. 1m F. 24.
- a. I. susiana. Pers. l. c. 1. p. 51. Prächtiger Schwertel. Im Orient. May. K. H. 4.
- 3. I. florentina. Pers. 1. c. Florentinischer Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.
- 4. I. squalens. Pers. l. c. Gelbbunter Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.
- 5. I. Swertii. Pers. l. c. Schwertischer Schwertel. Jun. Im F. 24.
- 6. I. hungarica VValdstein et Kitaib. pl. rar. hung. 3. p. 251 t. 226. Ungarischer Schwertel. In Ungarn, May. 1m F. 4. I. bohemica. Schmidt fl. bohem. cent. 4.
- 7. I. sambucina. Pers. 1. c. Hollunder-Schwertel. In Südeur. May, Jnn. Im F. 4.
- 8. I. germanica: Pers. 1. c. Dentscher Schwertel. In Südeur. May, Jan. Im F. 4.
- 9. I. pallida. Lam. encycl. 3. p. 282. Blasblaner Schwertel. Im Orient? Jun. Jul. Im F. 24. I. pallide coerulea. Pers 1. c. I. odoratissima. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 5. t. 9.
 - 10, I. Xiphium. Pers l. c. 1. p. 52. Spanischer

Schwertel. In Spanien, Portug. u. Sibirien, May, Jun. Im F. 24.

1. variabilis. Jacq. collect. 2. p. 321.

11. I Pseud-Acorus. Pers. 1. c. Wasser-Schwertel. In Sumpfen v. Eur. May, Jun. Im F. 4.

12. I. foetida. Pers. l. c. Stinkender Schwertel. In Engl. Toscan. u. Frankr. May. Jun. Im F. 24.

13. I. virginica. Pers.l. c. Virginischer Schwertel. In Virgin. May — Jul. Im F. 4.

14. I. halophila. Pers. 1. c. Salz-Schwertel. Aufsalzigem Boden in Sibirien. May, Jun. Im. F. 24.

15. I. ochroleuca. Pers. l. c. Weissgelber Schwertel. Im Orient. May, Jun. Im F. 24.

16. 1. persica. Pers. 1. c. 1. p. 53. Persischer Schwertel. In Persien. Apr. K. H. 4.

17. I. graminea. Pers. l. c. Grasblättriger Schwertel. In Oesterr. auf sumpligen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 4,

18. I. spuria, Pers. l. c. Bastard-Schwertel. In Ungarn, Deutschl. Frankr. u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 2.

19. I. Guldenstaedtii. Lepech. act. petrop. 1781. 1. p. 292. t. 8. Guldenstädtischer Schwertel. In Sibirien. May. Im F. 24.

20. I. sibirica. Lin. sp. pl. 57. Wald-Schwertel. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. May — Jul. Im F. 24. I. pratensis. Pers. l. c.

43. Commelina, Commeline.

- 1. C. erecta. Pers. l. c. 1. p. 55. Aufrechte Commeline. In Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.
- 2. C. africana. Pers. l. c. Africanische Commeline. In Aethiopien. Jun. Jul. K. H. 4.
- 3. C. tuberosa. Lin. sp. pl. 61. Knollige Commeline. In Mexico. Jul. Aug. K. H. 4.
- 4. C. coelestis. Willd. enum. 1. p. 69. Himmlische Commeline. —. Jul. Aug. W. H. 24.

44. Killingia, Killingie.

1. K. triceps. Lin. suppl. 104. Dreyköpfige Killingie. An feuchten Stellen in Ostind. u. Amer. Jun. Jul. W. H. 24. K. nivea. Pers. l. c. 1. p. 57.

45. Cyperus, Cyperngras.

- 1. C. articulatus. Pers. h. c. 1. p. 60. Gegliedertes Cyperngras. Im wärmer. Amer. —.W. H. 24.
- 2. C. esculentus. Pers, l. c. 1. p. 63. Esbares Cyperngras. (Erdmandel). In Ital. Südírankr. Span. u. im Orient. Jul. Aug. Im F. 24.
- 3. C. Papyrus. Pers. I. c. 1. p. 64. Papier-Cyperngras. In Flüssen v. Calabrien, Sicil. Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. K. H. 4.
- 4. C. alternifolius. Pers. l. c. 1. p. 65. Wechselblättriges Cyperngras. Auf Madagascar. Jun. Jul. W. H. 4.
- 5. Eine noch unbeschriebene Art, welche am Cap zu Hause ist.

DIGYNIA.

46. Phalaris, Glanzgras.

- 1. Ph. arundinacea. Pers. l. c. 1. p. 78. Rohrartiges Glanzgras. Am Wasser in Eur. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. 24.
 Arundo colorata. Ait. hort. kew. 1. p. 116.
- 2. Ph. canariensis. Pers. l. c. Canarisches Glanzgras, Auf den Canarischen Ins. Aug. Im F. O.

47. Panicum, Fennich.

- 1. P. plicatum. Pers. l. c. 1. p. 82. Gefalteter Fennich. Auf der St. Moritzinsel. May Jul. VV. H. 24.
- e. P. maximum. Pers. 1. c. 1. p. 83. Großer Fennich. Auf der Ins. Guadelonpe. —. W. H. 4.

48. Ceresia, Ceresie.

1. C. elegans. Pers. l. c. 1. p. 85. Schöne Ceresie. In Peru. —. VV. H. 4. Paspalum membranaceum. Lamarck ill. gen. p. 177. 4. 43. f. 2.

49. Eleusine, Eleusine.

1. E. domingensis. Pers. I. c. 1. p. 87. Domingische Eleusine. In St. Domingo. Jun. — Aug. VV. H. 24. Cynosurus domingensis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Misc. 2. p. 363.

50. Chloris, Chloris.

1. Ch. petraea. Pers. 1. c. Felsen Chloris. Auf

Kalkfelsen in Georgien, Florida, Jamaica u. am Cap. Sept. — März. Ch. 24.

2. Ch. radiata. Pers. l. c. 1. p. 88. Gestrahlte Chloris. In Westind. Jun. — Aug. VV. H. O.

51. Arundo, Rohr.

- 1. M. Donax. Pers. l. c. 1. p. 102. Breitblättriges Rohr. In Span. Frankr. der Schweiz, Krain u. Siebenburg. — Im F. 24. B versicolor. Mit bunten Blättern.
- 2. A. Phragmites. Pers. 1. c. Gemeines Rohr. In Seen u. Flüssen v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.
- 3. A. speciosa. Schrad. fl. germ. 1. p. 219. Schönes Rohr. Auf Alpen in der Schweiz, Kraim u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 2.
 A. Calamagrostis. Pers. 1. c.

52. Saccharum, Zuckerrohr.

- 1. S. officinarum. Pers. 1. c. Aechtes Zuckerrohr. In beyden Indien. —. W. H. 4.
- 2. S. Revennae. Pers. l. c. 1. p. 103. Ravenna Zuckerrohr. In Ital. K. H. 24.

53. Erianthus, Wollblume,

1. E. saccharoides. Mich. fl. amer. bor. 1.
p. 55. Zuckerrohrartige Wollblume. An feuchten
Stellen in Carolina. Jun. Jul. K. H. 24.
Saccharum giganteum. Pers. 1: c.
argenteum. Brouss.

54. Andropogon, Bartgras.

1. A. Schoenanthus. Pers. l. c. 1. p. 104. Wohlriechendes Bartgras. In Arab. u. Ostind. —. VV. H. 24.

A. citriodorum Hortulan.

CLASSISIV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

55. Protea, Silberbaum.

- n. 1. P. rosacca. Pers. l. c. 1. p. 114. Rosenartiger Silberbaum. Am Cap wie alle folgenden.

 —. Ch. th.

 P. hana. Thunb. prod. 26.
- 2. P. torta. Pers. 1. c. Gedrehter Silberbaum. Jul. Ch. h.
- 3. P. vinerea. Pers. l. c. 1. p. 115. Grauer Silberbaum. -. Ch. 5.
- 4. P. emarginata Hort. paris. Ausgerandeter Silberbaum. —. Ch. h.
- 5. P. mellifera. Pers. 1. c. Zucker-Silberbaum. - Ch. 5.
- 6. P. conifera. Pers. l. c. Zapfentragender Silberbaum. Jul. Aug. Ch. p.
- 7. P. Levisanus. Pers. l. c. Quendelblättriger Silberbaum. Aug. Sept. Ch. 5.

- 8. P. sericea. Pers. 1. c. Seidenartiger Silberbaum. -. Ch. 5.
- 9. P. saligna. Pers. 1. c. Weidenblättriger Silberhaum. Jul. Sept. Ch. 3.
- 10. P. argentea. Pers. 1. c. Aechter Silberbaum. —. Ch. 5.
- 11. P. speciosa B nigra. Pers. l. c. Prächtiger Silberbaum m. schwarzen Kelchschuppen. —. Ch. h.
- 12. P. cynaroides. Pers. l. c. 1. p. 116. Großköpfiger Silberbaum. -. Ch. h.

56. Banksia, Banksie.

- 1. B. serrata. Pers. l. c. Sägeblättrige Banksie. Wächst in Neuholland, wie alle übrigen Arten dieser Gattung. -. Ch. h.
- 2. B. praemorsa. Pers. 1. c. !Abgebissene Banksie. —. Ch. h.
- 3. B. microstachya. Pers. l. c. Kleinährige Banksie. Ch. h.
- 4. B. heterophylla. Catal. hort. carlsruhan. p. 36. Verschiedenblättrige Banksie. —. Ch. t.

57. Hakea, Hakea.

- 1. H. linifolia. Hort. paris. Linienblättrige Hakea. Wächst wie alle folgenden Arten dieser Gattung in der Botany-Bay in Neuholland.

 —. Ch. h.
- 2. H. dactyloides. Pers. l. c. 1. p. 117. Fingerartige Hakea. —. Ch. h.
- 3. H. heterophylla. Hort. paris. Verschiedenblättrige Hakea. —. Ch. b.

- 4. H. suaveolens. Brown in linnean soc. transact. 10. p. 182. Wohlriechende Hakea. —. Ch. b.
 - .58. Embothryum, Prachtstrauch.
- 1. E. salicifolium. Vent. hort. cels. 8. t. 8. Weidenblättriger Prachtstrauch. In Neuholland. -. Ch. b.

59. Globularia, Kugelblume.

- 1. G. longifolia. Pers. l. c. 1. p. 118. Langblättrige Kugelblume. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. 5.
- 2. G. vulgaris. Pers. 1. c. Gemeine Kugelblume. In Eur. May, Jun. Im F. 24.
- 3. G. cordifolia. Pers. l. c. Herzblättrige Kugelblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz und den Pyrenäen auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 21.

60. Cephalanthus, Kopfblume.

1. C. occidentalis. Pers. l. c. 1. p. 119. Abendländische Kopfblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. b.

61. Scabiosa, Scabiose.

- 1. Sc. alpina. Pers. 1. c. Alpen-Scabiose. Auf den Schweizeralpen und den Pyrenäen, Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. Sc. transylvanica. Pers. I. c. Siebenbürgische Scabiose. In Siebenb. u. Ung. zwischen Getreide. Jun. Jul. Im F. .
 - 3. So. leucantha. Pers. 1. c. Weissblühende Scabiose. Auf Hügeln in Krain u. Languedoc März, Apr. K. H. 4.

- 4. Sc. uralensis. Pers. 1. c. 1. p. 120. Uralische Scabiose. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. .
- 5. Sc. sylvatica. Pers. l. c. Wald-Scabiose. Auf Bergwiesen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.
- 6. Sc. stellata. Pers. 1. c. Sternförmige Scabiose: In Span. Jun. Jul. Im F. O.
- 7. Sc. atropurpured. Pers. l. c. 1. p. 121. Schwarzrothe Scabiose. In Ostind.? Jun. Jul. Im F. O.
- 8. Sc. africana. Pers. l. c. Africanische Scabiose. In Africa u. im Orient, Jun. Jul. Ch. t.
- 9. Sc. cretica. Pers. l. c. Candische Scabiese. In Candien. Jun. Jul. K. H. h.
- 10. Sc. bannatica. Rers. 1. c. Bannatische Scabiose. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. O.
 - 62. Knautia, Knautie.
- 1. K. orientalis. Pers. 1. .c. Orientalische Knautie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ..
 - 63. Spermacoce, Zahnwirhel.
- 1. Sp. suffrutescens. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 40. t. 322. Staudenartiger Zahnwirhel. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 4.
- 2. Sp. rubra. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 3. t. 256. Rothblühender Zahnwirbel. Sept. Decemb. VV. H. \odot .
 - 64. Houstonia, Houstonie.
- 1. H. coccinea. Pers. l. c. 1. p. 125. Scharlachrothe Houstonie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. t. 1

65. Rubia, Röthe.

1. R. tinctorum. Pers. l. c. 1. p. 129. Färber - Röthe. In Südeur. Jul. Aug. Im F. 24.

66. Ixora, Ixore.

1. I. coccinea. Pers. l. c. 1. p. 130. Scharlachrothe Ixore. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. t.

67. Aegiphila, Ziegenstrauch.

1. Ae. martinicensis. Pers. l. c. 1. p. 132. Martinikischer Ziegenstrauch. An den Waldrändern zu Martinique. Jun. Jul. W. H. h.

68. Callicarpa, Schönbeere.

- 1. C. americana. Pers. l. c. 1. p. 133. Americanische Schönbeere. In Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. B.
- 2. C. macrophylla. Pers. l. c. Grossblättrige Schönbeere. In Ostind. -. VV. H. b.

69. Buddleja, Buddleje.

- 1. B. globosa. Pers. 1, c. 1. p. 135. Kopftragende Buddleje. An feuchten Stellen in Chili. Jun. Jul. Ch. ty. B. capitata. Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. .
- P- 332.
- 2. B. salvifolia. Pers. l. c. 1. p. 136. Salbeyblättrige Buddleje. Am Cap. Jun. Jul. Ch. t.
- 3. B. salicifolia. Pers. l. c. Weidenblättrige Buddleje: Am Cap, Aug. - Oct. Ch. b.

70. Exacum, Bitterblatt.

1. E. viscosum, Pers. l. c. Klebriges Bitter. blatt. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Dec. Ch. t.

71. Plantago, Wegetritt.

- 1. P. hirsuta. Pers. l. c. 1. p. 139. Haariger Wegetritt. Am Cop. Jun. Jul. Ch. h.
- 2. P. Cynops. Pers. l. c. 1. p. 140. Strauchartiger Wegetritt. In der Provence, İtal. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. t.

72. Spielmannia, Spielmannie.

1. Sp. africana. Pers. l. c. 1. p. 141. Africanische Spielmannie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

73. Sanguisorba, Wiesenknopf.

1: S. officinalis. Pers. l. c. Gemeiner Wiesenknopf. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

74 Cissus, Klimme.

- 1. C. Ampelopsis. Pers. l. c. 1. p. 142. Weinverwandte Klimme. In Nordamer. —. K. H. h.
- 2. C. vitiginea. Pers. 1. c. Weinartige Klimme. In Ostind. —. W. H. b.
- 3. C. antarctica. Vent. choix. p. 21. t. 21. Neukolländische Klimme. In Neukoll. —. Ch. b.
- 4. C. sicyoides. Pers. 1. c. Stichlingartige; Klimme. In Jamaica. —. VV. H. 2.

81. Chloranthus, Grünblume.

1. Ch. inconspicuus. Pers. l. c. 1. p. 148. Kleinblüthige Grünblume. In China u. Japan. Jän. Febr. Ch. h.

82. Elaeagnus, Oleaster.

- 1. E. angustifolia. Pers. 1. c. Schmalblättriger Oleaster. In Böhmen, Ungarn, Span. Syrien u. Cappadocien. May. Jun. Im F. 5.
- e. E. orientalis. Pers. l. c. Levantischer Oleaster. Im Orient. —. K. H. h.

83. Rivina, Rivine.

- 1. R. humilis. Pers. 1. c. 1. p. 149: Niedrige Rivine. Auf den Caraibischen Inseln, Jamaica u. Barbados. Jun. Jul. VV. H. b.
 - 2. R. laevis. Pers. l. c. Glatte Rivine. In America. Jun. Jul. VV. H. b.
 - 3. R. brasiliensis. Pers, 1. c. Brasilische Rivine. In Südamer. Jun. Jul. W. H. .
 - 4. R. octandra. Pers. 1. c. Achtfädige Rivine. Im wärmer. Amer. —. VV. H. b.

84. Camphorosma, Kampferkraut.

1. C. monspeliaca. Pers. l. c. Haariges Kampferkraut. Auf sandigem Grunde in Span. Languedoc u. in der Tartarey. Jul. Aug. K. H. b.

DIGYNIA.

85. Hamamelis, Zaubernuss.

1. H. virginica. Pers. l. c. 1. p. 150. Virginische Zaubernufs. In Virgin. Sept. Oct. Im F. h.

TETRAGYNIA.

86. Ilex, Hülsen.

1. I. Aquifolium. Pers. l. c. 1. p. 151. Gemeine Hülsen. In Südeur. Japan u. Virgin. May. Im F. h.

- Albo variegata.
 Aureo gelbgestreiften Blättern.
 Juteo macula en ferox.
 Mit weißgestreiften Blättern.
 gelbgestreiften gelbgestleckten auf der Oberfläche stachligen Blättern.
- sen. In Carol. -. K. H. h.
- 3. J. balearica. Desf. catal. hort. paris. p. 201. Balearische Hülsen. Auf den Balearischen Inseln.

 —. Ch. †.
- 4. J. Perado. Pers. l. c. Madera'sche Hülsen. Zu Madera. —. Ch. †. J. maderiensis. Lam. encycl. 3. p. 146.
- 5. J. aestivalis. Pers. l. c. Sommer -Hülsen. Zn Madera. Jun. Jal. Ch. b.
- 6. J. Cassine. Pers. 1. c. Lorbeerblättrige Hülsen. In Carol. May, Juh. K. H. t.

- 7. J. vomitoria. Pers. l. c. Brech-Hülsen. In Südcarol. May, Jun. K. H. h.
- 8. J. salicifolia. Pers. l. c. Weidenblättrige Hülsen. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. b.
- 9. J. canadensis. Michaux fl. amer. boreal. 229. Canadische Hülsen. In Canada. —. K.H. 5.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

87. Heliotropium, Scorpionschwann,

- vohlriechender Scorpionschwanz. In Peru. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. b.
- *. H. grandiflorum. Hort. paris. Grofsblüthiger Scorpionschwanz. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. b.
- 3. H. indicum. Pers. l. c. Indischer Scorpienschwanz. In beyd. Ind. Jan. W. H. O.
- a. H. curassavicum. Pers. l. c. 1. p. 156. Curassavischer Scorpionschwanz. In Westindien. Jun. Jul. W. H. O.

88. Myosotis, Mauseohr.

1. M. scorpioides. Pers. 1. c. Sumpf-Manseohr. An Bächen u. feuchten Stellen in Eur. May — Aug. Im F: 21. M. palustris. Roth germ. I. 87. II. 221.

89. Lithospermum, Steinsame.

- n. L. officinale. Pers. 1. c. 1. p. 157. Gemeiner Steinsame. In Eur. May — Jul. Im F. 24.
- 2. L. purpureo-coeruleum. Pers. 1. c. 1. p. 158. Rother Steinsame. In Hainen v. Ungarn, England. Deutschl. Frankr. u. Ital. May — Juk Im F. 24.

90. Anchusa, Ochsenzunge.

- 1. A. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 159. Gemeine Ochsenzunge. In Deutschl. May, Jun. Im F. 24.
- 2. A. italica. Pers. l. c. Italienische Ochsensunge. In Südeur. Jun. Jul. Im F. J.

91. Cynoglossum, Hundszunge.

- 1. C. officinale. Pers. l. c. Gemeine Hundszunge. In Eur. May, Jun. Im F. J.
- e. C. pictum. Pers. l. c. Bunte Hundszunge. In Südenr. der Barbar. u. zu Madera. Jun. Jul. Im F. 7.
- 3. C. umbellatum. Waldst. et Kitaib. pl. Tar. hung. 2. p. 158. t. 148. Doldenblüthige Hundszunge. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. C. linifolium. Pers. 1. c. 1. p. 160. Flachsblättrige Hundszunge. In Span. u. Portug. Jun. Inl. Im F. O.
- 5. C. Omphalodes. Pers. 1. c. Frühlings-Hundszunge. In Wäldern zu Piemont u. Krain. März. Apr. Im F. 21.

92. Pulmonaria, Lungenkraut.

1. P. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 161. Gemeines Lungenkraut. In Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Schweden. May, Jun. Im F. 24.

93. Symphytum, Schwarzwurz.

- 1. S. officinale. Pers. 1. c. Gemeine Schwarzwurz. In Eur. May, Jun. Im F. 24. 6. purpureum. Mit purpurrothen Blüthen.
- 2. S. tuberosum. Pers.l. c. Knollige Schwarzwurz. In Suddeutschl. Montpell. u. Span. May — Jul. Im F. 21.
- 3. S. taurioum. Pers. 1. c. Taurische Schwarzwurz. In Taur. May. Im F. 4. S. orientale. Bieberst. fl. taurico-oaucas. 1 p. 129.

94. Cerinthe, Wachsblume.

- me. In Sibir. u. der Schweiz Jun. Jul. Im F. Q.
- 2. C. aspera. Mill. dict. n. 1. Scharfblättrige Wachsblume. In Südeur. Jun. Jul. Im F. .
- C. maior B aspera. Pers. l. c.
- 3. C. minor. Pers. 1. c. Kleine Wachsblume. In Oesterr. Steyerm. und Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

95. Onosma, Lotwurz.

1. O. echioides. Pers. 1. c. Natterkopfähnliche Lotwurz. In Oesterr. Böhm. u. Ungarn auf trocknen Haiden. Jun. Jul. Im F. 2.

96. Borago, Boretsche.

- 1. B. officinalis. Pers. l. c. '1. p. 162. Gemeine Boretsche. In der Normandie. Jul. Aug. Im F. O.
- 2. B. lawistora. Loiseleur fl. gall. p. 106. Schlaffblüthige Boretsche. In Corsica. Jul. Aug. K. H. 24.

97. Lycopsis, Krummhals.

1. L. pulla. Pers. l. c. Kleiner Krummbals. Im südlicheren Eur. auf sonnigen Hügeln. May. Im F. 24.

98. Echium, Natterkopf.

- 1. E. bifrons. Decand. catal. hort. monspel. p. 107. Zweyformiger Natterkopf. —. Ch. h.
- 2. E. candicans. Pers. k. c. 1. p. 163. Weiß-licher Natterkopf. Auf hohen Felsen zu Madera. Jnn. Aug. Ch. t.
- 3. E. giganteum. Pers. l. c. Höchster Natterkopf. Auf Felsen zu Teneriffa. Jun. Ch. h.
- 4. E. fastuosum. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 61. t. 41. Prächtiger, Natterkopf. . Jun. Ch. h.
 - 99. Messerschmidia, Messerschmidie.
- 1. M. fruticosa. Pers.). c. 1. p. 164. Strauchartige Messerschmidie. Zu Teneriffa u. den Canarischen Inseln. Jul. Aug. Ch. † .

100. Tournefortia, Tournefortie.

- 1. T. hirsutissima. Pers. 1. c. 1. p. 165. Haarige Tournefortie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. 5.
- 2. T. volubilis. Pers. l. c. Windende Tournefortie. In Jamaica, Mexico u. Peru. Jul. VV. H. 5.
- 3. T. cymosa. Lin. sp. pl. 202. Doldentraubige Tournefortie. In Jamaica. May Jul. W. H. 5. T. macrophylla. Pers. 1. c.
- 4. T. foetidissima. Pers. l. c. Stinkende Tournefortie. In Mexico n. Jamaica. Jun. Jul. VV. H. 5.

101. Cordia, Cordie.

1. C. Sebestena. Pers. l. c. 1. p. 166. Sebesten - Cordie. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. t.

102. Ehretia, Ehretie.

- 1. E. tinifolia. Pers. 1. c. Lorbeerblättrige Ehretie. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 5.
- 2. E. Beurreria. Pers. I. c. 1. p. 167. Ovale Ehretie. In Jamaica, Jun. Jul. W. H. 5.
- 3. E. laxa. Jacq. hort, schoenbr. 1. p. 18. t. 41. Schlaffe Ehretie. Auf Bourbon. Jun. Jul. VV. H. 5.

103. Varronia, Varronie.

- 1. V. bullata. Pers. l. c. Aufgeblasene Varronie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. h.
- 2. V. alba. Pers. l. c. Weilse Varronie. La Amer. —. W. H. 1

- 3. V. monosperma. Pers. l. c. Einsamige Varronie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. .
- 4. V. alnifolia. Cavan. EHerblättrige Varronie. Jänn. Apr. W. H. h.

104. Hydrophyllum, Rinnenblume.

- 1, H. magellanicum. Pers. l. c. 1. p. 168. Magellanische Rinnenblume. Auf der Magellanischen Landenge. Jun. Jul. K. H. 24.
- 2. H. canadense. Pers. 1. c. Canadische Rinnenblume. In feuchten Wäldern v. Canada. Jun. Jul. Im F. 21.

105. Ellisia, Ellisie.

1. E. Nyctelea. Pers. l. c. Virginische Ellisie. In Virgin, Jul. Aug. Im F. O.

106. Nolana, Nolane.

1. N. prostrata. Pers. l. c. Liegende Nolane. In Peru. Jul. Aug. Im F. O.

107. Androsace, Mannsschild.

- 1. A. villosa. Pers. l. c. 1. p. 169. Rauher Manneschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. May, Jun. Im F. 24.
- 2. A. lactea. Pers. 1. c. Milchweiser Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. Jun. Jul. Im F. 24.

108. Primula, Primel.

1. P. veris. Pers. l. c. Frühlings-Primel. In Eur. May. Im F. 4.

- 2. P. elatior. Pers. l. c. Garten-Primel. In Eur. May. Im F. 4.
- 3. P. vulgaris. Smith brit. 1. p. 222. Gemeine Primel. In Deutschl. Engl. u. Frankr. Apr. May. Im F. 24.
 P. acaulis. Pers. 1. c.
 - β. flore pleno violaceo. Mit gefülltvioletter Blüthe
- 4. P. farinosa. Pers. 1. c. Mehlblättrige Primel. Auf Alpen u. feuchten Wiesen in Eur. May. Im F. 24.
- 5. P. cortusoides. Pers. l. c. 1. p. 170. Schönste Primel. In Sibir. May, Jul. K. H. 4.
- 6. P. marginata. Pers. l. c. Gerandete Primel. Auf den Schweizeralpen. May Jul. Im F. 24.
- 7. P. Auricula. Pers. l. c. Aurikel-Primel. Auf Bergfelsen in Eur. Apr. May. Im F. 24.
- 8. P. Palinuri. Petagna instit. bot. 2. p. 332. Palinurische Primel. Auf Felsen des Vorgebirges Palinuro im Königreiche Neapel. Apr. May. K. H. 5.
- 9. P. minima. Pers. 1. c. Kleinste Primel. Auf Alpen in Oester. Kärnthen, Krain u. der Schweiz. Jun. Aug. Im F. 4.
- 10. P. integrifolia. Pers. 1. c. Ganzblättrige Primel. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

109. Cortusa, Cortuse.

1. C. Mathioli. Pers. l. c. Europäische Cortuse. Auf Alpen in Oesterr. Schles. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

110. Soldanella, Alpenglöckchen.

- 1. S. alpina. Willd. en 1. p. 192. Gemeines Alpenglöckehen. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 4. S. alpina β Clusii. Pers. l. c.
- 9. S. montana. Willd. l. c. Berg. Alpenglöckchen. Auf sehr feuchten Bergwiesen in Oesterr. Böhmen n. Passau, May. Jun. Im F. 24. S. alpina. Pers. l. c.

111. Dodecatheon, Göttergabe.

1. D. Meadia. Pers. l. c. Virginische Göttergabe. In Virgin. May, Jun. Im F. 24.

112. Cyclamen, Erdscheibe.

- 1. C. coum. Pers. l. c. 1. p. 171. Rundblättrige Erdscheibe. In Südeur. Jun. K. H. 24.
- 2. C. europaeum. Pers. 1. c. Europäische Erdscheibe. In schattigen Wäldern v. Oesterr. Böhm. Schles. Jun. — Aug. Im F. 21.
- 3. C. persicum. Pers. l. c. Persische Erdscheibe. Auf der Insel Cypern. Jun. Jul. K. H. 24.
- 4. C. hedergefolium, Pers. 1. c. Epheublättrige Erdscheibe. In Ital. Jun. Jul. K. H. 21.
- 5. C. autumnale, Cujus? Herbstliche Erdscheibe. -. Bl. im Herbste. K. H. 24.

113. Menyanthes, Zottenblume,

7, M. nymphoides. Pers. l. c. Seeblumenartige Zottenblume. In stehendem Gewässer des südlicheren Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter 24. Waldschmidtia nymphoides. Wiggers primit. fl. holsat. p. 20.

2. M. trifoliata, Pers. 1. c. Dreyblättrige Zottenbläme. In Sumpfen v. Eur. u. Nordamer. May. Im freyen Wasserbehälter 4.

114. Lysimachia, Lysimachie.

- 1. L. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 172. Gemeine Lysimachie. In schattigen Hainen an Bächen-Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. L. Ephemerum. Pers. l. c. Weidenblättrige Lysimachie. In Span. Medien u. Sibir. Jul. Aug. Im F. 4.
- 3. L. dubia. Pers. 1. c. Hellrothe Lysimachie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.
- 4. L. hirsuta. Michaux. flor. amer. 1. p. 127 Vierblättrige Lysimachie. In Carol. u. Pensylv. Jun. Jul. Im F. 4. L. quadrifolia. Pers. 1. c.
- 5. L. ciliata. Pers. l. c. Gefranzte Lysimachie. In Neujork. Jun. Jul. Im F. 4.
 - 6. L. punctata, Pers. 1. c. Punktirte Lysimachie. In Krain, der Schweiz, Holland u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

115. Anagallis, Gauchheil.

1. A. grandiflora. Hort. monachiens. Großblüthiges Gauchheil. — Jun. — Aug. Ch. 5.

116. Styphelia, Styphelie.

- 1. St. daphnoides. Pers. l. c. 1. p. 174. Sei-delbastartige Styphelie. In Australien. —. Ch. b.
- 2. St. Gnydium. Pers. 1. c. Gniedienartige Styphelie. In Australien. —. Ch. #.

117. Cremastostemon, Hängfaden.

1. C. capensis. Jacq. fragm. p. 68. n. 216. t. 103. f. 1. Capischer Hängfaden. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

118. Itea, Itea.

1. I. virginica. Pers. l. c. 1. p. 175. Virginische Itea. In Virgin. —. K. H. 1.

119. Plumbago, Bleywurz,

- 1. P. europaea. Pers. 1. c. Europäische Bleywurz. In Südeur. u. Peru. Sept. Oct. Im F. 24.
- 2. P. zeylanica. Pers. l. c. Zeylonische Bley wurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.
- 3. P. rosea. Pers. 1. c. Rosenrothe Bleywurs. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. h.
- 4. P. scandens. Pers. l. c. Klimmende Bley-wurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

120. Mirabilis, Jalape.

- 1. M. dichotoma, Pers. l. c. 1. p. 176. Gabelformige Jalape. In Mexico. Jun. — Aug. K. H. 24.
- 2. M. Jalapa. Pers. 1. c. Gemeine Jalape. In beyden Ind. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. M. longistoro. Pers. 1. c. Langblumige Jalape. Auf kalten Bergen in Mexico. Jun. Jul. Im F. 24.

121. Convolvulus, Winde.

1. C. Batatas. Pers. l. c. 1. p. 178. Bataters-Winde, In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. 4.

- 2. C. canariensis. Pers. l. c. 1. p. 179. Canarische Winde. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. b.
- 3. C. siculus. Pers. l. c. 1. p. 180. Sicilianis sche Winde. In Sicilien. Jun. Jul. Im F. O.
 - 4. C. lineatus. Pers. l. c. Gestrichelte Winde. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. 24.
 - 5. C. Cneorum. Pers. l. c. 1. p. 181. Candische Winde. In Span. Cand. und Syrien. Jun. Jul. K. H. 5.
 - 6. C. Cantabrica. Pers. 1. c. Cantabrische Winde. In Südeur. Taurien und Africa. Jun. Im F. 4.
- 7. C. tricolor. Pers. l. c. 1. p. 182. Dreyfarbige Winde. In Sicil. Span. und Nordafr. Jun. Jul. Im F. ©.
- 8. C.? monospermus, Cujus? Einsamige Winde. . VV. H. b.

122. Ipomoea, Trichterwinde.

- 1. J. Quamoclit. Pers. l. c. 1. p. 182. Gefiederte Trichterwinde. In Ostind. Jul. August. W. H. O.
- 2. J. coccinea. Pers. 1. c. Scharlachrothe Trichterwinde. In Westind. Jun. Jul. W. H. .
- 3. J. bona now. Pers. l. c. 1. p. 183. Stachlige Trichterwinde. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ...
- 4. J. violacea. Pers. 1. c. Violette Trichterwinde. In Südamer. Jun. Jul, W. H. O.
- 5, J. purpurea. Pers. 1. c. Purpurrothe Trichterwinde. In Amer. Jun. Jul. W. H. O.

- 6. J. discolor. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 261. Zweyfarbige Trichterwinde Jul. Aug. W. H. O.
- .7. J. Nil. Pers. l. c. 1. p. 184. Blaue Trichterwinde. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. 🔾.
- 8. J. ternata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 16. 1. 37. Dreyblättrige Trichterwinde. In Südamer, Jul. Aug. W. H. 5.
- 9. J. heterophylla. Pers.l. c. 1. p. 185. Verschiedenblättrige Trichterwinds. In Mexico u. auf der Insel Cuha. Jul. Aug. W. H. 5.

123. Cobaca, Cobaa.

1. C. soandens. Pers. I. c. Klimmende Cobäs. In Mexico. Jun. — Oct. W. H. 5.

🐰 🐦 124. Polemonium, Sperrkraut. ..

1. P. coeruleum. Pers. l. c. Blaues Sperrkraut. Im nördlicheren Eur. Oesterr. Böhm. Un garn und in Asien. Jun. Jul. Im F. 4.

125. Phlox, Flammenblume.

- 1. Ph. paniculata. Pers. l. c. 1. p. 186. Rispenblüthige Flammenblume. In Nordamer. Jun. Sept. Im F. 2.
- 2. Phi aristata, Pers. I. c. Gegrannte Flammanbluste. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. Ph. suaveolens. Pers. l. c. Wohlriechende Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 4. Ph. maculata. Pers. I. c. Gelleckte Flanmenblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 4.

- 5. Ph. glaberrima. Pers. 1. c. Glatte Flammonblume. In Virgin, Jun. Jul. Im F. 24.
- 6. Ph. divaricata, Pers. I. c. Ausgebreitete Flammenblume Auf Bergen in Virgin. May. Im F. 4.
- 7. Ph. reptans. Pers. 1. c. Kriechende Flammenblume. Auf Bergen in Carol. Jun. Jul. Im F. 24.
- 8. Ph. subulata. Pers. l. c. Pfriemonartige Flammenblume. In Virgin, Jun. Jul. Im F. 24.
- 9. Ph. setacea. Pers. l. c. Borstenblättrige Flammenblume In Virgin. Jun. Jul. Im F. 4.

126. Vestia, Vestie.

1. V. tycioides. Willd. ennm. 1. p. 208. Bocksdornartige Vestic. In Chili. Jun. Jul. Ch. th. Cantua foetida. Pers. l. c. 1. p. 187.
Periphragmos foetidus. Ruiz et Pavou fl. peruv. 2. p. 17. t. 132.

127. Caldasia, Galdasie.

- 1. C. heterophylla. Willd. hort. berol. 1. p. 71. t. 71. Verschiedenhlättrige Caldasie. In Mexico. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. 2. Bonplandia geministora. Pers. 1. c.
 - 128. Campanula, Glockenblume.
 - 1. C. pulla. Pers. l. c. 1. p. 188. Dunkelblaue Glockenblume. Auf Alpen'in Oceterr. und Steyerm. Jun. Jul. Im. F. 24.
 - 2. C. rotundifolia, Pers. l. c. Rundblättrige Glockenblume. In Hainen und an Zännen im Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.
 - 3. C. versicifolia. Pers. L. c. 1. p. 189. Barschig-

blättrige Glockenblume. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

& flore pleno albo. Mit weißgefüllter Blüthe.

- 4. C. pyramidalis. Pers. l. c. Pyramidenartige Glockenblume. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. C. rapunculoides. Pers. 1. c. 1. p. 190. Rapunzelartige Glockenblume. In Oesterreich, Dedtschl. der Schweiz u. Frankt. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 6. C. Trachelium. Pers. 1. c. Gemeine Glockenblume. An Zäunen u. Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 7. C. glomerata. Pers. 1. c. Knaulblumige Glockenblume. Auf Wiesen u. Kalkhügeln in Eur. Jun. — Aug. 1m F. 4.
- 8. C. peregrina. Lin. mant. 2, p. 204. Fremde Glockenblume. Am Cap? Jun. Jul. Ch. 24.
- 9. C. Medium. Pers. l. c. 1. p. 191. Grofsblumige Glockenblume. In Krain u. Ital. Jun Jul. Im F. J.
- 10. C. divergens. Waldst, et Kitaib. Ausgebreitete Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. J.
- 11. lingulata. Pers. 1. c. Zungenblättrige Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. 6.
- 12. C. alpina. Pers. 1. c. 1. p. 192. Alpon-Gloekenblume. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 13. C. mollis. Pers. 1. c. Weiche Glockenblume. In Syr. Sicil. u. Span. Jun. — Aug. K. H. Q.

- 14. C. sibirica. Pers. 1. c. Sibirische Glockenblume. In Sibir. u. Oesterr. May, Jun. Im
- 15. C. aurea. Pers. 1. c. Goldfarbige Glockenblume. Auf Felsen zu Madera. Jun. Jul. Ch. b.

129. Phyteuma, Rapwurzel.

- 1. Ph. hemisphaericum. Pers. l. c. 1. p. 194. Halbrunde Rapwurzel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. 21.
- 2, Ph. arbiculars. Pers. 1. c. Kugelförmige Rapwurzel. Auf Bergwiesen in Deutschland, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. Ph. spicajum. Pers. 1. c. Achrentragende Rapwurzel. Auf waldigen Bergen in Dentschland, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

130, Trachelium, Halskraut.

T. T. voeruleum. Pers. l. c. 1. p. 195. Blaues Halskraut. An schattigen Oertern im Ital. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

131. Goodenia, Goodenie.

- 1. G. ovata. Pers. l. c. Eyformige Goodenie. In Neuboll. May, Jun. Ch. 15.
- 2. G. grandiflora. Curt. bot. mag. 890. Groß-blüthige Goodenie. In Newholl, May Jul. Ch. 4. G. appendiculata. Jacq. fragm. bot. p. 62. n. 2008.
- 3. G. calendalacea, Pers. l. c. Ringelblumenartiga Goodenie, In Neuholl, - Ch. h.

132. Gardenia, Cardenie.

- 1. G. radicans. Pers. l. c. 1. p. 198. Wurzelnde Gardenie. In Japan. Ch. 5.
- 2. G. florida. Pers. l. c. Vollblüthige Gardenie. In Ostind, Amboina u. am Cap. Nov. Dec. VV. H. 5.
- 3. G. Thunbergia. Pers. l. c. Thunbergische Gardenie, Am Cap u. zu Manilla. —. W.H. 5.
- 4. G. Randia β mitis. Swartz' fl. ind. occident. 1. p. 523. Zahme Gardenie. Auf den Antill. n. zu Jamaica. —. W. H. b.
 Randia latifolia β? mitis. Pers. l. c. 1. p. 199.

133. Hamelia, Hamelie.

- 1. H. patent. Pers. L.c. 1. p. 293. Abstehende Hamelie. An Bergzäunen in Hispaniola u. Pers. May Sept. W. H. b.
- 2. H. chrysantha, Pers. l. c. Goldfarbige Hair melie. An Bergzäunen von Jamaica u. Caracas. May — Sept. W. H. 5.

134. Rondeletia, Rondeletie.

1. R. racemosa. Pers. l. c. 1. p. 204. Tran-i hentragende Ronduletie, Auf waldigen Bergen zu Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 5.

135. Macroenemum, Stengelblume.

1. M. speciosum. Jacq. hort, schoenlit. it p. 19. t. 43. Schöne Stengelblume. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. h.

136. Serissa, Serisse.

1. S. foetida. Pers. l. c. 1. p. 205. Stinkende Serisse. In Ind. u. Japan. May — Jul. Ch. th. Lycium japonicum. Thunb. t. 17.

137. Psychotria, Psychotrie.

1. Ps. undata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 5. t. 260. VVogenblättrige Psychotrie. Auf den Bahamainseln. Jul. — Oct. W. H. †.

138. Coffea, Coffee.

1. C. arabica. Pers. l. c. 1. p. 208. Arabischer Coffee. Im glücklichen Arab. u. Aethiop. May — Oct. W. H. 5.

139. Paederia, Knackbeere.

1. P. foetida. Pers. l. c. 1. p. 210: Stinken-de Knackbeere, In Ostind. —. VV. H. 5.

140. Azalea, Azalea.

- 1. A. procumbens. Pers. l. c. 1. p. 212. Liegende Azalea. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 3.
- 2. A. pontica. Pers. l. c. Pontische Azalea. Am schwarzen Meere u. in Gallicien. Jun. Jul. K. H. 5.
- 3. A. viscosa, Pers. l. c. 1. p. 213. Klebrige Asalea. In Virgin. Jun. — Aug. K. H. 5.
- 4. A. glauca. Pers. l. c. Grangriine Azalea. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. 5.

141. Lonicera, Lonicere.

- n. L. Caprifolium. Pers. l. c. Durchwachsene Lonicere. (Geisblatt). In Südeur. May Jul. Im F. h.
- 2. L. Periclymenum. Pers. l. c. Deutsche Lonicere. In Mitteleur. May, Jun. Im F. 5.
- 3. L. dioica Lin. syst. veg. p. 181. Graue Lonicere. In Nordamer. Jun. Im F. 5. L. parvislora. Pers. 1. c.
- 4. L. sempervirens. Pers. 1. c., Immergrüne Lonicere. In Wäldern v. Carol. u. Mexico. May Jul. Im F. ‡.
- 5. L. grata. Pers. l. c. Schöne Lonicere. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 3.
- 6. L. japonica. Pers. 1. c. Japanische Lonicere. In Japan. —. Ch. t.
- 7. L. nigra. Pers. l. c. Schwarze Lonicere. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. t.
- 8. L. Xylosteum. Pers. 1. c. Gemeine Lonicere. (Beinholz). An Zännen in Eur. May Jul. Im F. t.
- 9. L. tatarica. Pers. l. c. Tartarische Lonicere. In der Tartarey. May, Jun. Im F. h.
 - β. sibirica. Mit schöntothen Blüthen.
- 10. L. alpigena. Pers. l. c. Alpen Lonicere. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. t.
- 11. L. coerulea. Pers. l. c. Blaue Lonicere. In Oesterr. u. der Schweiz auf Alpen Jun. Jul. Im F. 5.
- 142. Symphoricarpos, Zwillingsfrucht.
 - 1. S. vulgaris. Michaux. fl. amer. 1. 'p. 106.

Gemeine Zwellingsfracht. In Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. b. Lonicera Symphoricarpos. Pers. l. c. 1. p. 214.

143. Diervilla, Dierville.

1. D. canadensis. Willd. enum. 1. p. 222. Canadische Dierville. In Canada, Neujork und Carolina. Jun. Jul. Im F. t. Diervilla humilis. Pers. l. c. Lonicera Diervilla. Lin. sp. pl. p. 249.

144. Verbascum, Königskerze.

- 1. V. condensatum. Schrad. monog. Verbase. sect. 1. p. 31. t. 3. Dichtbewachsene Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. o..
- 2. V. spaciosum. Schrad. hort goetting fasc. 2. p. 22: t. 16. Schöne Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. d.
- 3. V. phlomoides. Pers. l. c. 1. p. 215. Phlomisartige Königskerze. In Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. J.
- cas. 1. p. 161. Pyramidenartige Königskerze. Am Caucasus. Im F. o.
- 5. V. Lychnitis. Pers, 1. c. Lychnisartige Königskerze. Auf kalkigem Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 6. V. nigram. Pers. 1: e. Schwarze Rönigskerze. In VValdgegenden v. Eur. Jun. Jul. 1m F. 24.
- Oesterreichische Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. d.

- 18. V. phoeniceum. Pers. I. c. Violete Königskerze. Im östlichen Eur. Krain u. Deutschis. Jun. Jul. Im F. 4.
- 9. V. Blattaria. Pers. l. c. Veränderliche Königskerze. Im südlicheren Eur. Jul. Aug, Im F.
 - 145. Datura, Stechapfel.
- 1. D. Tatula. Pers. 1. c. 1. p. 216. Blassblaner Steckapfel. Am Cap. Junt. Jul. Im F. O.
- 2. D. fastuosa. Pers. 1, c. Schöner Stechapfel. In Aegypt. May, Jun. Im F. O.
- 3. D. Metel. Pere. 1. c. Weiser Stechapfel. In Asien, Afr. u. den Canar. Inseln. Jun. - Aug. W. H. O:
- 4. D. ceratocaula, Pers. l. c. Gabelstieliger Stechapfel. Auf Cuba. Jul. Aug. W. H. O.
- 5. D. suaveolens. Humboldt et Bonpl. Wohlriechender, beschäpfel. An Mekine Jun. - Sept. VV. H. h. D. arborea Hottulan.
 - 146, Hyosoyamus, Bilsenkraut.
- 1. H. aureus. Pers. L. c. 1. p. 217. Goldfarbiges Bilsenkraut. In Candien und im Orient. May — Aug. K. H. 24.1
- 2. H. Scopolia. Pers. I. c. Glockenförmiges Bilsenkraut. In VValdern bey Idria u. im Banat, May, Jun. Im F. 24.
- 147. Nicotiana, Taback.
- 11. N. Tababum: Bers 1. o. Gemoiner Tuliack. In Amer. Jun. — Aug. Im F. O.

- 4. N. macrophylla. Spreng. ind. hort. halens. 4807. p. 45. Großblättriger Taback. In Amer. Jul. Aug. Im F. O.
- 3. N. rustica. Pers. 1. c. Bauern-Taback. In Amer. Jun. Jul. Im F. O.
- 4. N. paniculata, Pers. L.c. Jungfern-Taback. In Peru. Jun. Jul. Im F. O.
- 5. N. undulata. Pers. 1. c. Wellenblättriger Taback. Bey der Stadt Jackson in Neuholl. Jun. Jul. Ch. 24.

148. Solandra, Solandre.

1. S. grandiflera. Pers. l. c. 1. p. 218. Großblumige Solandre. Auf den höchsten Bäumen in Jamaica, Jun. Jul. W. H. B.

β foliis glabris. Mit glatten Blättern.

149: Mandragora, Alraun.

1. M. officinalis. Decand. fl. franc. 3. p. 610. Officineller Alraun. Auf sonnigen Oertern in Krain, Span. der Schweiz, Sibir. Ital. Cand. u. den Cycladischen Inseln. May. Im F. 24. Atropa Mandragora. Pers. 1. c.

150. Atropa, Tollkraut.

- 1, A. Belladonna. Pers. 1. c. Gemeines Tolkkrant. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. n. Ital. Jun. Jul. Im F. 2.
- 2. A. frutercens. Pers. l. c. 1. p. 219. Strauchartiges Tellkraut. In Span, Jun. Jul. K. H. 4.

151. Nicandra, Nicandre.

1. N. physaloides. Pers. 1. c. Schluttenartige Nicandre. In Peru. Jul. Aug. Im F. 3. Atropa physaloides. Lin. sp. pl. 260.

152. Physalis, Schlutte.

- 1. Ph. somnifera. Pers. l. c. 1. p. 220. Schlafmachende Schlutte. In Mexico und Span. Jul. Aug. Ch. t.
- 2. Ph. flexuosa. Pers. l. c. Gebogene Schlutte. In Ostind. Jun. Aug. Ch. 5.
- 3. Ph. viscosa. Pers. 1. o. Klebrige Schlutte. In Virgin. u. zu Buenos Ayres. Jun. — Ang. Ch. 24.
- 4. Ph. Alkekenge, Pers. l. c. Gemeine Schlutete. An Gräben v. Deutschl. Ital. u. Japan. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. Ph. peruviana. Pers. 1. c. Peruvianische Schlutte. (Ananaskirsche). Zu Lima. Jun. Jul. Ch. t.
- 6. Pt. prostrate. Pers. I. c. Liegende Schlutte. In Peru. Jun. Jul. W. H. O.

153. Solanum, Nachtschatten.

- 1. S. auriculatum. Pers. l. c. 1. p. 221. Ge-Chrter Nachtschatten. Auf den Inseln Madagascar, St. Moritz u. Bourbon. May, Jun. W. H. t.
- 2. S. Milongena, Pers. l. c. Eytragender Nachtschatten. In Ostind, Jun. Jul. W. H. O.
 - 3. ovigera. Mit weißer eyfarmiger Frucht.
- 3. S. diphyllum, Pers. l. c. 1. p. 222. Zwey-blättriger Nachtschatten. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. VV. H. 4.

- 4. S. filian. Pers. 1. o. Hinfalliget Nachtschatten, Zu Caracas. Jun. Aug. W. H. 5.
- 5. S. stellatum. Pers. 1.-c. Sternförmiget Nachtschatten. May Aug. VV. H. it.
- 6. S. nodifierum. Pers. 1. e. s., p. 223. Knotenblüthiger Nachtschatten. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. 5.
- 7. S. Pseudo capsicum. Pers. 1. c. Beissbeerenartiger Nachtschatten. Zu Madera. Jun. — Aug. Ch. 5:
- 8. S. Dulcamara. Pers. l. c. 1. p. 224. Kletternder Nachtschatten. (Bittersitis). An feuchten Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. h.
- 9. S. aggregatum. Jacq. 10. ran. 2. t. 323. Coll. 4. p. 124. Gehäafter Nachtschatten. And Cap. Aug. — Oct. Ch. h. Atropa solanacea. Pers. l. c. 1. p. 219.
- 10. S. bombense. Jacq. stirp. amer. 49. Bombascher Nachtschatten. Auf der Insel Bomba bey Carthagena. Jun. Sept. Ch. b.
- 11. S. betacoum. Pers. l. c. Mangoldblättriger Nachtschatten. In Mexico. -. Ch. b.
- 12. S. bonarionse, Pers. l. c. 1. p. 225, Bonnavischer Nachtschatten. Zu Buenos-Ayres. Aug.,—Oct. K. H. 5.
- 13. S. macrocarpon. Pers. 1. c. Großfrüchtiger Nachtschatten. In Peru. Juni — Aug. W. H. b.
- 14. 6. radicans. Pers. 1. c. Wurzelnder Nacht. schatten. In Peru. Jun. Aug. Ch. 24.

- 15. S. Reofindrum. Pers. 11 of NiedergeBogemer Nuchtschatten. — Jun. — Aug. Chi. J.
- 16. S. Lycopersicum. Pers. l. c. 1. p. 226. Liebesapfal Nachtschatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. Im F. O.
- 17. L. Pseudo Lycopersteum, Pers. l. c. Falscher Liebesapfef-Nachtschatten. Jun. Jul. Im. F. O.
- 18. S. carolinense. Pers. 1. c. 1. p. 227. Carolinescher Nachtschatten. In Caroline. K. H. O.
 - 19. S. sodomeum. Pers. 1. c. 1. p. 228. Sodoms-Nachtschatten. In Africa, besonders am Cap. Jul. Ang. Ch. h.
 - ... 20. A. marginatum: Pers. L. C. Gerändeter Nachtschattell In Albessinien dun. - Aug. Ch. 150
 - blättriger Nachtschatten / In Weskind: Juli Aug. VV. H. 5.
 - 22. S. ferrugineum. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 46. t. 334. Rostianbener Nachtschatten. Jun.
 - 23. S. tomentosum Pers. 1. c. Filziger Nachta schatten, In Acthiop. Inn Jul. VV. H., 1, 5. e B. coccineum, Mis scharlachrothen Früchten.
 - 24. S. giganteum. Pers. 1. c. Riesenartiger 1 Nachtschatten. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5
 - 25. S. Ignoum. Pers. I. c. Feuriger Nacht, schatten, Im wärmer. Amer. Jun. Aug. VV. H. 7.
 - 26 5. Pradimithos. Pers. 1. c. Rothstachliger Michtschlätten, Zu Madagascat. Jun. Jul. W. H. b.

12. S. violaceum. Ort. decas 5. p. 56. 'Violeter Nachtschatten. In Mexico, Apr. — Jul. W. H. 5.

154. Capsicum, Beissbeere.

- 1. C. annuum. Pers. 1. c. Jährige Beissbeers. In Südamer. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. C. baccatum. Pers. 1. c. Kleinfrüchtige Beissbeere. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.
- beere. In China. Jun. Jul. Ch. t.
- 4. C. grassum. Pers. l. c. 1. p. 230. Grofs-früchtige Beißbeere. In Ostind, Jun. Jul. VV. H. O.
- 5. C. frutescens. Pers. L.o. Sirauchartige Beißbeere, In bayden Ind. Jun. Jul. W. H. &.
- 6. C. ovrasiforme. Pers. N. c. Rundfrüchtige Beisbeere. — Jun. Jul. VV. H. 4.

155. Cestrum, Hammerstrauch.

- 1. C. laurifollum. Pers. l. c. Lorheerblättriger Hammerstrauch. Im wärmer. Amer. Nov. Febr. W. H. 5.
- 2. G. mucrophyllum. Pers. 1. c. Groublättriger Hammerstrauch. Auf den Antillen u. zu Portoricco. März. VV. H. b.
- 3. C. Parqui. Pers. l. c. Chilischet Hrennerstrauch. An feuchten Stellen zu Chili. Jun. — Aug. K. H. h.
- p. 42. t. 329. Weidenblättriger, Hammerstrauch. Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. h.

- 5. C. Airsutum, Jaoq. 1. c. 3. p. 41. t. 324. Rauhhaariger Hammerstrauch. — Apr. May. W. H. b.
- 6. C. vespertinum. Pers. l. c. Abend -Hammerstrauch. Auf den Antillen. Jun. — Aug. W. H. 5.
- 7. C. pendulinum. Jacq. l. c. 3. p. 42. t. 327.
 Hängender Hammerstrauch. Zu Caracas. Jun.
 Aug. W. H. b.
- 8. C. tinetorium. Jacq I. c. 3. p. 45. t. 332. Färber Hammetstrauch. Zu Caracas. May Sept. W. H. h.
- 9. C. foetidissimum. Jacq. 1. c. 3. p. 43. t. 329. Stinkender Hammerstrauch. In Westind. Marz, Apr. u. Sept. Oct. W. H. h.
- 10. C. cauliflorum. Jacq. 1. c. 3. p. 41. t. 225. Stafamblüthiger Hammerstrauch. Apr. May. VV. H. t.
- 11. C. odontospenmum. Jacq. l. c. 3. p. 44. t. 331. Zahnfrüchtiger Hammarstrauch. — Sept. Oct. W. H. b.
- 12. G. fastigiatum. Jacq. 1. c. 3. p. 44. t. 330. Gleichhochästiger Hammerstrauch. Auf Cuba. Juns Aug. W. H. b.

156. Lycium, Bocksdorn.

- 1. L. afrum. Pers. l. c. 1. p. 231. Africanischer Bocksdorn. Im nördlichen Africa. Jun. Jul. K. H. h.
- 2. L. tenue. Willd. enum. 1. p., 245. Zartee Bocksdorn. — Jun. Jul. Ch. 5.

- dorn. In Sibir an der Wolga. Jun. Jul. Im F. t.
- 4. L. barbarum. Pers. l. c. Gemeiner Bocksdorn. In Eur. Asien u. Africa. Jun. Aug. Im
- 5. L. cinereum. Pers. l. c. 1. p. 232. Grauer Bocksdorn. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 6. L. boerhaavifolium. Pers. l. c. Graublättriger Bocksdorn. In Peru. —. W. H. 5.

157. Pogonia, Pogonie.

- 1. P. debilis. Pers. 1. c. Schwache Poganie. In Neuholl. Jan. Jul. Ch. 5. Andrewsia debilis. Vent jard. de la Malmais. 2. p. et t. 108.
- Glatte Pogonie. In Neuholl. Apr. Ch. the Andrewsia glabra Vent. l. c.

158. Ardisia, Ardisie.

- 1. A. coriaçea, Pers. l. c. Lederartige Ardisie. Auf den Antillen ... W. H. b
- 2. A. crenulata. Pers. I. c. 1. p. 233. Feingekerbte Ardisie. Auf den Antillen. - W. H. t.

159. Myrsine, Myrsine.

- 1. M. africana. Pers. l. c. Africanische Mýrisine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.
- sine. Auf den Azorisch. Inseln. Jun. Jul. Ch. 5.

160. Leea, Leea.

- 1. L. orispa. Pers. I. c. Krause Leea. Am Cap. -. Ch. 24.
 - 161. Jacquinia, Jacquinie.
- 2. J. arborea. Pers. l. c. 1. p. 234. Baumartige Jacquinie. Auf der Insel Montserrat. —. VV. H. 5.
- e. J. aristata. Jacq. fragm. bot. p. 64. t, 95. f. 2. Gegrannte Jacquinie. In Westind. Jul. Aug. t. Nov. Dec. W. H. t.
- 3. J. revoluta. Jacq. l. c. pl 64. 1. 95. f. 13. Zurnckgerollte Jacquinie. Zu Caracas. -. VV. H. 5.
 - 162. Sickingia, Sickingie.
- Sickingie. Auf waldigen Bergen zu Caracus. TV. H. 5.
 - 163. Chrysophyllum, Goldblatt.
- 1. Ch. Cainito Pers. l. c. 1. p. 236. Cainito-Goldblatt. Auf Martinique. May, Jun. W. H. 5.
- 2. Ch. argenteum. Pers. 1. c. Silberfarbiges Goldblatt. Ant Martinique. ... YV. H.
- In Wäldern zu Martinique W. H. 5.
 - 164. Sideroxylon, Eisenholz.
- note: S. sucrme. Pers. 12 to Dornenloses Eisen hold. In Asthiop. July and Sept. 278. Hosti. 1940.

165. Bumelia, Hochstamm.

- 1. B. salieifolia. Pers. l. c. 1. p. 237. Weidenblättriger Hochstamm. Auf trockenen Hügeln in Jamaica, St. Crux u. den Bahamainseln. Jun. Jul. W. H. 5.
 Sideroxylon Mastichodendron. Jacq. collect. 2. p. 253. t. 17. f. 5.
- 2. B. lycioides. Pers. l. c. Bocksdornartiger Hochstamm. In Canada u. Carolina. Jul. Aug. K. H. h. Sideroxylonlycioides. Duham. arb. 2. p. 260. t. 68.
- 3. B. tenax. Pers. 1. c. Zäher Hochstamm. An Meereshecken in Carolina. Sept. Oct. K. H. 5. Sideroxylon tenax. Lin. mant. 48.

166. Soleroxylon, Schwerholz.

- 1. Sc. mite. VVilld. enum. 1. p. 249. Wehrloses Schwerholz. Am Cap. —. Ch. 5.
 Manglilla Milleriana. Pers. 1. c.
 Sideroxylon mite. Liu. syst. veg. 193.
- 2. S. melanophleum. Willd. enum. 1. c. Schwarzrindiges Schwerholz. Am Cap. Aug. Sept. Ch. b.
 Manglilla melanophleos. Pers. 1. c.
 Sideroxylon melanophleum. Lin. mant. 48.

167. Rhamnus, Wegdorn.

- 1. Rh. catharticus. Pers. l. c. 1. p. 238. Gemeiner Wegdorn. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. b.
- 2. R. saxatilis. Pers. 1. c. Stein-Wegdorn. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, Siebenbürg. Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May. Im F. 5.

- 3. R. Frangula. Pers. l. c. 1. p. 239. Glatter Wegdorn. (Pulverholz). In feuchten Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. 3.
- 4. R. hybridus. Pers. 1. c. Bastard-Wegdorn. Kömmt nur in Gärten vor. Jun. Jul. Im F. t.
- 5. R. Alaternus. Pers. l. c. Immergrüner Wegedorn. In Südeur. May, Jun. Im F. t.

 6. foliis luteo varieg. Mit gelbgesleckten Blätt.

 7. albo . weißgesleckten .

168. Zizyphus, Judendorn.

- 1. Z. Ignaneus. Lam. encycl. 3. p. 318. Ei-dechsen-Wegdorn. Auf den Antill. u. zu Curassac.

 W. H. 5.
 Rh. Ignaneus. Pers. l. c. 1. p. 240.
- 2. Z. vulgaris. Willd. sp. pl. 1. p. 1105. Gemeiner Judendorn. In Südeur. May, Jun. Im F. 5. Rh. Zizyphus. Pers. 1. c.
- 3. Z. volubilis. Willd. arb. 415. Windender Judendorn. In Carolina. Jun. Aug. K. H. B. Rh. volubilis. Pers. l. c.
- 4. Z. Paliurus. Willd: l. c. Geflögelter Judendorn. In Südeur. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. h. Rh. Paliurus. Pers. l. c. 1. p. 241.
 - 169. Condalia, Condalie.
 - 1. C. microphylla. Pers. l. c. Kleinblättrige Condalie. Zu Chili Ch. b.
 - 170. Elaeodendrum, Oelstrauch.
 - 1. E. erientale. Pers. 1. c. Qrientalischer

Oelstrauch: Auf der St. Moritzinsel. -. W. H. 5.

171. Celastrus, Celaster.

- nender Celaster. In Canada. May, Jun. Im F. t.
- 2. C. buxifolius. Pers. k. c. r. p. 243. Buchsblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. b.:
- 3. C. nyracanthus. Pers. I. c. Birnenblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. p.

.... 172, Evonymus, Spindelbaum.

- 1. E. japonious. Pers. l. e. Japanischer Spindelbaum. In Japan. Oct. Nov. Ch. tj.
- 2. E. guropaqus. Pers. l. c. Gemeiner Spindelbaum. An Hecken in Eur. May, Jun. Im F. h.
- 3. E. verrucosus. Pers. l. c. Warziger Spindelbaum. Auf Bargen in Oesterr. Krainu. Pohlem-Jun. Jul. Im F. h.
- 4. E. latifolius. Pers. l. c. Breithlättriger Spindelbaum. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. Böhmen u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. h.
- 5. E. atroputpureus. Pers. 1. c. Dunkelrother-Spindelbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.
- 6. E. americanus. Pers. l. c. Americanischer Spindelbaum. In Virgin. u. Carol. Im F. h.

173. Ceanothus, Ceanothus.

1. C. americanus. Pers. l. c. 1. p. 244. Americadischer Ceanethus. In Virgin. u. Carol. L. K. H. b.

- Ceanothus. In Georgien u. Florida. K. H. 5.
- 3. C. colubrinus. Pers. 1. o. Schlangen-Ceannothus. In Amer. May, Jun. VV. H. t. Rhamnus colubrinus Lin. syst. veg. 195.
- 4. C. africanus. Pers. l. c. Africanischer Ceanothus. Ans Cap u. in Aethiop. Jan. Jul. Ch. h.
- 5. C. discolor. Venten, jardin. de la Malmaison. 1. t. 58. Zweyfarbiger Ceanothus. Auf den Südseeinseln. Aug. Ch. h.

174. Phylica, Phylica.

- 1. Ph. ericoides. Pers. l. c. 1. p. 245. Heidenartige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jun. — Dec. Ch. h.
- 2. Ph. bicolor. Pers. 1, c. Zweyfarbige Phylica. Am Cap. —. Ch. h.
- 3. Ph. plamosa. Pers. l. c. Fedrige Phylica. In Aethiop. —. Ch. 5.
- 4. Ph. buxifolia. Pers. l. c. Buchsblättrige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jän. Febr. ur Jun. Jul. Ch. h.
- 5. Ih. paniculata. Pers. l. c. Rispenblüthige. Phylica. Am Cap. May Jul. Ch. h.

175. Brunia, Brunie.

ż

í.

1. B. abrotanoides. Pers. 1. c. 1. p. 246. Stabwurzartige Brunie. Am Cap.u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

176. Diosma, Buccostrauch.

1. D. album. Pers. 1. c. 1. p. 247. Weisser Buccostrauch. Am Cap. —. Ch. h.

- 2. D. ericoides, Pers. l. c. Heidenartiger Buscostrauch. In Acthiop. Nov. Dec. Ch. 5.
- 3. D. ciliatum. Pers. 1. c. Gefranzter Buccestrauch. Am Cap. Apr. May. Ch. 5.

177. Agathosma, Agathosma.

1- A. imbricatum. Willd. enum. 1. p. 259-Dachziegelblättrige Agathosma. Am Cap. - . Ch. h. Diosma imbricatum. Pers. I. c.

178. Gouania, Gouanie.

1. G? mauritiana. Hort, sekönbruanens. Moritzische Gouanie. Auf der St. Moritzinsel. —. VV. H. h.

179. Pittosporum, Klebsame.

- 1. P. undulatum. Pers. 1: c. 1. p. 248. Wellenblättriger Klebsame. Auf den Canarischen Inseln. März May. Ch. h.
- 2. P. sinense. Hort. paris. Chinesischer Klebsame. In China. —. Ch. 5.

180. Cedrela, Cedrele.

1. C. odorata. Pers, l. c. Wohlriechende Cedrele. In Südamer. —. W. H. h.

181. Billardiera, Billardiere.

- 1. B. scandens. Pers. l. c. 1. p. 249. Rankende Billardiere. In Neuholl. Jän. Febr. Ch. t.
 - 182. Ribes, Johannisbeere.
 - 1. R. rubrum. Pers. l. c. 1. p. 251. Gemei-

ne Johannisbeere. In den nördlichen Gegenden Schwedens u. Englands. May. Im F. h.

- 2. R. petraeum, Pers. l. c. Rothblühende Johannisbeere. Auf den Steyerschen u. Kärntheuschen Alpen, dann auf Bergen in Schles. u. Böhmen. May. Im F. h.
- 3. R. prostratum. Pers. 1. c. Niedergestreckte Johannisbeere. Auf der Ins. Neufundland. May. Im F. b.
- 4. R. alpinum. Pers. 1. c. Alpen Johannisbeere. Auf Alpen in Eur. May. Im F. 5.
 - 5. R. nigrum. Pers. 1. c. Schwarze Johannisbeere. An den Ufern der Flüsse u. an Zäunen des nördlicheren Eur. u. in Nordamer. May. Im F. h.
 - 6. R. floridum, L'Herit. stirp. nov. 1. p. 4. Pensylvanische Johannisbeere. In Pensylvan. May Im F. h. R. pensylvanicum. Pers. l. c.
 - 7. R. Dincantha. Pers. 1. c. 1. p. 25s. Zweystachlige Johannisbeete. In Davarien. May. Im F. t.
- 8. R. Grossularia. Pers. 1. c. Stachlige Johannisbeere. In Waldern u. Hecken v. Eur. May. Im F. 13.
 - 9. R. Cynosbatt. Pers. l. c. Stachelfrüchtige Johannisbeere. In Canada. May. Im F. b.
 - 183. Hedera, Epheu.
- 1. H. Hellw. Pers. l. c. Gemeiner Ephen. In Enr. an alten Mauern p. Bänmen. Sept. Oct. Im F. h.

184. Vitis , Wein.

- 1. V. vinifara. Pers. l. c. Gemeiner Wein. Im gemäßigten Asien. May, Jun. Im F. h.
- t. 410. Eingeschnittener Wein. In Nordamer.? May. Im F. t.
- 3. V. Ledrusea. Pers. l. o. 1. p. 253. Filziger Wein. In Pensylvan. u. Carolina. May. Jun. Im F. b.
- 4. V. vulpina. Pers. 1. c. Fuchs-Wein. In Virgin. May, Jun. Im F. h...
- 5. V. laciniosa: Pers. 1. c. Petersilien-Wein.
- 6. V. hederacea. Willd. arb. 410. Ephenartiger Weln. 1n Camada. May. Jun. 1m F. h. Cissus hederacea. Pers. 1. c. 1. p. 148.
 Hedera quinquefolia. Lin. sp. pl. 292.
- 7. V. arborea. Lin. sp. pl. p. 294. Baumartiger Wein. In Carol. u. Virgin. May, Jun. K. H. h.

185. Claytonia, Claytonie.

1. Cl. perfoliata. Pers. l. c. Durchwachsene ; Claytonie. In Nordamer. u. auf Cuba. Jul. Aug. Im F. O. Cl. cubeusis. Humboldt et. Bonpl. pl. aequin. 2. p. 91. t. 26.

186. Viola, Veilchen,

niges Veilchen. In Virgin. May. K. H. 24.

- 2. V. oderata. Pers. 1. c. Wehlriesbendes. Veilchen. In Hainen v. Eur. März, Apt. Inc. F. 4. S. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.
 - 3. V. montana. Pers. 1. c. Berg-Veilchen. In Oesterr, u. Deutschlands Auen. May. Im F. 4.
- 4. V. lactes: Pers. 1. c. Milchweißes Veilchen. In Oesterr. u. England. May, Im F. 24.
- 5. V. mirabilis. Pers. I. c. 1. p. 255. Verschiedenblüthiges Veilchen. In Deutschl. u. Schwedens Hainen. May. Im F. 24.
- 6. V. biffora. Pers. 1. c. Zwey Blüthiges Veilchen. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 7. V. tricolor. Pers. 1. c. Dteyfarbiges Veilchen. Auf bebauten Stellen in Eur. May, Jun. Im F. @.
 - 8. V. rothomagensis: Pers. I. c. Normandisches Veilchen. Ant Bergen bey Rouen in Frankr. Jun. Aug. Im. F. 4.
 - 187. Impatiens, Balsamine. ne . n
- 1. I. Balsamina. Pers. I. c. 1. p. 157. Gemeine Balsamine. In Octind. Jun. — Oct. Im F. O.
 - 2. I. Nolitangere. Pers. l. c. Wilde Balsamine. In Hainen v. Euf. u. Canada. Jun. Jul. Im F. F. O.
 - 188. Gomphrena. Winterblume.
 - 1. G. globosa. Pers. l. c. Kugelrunde Winterblume. In Ostind. Jun. Jul. Im F. 3.
 - 2. G. brasiliensis. Pers. 1. c. Brasilische Winterblume. In Brasilien. Sept. Oct. W. H. h.

3. G. interrupta. Pers. I. c. Unterbrochenährige Winterblume. In Jamaica u. Hispaniola. Jul. Ang. W. H. O.

189. Achyranthes, Spreublume.

- 1. A. argentea. Pers. 1. c. 1. p. 258. Weifshiche Spreublume. In Sicil. u. am Csp. May Jul. Ch. 21.
- 2. A. fruticosa. Pers. 1. c. Strauchartige Spreublume. In Ostind. May, Jun. VV. H. b.
 - 3. A. lappacea. Pers. l. c. Klettenartige Spreublume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.
 - 4. A. porrigens. Jacq. hert. schoenbr. 3. p. 54. t. 350. Ausgebreitete Spreublume. In Peru. Jun. Oct. W. H. h.
 - 5. A. axillaris. Hornemann. Achselblüthige. Sprenblume. Apr. Aug. W. H. 5.

· 100. Celosfa, Hahnenkamm.

- 1. C. cristata. Pers. I. c. Gemeiner Hahnen-kamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.
- lachrother Hahnenkamm. In Ostinit. Jun. Jul. VV. H. O.
- W. H. O.

 3. C. virgate. Pers. 1. c. Ruthenförmiger
 Hahnenkamm. May Oct. W. H. b.

191. Illecebrum, Knorpelblume.

1. I. Ianatum. Ait. hort. kew. 1. p. 289. Wollige Knorpelblume. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. O. Achyranthes Ianata. Pers. l. c. 1. p. 259.

192. Buttneria, Buttnerie.

1. B. cordata. Pers. l. c. 1. p. 26s. Herzblättige Buttnerie. In Peru. Apr. — Oct. W. H. h.

193. Heliconia, Heliconie.

- 1. H. Bihai. Pers. l. c. 1. p. 263. Spitzblättrige Heliconie. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. —. VV. H. 4.
- 2. H. humilis. Pers. 1. c. Niedrige Heliconie. Zu Caracas u. Gujana. — . VV. H. 4.
- 3. H. psittacorum. Pers. l. c. Papageyen-Heliconie. In Surinam u. Jamaica. — . VV. H. 4.

194. Strelitzia, Strelitzie.

1. St. Reginae. Pers. l. c. Prächtige Strelitzie. Am Cap. Apr. May. W. H. 2.

195: Theophrasta, Theophraste.

- 1. Th. lengifolia. Pers. l. c. 1. p. 265. Langblättrige Theophraste. Zu Caracas. Jun. — Aug. VV. H. b.
- 2. Th. pinnath. Jacq. fragm. bot. p, 49. n. 168. t. 64-65-66 f. 2. Zu Caracas. —. W. H. t.

196. Rauwolfia, Rauwolfie.

1. R. canescens. Pers. l. c. Graue Rauwolfie. In Jamaica u. den Caraib. Ins. Jun. Jul. W. H. b.

197. Ochrosia, Ochrosie.

1. O. maculata. Juss. gen. p. 144. Gefleckte Ochrosie. Auf Bourbon u. den Inseln des stillen Meeres. Junt — Aug. W. H. h. Ophioxylon Ochrosia. Pers. l. c. 1. p. 266.

198. Arduina, Arduine.

1. A. bispinosa. Mill. ic. t. 300. Zweystachfige Arduine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h. Carissa Arduins. Pers. l. c.

199. Cerbera, Schellenbaum.

1. C. Manghas. Pers. l. c. Ostindischer Schellenbaum. In Ostind. am Wasser. - W. H. b.

200. Allamanda; Allamanda.

1. A. cathartica. Pers. l. c. 1. p. 524. Purgirende Allamanda. An Flüssen zu Gujana u. Surinam, VV. H. h.

201. Vinca, Sinngrun.

- 1. V. minor. Pers. l. c. 1. p. 267. Kleines Sinngrün. In Wäldern v. Deutschl. Frankr. u. Engl. Jun. Jul. Im, F. t.
- 2. V. herbaeca. Pers. 1. c. Krantartiges Sinngrün. In Ungarn. May — Aug. Im F. 21.
- 3. V. major. Pers. l. c. Grosses Sinngrun. Zu Languedoc, Span. u. in der Schweiz. Jun-Jul. Im F. h.
- 4. V. rosea, Pers. l. c. Rosenfarbiges Sinngrün. Zu Madagascar, Ceylon u. Java. May Oct. VV. H. 5.
 - β. flore albo. Mit weißer Blüthe.
 - γ. fance luteo. Mit weißer Blüthe u. gelben Schlunde.

202. Plumeria, Plumerie.

- 1. Pl. rubra. Pers. l. c. Rothblühende Plumerie. In Jamaica u. Surinam, Jun. W. H. h.
- 2. Pl. alba. Pers. 1. c. Weißblühende Plumerie. In Jamaica. —. W. H. h. •

203. Tabernaemontana, Tabernaemontane.

- 1. T. citrifolia. Pers. l. c. 1. p. 168. Citronenblättrige Tabernämontane; Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.
- 2: T. coronaria. Willd. enum. 1. p. 275. Oleanderartige Tabernamontane. In Ostind. Jun. Jul. W. H. b.
 Nerium coronarium. Pers. l. c. 1. p. 269.
 - 3. T. ? Von der St. Moritzinsel.

204. Nerium, Oleander.

- 1. N. Oleander. Pers. l. c. 1. p. 269. Gemeiner Gleander. An den Ufern der Flüsse in Nordafr. u. Ostind. Jun. — Sept. K. H. h.
 - B. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.
 - 7. flavescenti. Mit gelblichgefüllter Blüthe.
- 2. N. odorum. Pers. l. c. Wohlriechender Oleander. In Ostind. Jun. Aug. W. H. h.

205. Echites, Klammerstrauch.

1. E. succulenta. Pers. l. c. 1. p. 271. Saftiger Klammerstrauch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

2. E. difformis. Walter fl. carolin. 98. Ungestalteter Klammerstrauch. In Carolina. —. K. H. 5.

206. Periploca, Schlinge.

- 1. P. gracea. Pers. l. c. Griechische Schlinge. In Syrien u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. t.
- 2. P. africana. Pers. l. c. 1. p. 272. Capische Schlinge. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. b.

207. Cynanchum, Hundswürger.

- 1. C. viminals. Pers. l. c. Blattloser Hundswürger. In Africa u. Ostind. — W. H. J.
- 2. C. crispum. Pers. I. c. Krauser Hunds-würger. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 3. C. acutum. Pers. l. c. 1. p. 273. Spitziger Hundswürger. In Sicil. Span. u. Astrachan. Jun. Jul. K. H. h.
- 4. C. srectum. Pers. l. c. Aufrechter Hunds-wärger. In Syrien. Jun. Aug. K. H. t.

208. Apocynum, Apocynum.

1. A. androsaemifoliam. Pers. l.' c. 1. p. 274. Fliegenfangendes Apocynum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

209. Asclepias, Schwalbenwurz.

1. A. syriaca. Pers. l. c. 1. p. 275. Syrische Schwalbenwurz. Im Orient u. Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

- 2. A curassecies: Pers. 1. c. 1. p. 276. Orangefarbige Schwalbenwurz, In Curassao. Jun. Aug. W. H. 5.
- 3. A. nivea. Pers. l. c. Weifsblüthige Schwalbenwurz. In Virgin. n. dem wärmer. Amer. Jun. Jul. K. H. 4.
- 4. A. angustifolie. Willd. enum. suppl. p. 13. Schmalblättrige Schwalbenwurz. . Jul. Aug. K. H. 24.
- 5. A. fuscata. Willd. l. c. Braune Schwalbenwurz. -. -. K. H. 21.
- 6. A. incarnata. Pers. l. c. Rothblühends Schwalbenwurz. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. Im F. 4.
 - 7. A. fruticesa. Pers. 1. c. Strauchartige Schwalbenwurz. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
 - 8. A. Vincetoxicum. Lin. sp. pl. p. 314. Gemeine Schwalhenwurz. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24. Cynanchum Vincetoxicum. Pers. l. c. 1. p. 274.
 - 9. A. nigra. Liu. sp. pl. p. 315. Schwarze Schwalbenwurz. Auf Hügeln zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 4. Cynanch. nigrum. Pers. l. c.
- 10. A. tuberosa. Pers. l. c. 1. p. 277. Knol. lige Schwalbenwurz. In Carol. Jun. Aug. K. H. 24.

210. Schollia, Schollie.

1. Sch. crafsifolia. Jacq. ecleg. plant. fasc.
1. p. 5. t. 2. Dickblättrige Schollie. An der Meerenge von Sunda zwischen Sumatra u. Java ut in China. Jun. — Aug. VV. H. †

Asclepias carnosa. Pers. l. c. 1. p. 275.

211. Stapelia, Stapelie.

- 1. St. glauca. Jacq. Stap. monog. Grangrun: Stapelie. Am Cap auf sehr trocknen Stelle wie alle folgende. Jul. Aug. W. H. h. St. revoluta. Pers. l. c. 1: p. 278.
- 2. St. kirsuta, Pers. l. c. Haarige Stapelie. Jul. Sept. W. H. 5.
- 3. St. patula. Willd enum. 1. p. 231. Abstehenie Stapelie. Jul. Sept. W. H. h. St. sororia. Pers. l. c.
- 4. St. sororia. Willd. 1. c. Verschwesterte Stapelie. Jul. — Sept. W. H. 5. St. sororia varietas: Jacq. 1. c.
- 5. St. grandistora. Pers. 1. c. Grossblühende Stapelie. Jul. Aug. W. H. 5.
- 6. St. ambigua. Pers. l. c. Vielblüthige Stapelie. Jul. — Sept. W. H. 5.
- 7: St. maculota. Jacq. l. c. Fleckige Stapelie. Jul. Sept. W. H. p.
- 8. St. Asterias. Pers. 1. c. Sternförmige Stapelie. Jul. Aug. W. H. h.
- 9. St. deflexa. Jacq. l. c. Herabgebogene Stapelie. Jul. Oct. W. H. 5.

- 10. St. bufonia. Jacq. 1. c. Krötten Stapelie. Jul. Sept. W. H. h.
- 11. St. triculca: Jacq. l. c. Dreyfurchige Stapelie. Jul. Sept. W. H. h.
- 12. St. gemmiffora. Pers. l. c. Knospenblüthige Stapelie. Jul. Aug. W. H. h.
- 13. St. replicate. Jacq. 1. c. Zurückgebogene Stapelie. Jul. Aug. VV. H. 5.
- 14. St. divaricata. Fers. 1. c. Ausgebreitete Stapelie. Aug. Oct. W. H. h.
- 15. St. caespitosa. Pers. l. c. Rasen-Stapelie. Jul. Aug. VV. H. b.
- 16. St. concinna? Pers. l. c. 1. p. 279. Zierliche Stapelie. —. VV. H. . . .
- 17. St. glandulifera. Pers. l. c. Drüsenblüthige Stapelie. Jul. Aug. VV. H. . .
- 18. St. hirtella. Jacq. l. c. Rauhhaarige Stapelie. Jun. Jul. VV. H. f.
- 19. St. pedunculata. Pers. l. c. Langstielige Stapelis: Jul. Aug. VV. H. 5.
- 20. St. vetula. Pers. l. c. 1. p. 280. Dunkle Stapelie. Jul. — Sept. W. H. 5.
- 21. St. planiflora. Jacq. 1. c. Flachblüthige Stapelie. Jul. Aug. VV. H. 5.
- 22. St. variegata, Pers. l. c. Bunte Stapelie. Jul. Oct. W. H. h.
- 23. St. reticulata. Pers. 1. c. Netzförmige Stapelie. Jul. Aug. W. H. h.
- 24. St. marmorata. Jacq. l. c. Marmoritto Stapelie. Aug. Sept. VV. H. 5.

- 25. St. tubata. Jacq. l. c. RöhrigeStapelie. Jul. Aug. W. H. 5.
- 26. St. clavata, Pers. l. c. Keilenartige Stapelie. Jul. Aug. Ch. b.

212. Spigelia, Spigelie.

1. Sp. marilandica. Pers. l. c. 1. p. 281. Marilandische Spigelie. In Virgin. Mariland a. Carol. May - Jul. K. H. 24.

213. Chironia, Chironie.

- 1. Ch. baccifera. Pers. l. c. 1. p. 282. Beerentragende Chironie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. \$.
- 2. Ch. frutescens. Pers. l. c. Strauchartige Chironie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.

DIGYNIA.

214. Gentiana, Entzian.

- 1. G. pannonica. Pers. l. c. 1. p. 284. Pannonischer Entzian. In Oesterr. und Steyermauf Alpen, Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. G. asclepiadea. Pers. 1. c. Schwalbenwurzertiger Entzian. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Spanien. Jul. Aug. Im F. 4.
- 3. G. cruciata. Pers. 1. c. Kreuz Entzian. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. G. Pnoumonanthe. Pers. 1. c. Gemeiner Entzian. Auf feuchten VViesen in Eur, u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.

- 5. G. acaulis. Lin. sp. pl. p. 330: Stongelleser Entzian. Auf Alpen im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24. G. grandiflora. Pers. l. c. 1. p. 285.
- 6. G. verna. Pers. 1. c. Frühlings-Entzian. Auf Alpen in Oesterr. Steverm. der Schweiz a. den Pyrenäen. May - Jul. Im F. 2.
- 7. G. Amarella. Pers. 1. c. 1. p. 286. Deutscher Entzian. Auf Bergen in Eur. Jul. Oct. Im F. O. G. germanica. Willd. sp. pl. 1. p. 1346.
- 8. G. ciliata. Pers. I. c. 1. p. 287. Gefranze. ter Entzian. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Italien auf Bergen. Jul. Oct. Im F. 4.
 - 215. Dichondra, Zweykorn.
- 1. D. zericea, Pers. 1. c. 1. p. 188. Seidenartiges Zweykorn. In Jamaica, Peru u. auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. VV. H. 24.
- 2. D. argenteq. flumboldt et Bonpland. Silberblättriges Zweykorn. Im wärmer. Amer. —. W. H. 2.
 - 216. Heuchera, Heuchere.
- 1. H. americana. Pers. I. c. 1. p. 200; Americanische Heuchere. In Pensylvan, u. Carol. Jun.
 Aug. Im F. 4.
 - 217. Ulmus, Rüster.
- 1. U. campestris. Pers. l. c. 1. p. 291. Ge-meiner Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. 5.
- 2. U. suberosa. Pers. 1. c., Kork Rister, In Eur. Apr. May. Im F. h.

- In Par. Apr. May. Im F. 5.
- 4. U. americana. Pers. 1. c. Americanischer Rüster. In Nordamer. Apr. Im F. .
- 5. U. parvifolia. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 26s. Kleinblättriger Rüster. Am Caspischen Meere Sept. Oct. K. H. b.. Planera Richardi. Pers. 1. c.

218. Planera, Planere.

1. Pl. aquatica. Pers. l. c. Wasserliebende Planere. An den Ufern der Flüsse Ohio u. Missisipi. Apr. May. In F. h.

219. Geltis, Zürgelbaum.

- baun. In Sudeur. dem Banat u. Nordafr. May. K. H. h.
- Americanischer Zürgelbaum. In Virgin. u. Pensylvan. May, Jun. Im. F. t.
- 3. C. Tournefortii. Pers. l. c. Tournefortischer Zürgelbaum. In Armenien. . K. H. h.
 - 220. Atriplex, Melde.
- 1. A. Halimus. Pers. l. c. Strauchartige Melde. Am Meerstrande in Span. Portug. England, der Barbarey u. Sibir. Jun. Jul. R. H. h.
- 2. A. odorata. Pers. l. c. 1. p. 293. Wohlriechende Melde. Am Cap. Jan. — Aug. Ch. t. A. albicans. Ait hort. kew. 3. p. 430.

3: A portulacoides: Pers. l. c. Portulak-Melde An den Europ. Meeresküsten: Jun, Jul-K. H. h.

221. Chenopodium, Gaensefuss.

- 1. Ch. Botrys. Pers. l. c. 1. p. 294. Eichenblättriger Gänsefuls. In Südeur. Jun. — Aug. Im F. O.
- 2. Ch. suffreticoram. Willd. enum. 1. p. 290. Staudenartiger Gänsefuß. In Mexico u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. 5.
- 3. Ch. pauciflorum. Von Portenschlag Ledermeyr. Armblühender Gänsefuß. —. May Jul. K. H. h.
- 4. Ch. scoparium. Pers. l. c. 1. p. 295. Besenartiger Gänsefus. In Krain, Griechenland, China. u. Japan. Aug. Im F. O.

222. Beta, Mangold.

1. B. trygina. Pers. l. c. Dreyweibiger Mangold. In Syrmien u. im Banat. Jun. Im F. 2.

223. Salsola, Salzkraut.

- 1. S. Kali. Pers. l. c. Gemeines Salaksaut. An den Meeresküsten v. Eur. Jun. Jul. Im F. O.
 - 2. S.Soda. Pers. l. c. Glattet Salzkraut: (Sode). Auf salzigem Boden in Südeur. Jun. Jul. Im. F. O.
 - 3. S. sericea. Ait. hort. kew. 1. p. 317. Scidenartiges Salzkraut. Am Cap. —. Ch. t. S. diffusat Pers. 1. c. 1. p. 296, Chenolea diffussa. Thunb. nov. gen. p. 10.

4. S. fruticosa. Pers. 1. c. Stranchartiges Salzkraut. Am Meerstrande in Südenr. Jun. Jul. K. H. b.

224. Anredera, Anredere.

1. A. spicata. Peré. l. c. 1. p. 297. Achrentragende Anredere. In Peru. Jun. Jul. W. H. 24. Basella vesicaria. Lamark encycl. 1. p. 382.

225. Bosea, Goldruthenbaum.

1. B. Yervamora, Pers. l. c. Canarischer Goldruthenbaum. Auf den Canarisch. Ins. —. Ch. t.

226. Phyllis, Phyllis.

1. Ph. Nobla. Pers. l. c. 1. p. 298. Schöne Phyllis. Auf den Canarischen Ins. Jun. Jul. Ch. 5.

227. Panax, Kraftwurz.

1. P. aculeatum. Ait. hort. kew. 3. p. 448-Stachlige Kraftwurz. In China. Jun. Jul. Ch. h.

228. Cussonia, Cussonie.

1. C. thyrsiflora. Lin. suppl. 182. Keilblättrige Cussonie. Am Cap. Jul. Ch. t. . G. thyrsoidea. Per. l. c.

229. Eryngium, Mannstreu.

- 1. E. Bourgati. Pers. I. c. 1. p. 299. Weisstachlige Mannstreu. In Südfrankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. E. planum. Pers. 1. c. Flachblättrige Mannstreu. In Oesterr. Südfrankr. Pohlen u. Ruisland. Jun. Jul. Im F. H.

230. Astrantia, Astrantie.

- 1. A. Epipactis. Pere. l. c. 1. p. 304. Grüne Astrantie. Auf waldigen Bergen in Innerösterr. Ungarn u. Croatien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. A. major. Pers. I. c. Grosse Astrantic. Auf südenrop. Bergen. Jun. Aug. Im F. 4.
- 3. A. minor. Pers. 1. c. Kleine Astrantic. Auf den Kärnthnerischen, den Schweizeralpen u. den Pyrenäen. Jun. Aug. Im F. 24.

231. Bupleurum, Hasenohrlein.

- 1. B. faloatum. Pers. 1. c. Sichelblättriges Hasenöhrlein. Auf Kalkhügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Jun, — Aug. Im F. 4.
- 2. B. fruticosum. Pers. l. c. 1. p. 305. Strauchartiges Hasenöhrlein. In Südfrankr. u. im Orients Jan. Aug. K. H. h.
 - 3. B. difforme. Pers. 1. c. Zweyförmiges Hasenöhrlein. Am Cap. Sept. Oct. Ch. h.

232. Caucalis, Haftdolde.

1. C. pulcherima. Willd. enum. 1. p. 305. Schönste Haftdolde. Am Caucasus u, in Iberion. Jun. Im F. 6. Caucalis orientalis. Pers. 1. c. 2. p. 306.

233. Conium, Schierling.

1. C. maculatum. Pers. l. c. 1. p. 308. Gedeckter Schierling. In Eur. Jun. Jul. Im F. J.

234. Athamanta, Hirschwurz.

1. A. crotensis. Pers. I. c. a. p. 340. Gebirgs-Hirschswurz. In Oesterr. n. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

235. Crithmum, Bacille.

1. C. maritimum. Pers. l. c. 1. p. 311. Sec-Bacille. Am Meerstrande. In Eur. Jun. Jul. K. H. b.

236. Ferula, Seckenkraut.

1. F. glauca. Pers. l. c. Graugrunes Seckenkraut. In Sicil. u. Ital. Jul. K. H. 4.

237. Laserphiam, Laserkraut,

1. L. aquilogifolium. Pers. l. c. 1: p. 312. Ackeleyblättriges Laserkraut. Auf steinigen Hügeln in Oesterr. Jun. Jul. Im F. 21.

2. L. hispidum. Bieberst, fl. taurico-caucasica 1. p. 221. Borstiges Laserkraut. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 4.

238. Heracleum, Heilkraut.

- t. H. angustifolium. Pers- l. c. t. p. 314. Sohmalblättriges Heilkrant. In Dentschl. Schwaben u. England. Jun. Jul. Im F. 2.
- 4. H. austriacum. Pers. 1. c. Oesterreichisches Heilkraut. Auf Alpen in Oesterr. Jal. Aug. Im F. 24.

239. Ligusticum, Liebstöckel.

1. L. Levisticum. Pers. 1. c. Gawöhnliches Liebstöckel. Auf den Genuesischen Apenninen. Jun. Jul. Im F. 2.

240. Angelica, Engelwurz.

- 1. A. Archangelica. Pers. l. c. 1. p. 315. Garten-Engelwurz. Anf Alpen in Kärnthen, Lappl. u. den Carpathen. Jan. Jul. Im F. J.
 - 2. A. sylvestris. Pers. 1. c. Wald-Engelwurz. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

241. Sison, Sison.

1. S. canadense. Lin. sp. pl. p. 363. Canadisches Sison. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24. Chaerophyllum canadense. Pers. l. c. 1. p. 320.

242. Bubon, Bubon.

- n. B. macedonicum. Pers. 1. c. 1. p. 317. Macedonisches Bubon. In Macedon. n. Mauritan. Jun. Jul. K. H. 7.
- 2. B. Galbanum. Pers. l. c. Galban-Bubon. Ani Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
- 3. B. laevigatum. Pers. l. c. Glattes Bubon. Am Cap. —. Ch. h.

243. Aethusa, Gleiss.

1. Ac. Meum. Lin. syst. veg. p. 237. Bär-wurz-Gleis. Auf Alpenwiesen in Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Spanien. May, Jun. Im F. 4. Meum Athamanta. Pers. l. c. 1. p. 319.

244. Scandix, Kerbel.

1. Sc. Cerefolium. Lin. sp. pl. p. 368. Gemeiner Kerbel. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. O. Chaerophyllum sativum. Pers. I. c. 1. p. 320.

245. Chaerophyllum, Kälberkropf.

1. Ck. aromaticum. Pers. l. c. Gewürzhafter Kälberkropf. In Oesterr. der Lausitz, Meissen u. Schlesien. Jul. Aug. Im F. 4.

246. Imperatoria; Meisterwurz.

1. J. Ostruthium. Pers. l. c. 1. p. 321. Gemeine Meisterwurz. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. zu Auvergne in Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

247. Pastinaca, Pastinak.

- 1. P. sativa. Pers. l. c. 1. p. 323. Gemeiner Pastinak. Auf Wiesen im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. J.
- 2. P. Opopanax. Pers. l. c. Gummiger Paminak. In Ital. u. Sicil. Jun. Jul. Im F. 4.

248. Smyrnium, Smyrnium.

- 1. S. perfoliatum. Pers. l. c. Durchwachsenes Smyrnium. In Ungarn auf dem Robelberge an der March, Ital. Candien u. Span. May, Jun. Im F. J.
- 2. S. aureum. Pers. 1. c. Goldfarbiges Smyraium. Auf Bergen in Carol. —. Im F. 4.
- 3. S. integerrimum. Pers. 1. c. Ganzblättriges Smyrnium. In Virgin. Jun. Im F. 4.

249. Anethum, Dill.

1. A. graveolens. Pers. 1. c. 1. p. 323. Ge-meiner Dill. In Südenr. Jun. Jul. Im F. O.

2. A. Foeniculum, Pers. 1. c. Fenchel-Dill. Auf Felsen zu Languedoc, Gasconien u. Madera. Jun. Jul. Im F. 24.

250. Carum, Kümmel.

1. C. Carvi. Pers. 1. c. Gemeiner Kümmel. Auf Wiesen im nördlicher Eur. Jun. Jul. 1m F. J.

251. Apium, Eppich.

- 1. A. Petroselinum: Pers. l. c. 1. p. 324. Petersilien-Eppich. In Sardinien an Quellen. Jun. Jul. Im F. &.
- 2. A. graveolens. Pers. L. c. Sellerie-Eppich. Auf feuchtem salzigen Boden in Eur. Jul. Aug. Im F. &.

252. Aegopodium, Giersch.

1. A. Podagraria, Pers. l. c. Gemeiner Giersch. An Zäunen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

253. Rhus, Sumach.

- 1. Rh. Coriaria. Pers. l. c. Gerber-Sumach. În Südeur. Dalmatien, Syrien u. Palästina. Jun. Jul. K. H. h.
- 2. Rh. typhinum. Pers. l. c. Virginischer Samach. (Essigbaum). In Virgin. Jun. Jul. Im F. h.
- 3. Rh. glabrum. Pers. l. c. Glatter Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. t.
- 4. Rh. Vernix. Pers 1. c. Firnis Sumach. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 1.

- 5. Rh. succedaneum, Pers. l. c. Japanischer Samach. In Japan n. Chias. Jun. Jul. Cn. 5.
- 6. Rh. Copallinum. Pers. l. c. Copall. Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. h.
- 7. Rh. radicans. Pers. 1. c. 1. p. 325. Wurzelnder Sumach. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. b.
 - B. Toxicodendrum. Mit buchtigen Blättern.
- 8. Rh. suaveolens. Pers. l. c. Wohlriechende? Sumach. In Nordames. K. H. h.
- 9. Rh. tomentosum. Pers. l. c. Filziger Sumach. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 10. Rh. villosum. Pers. 1. c. Haariger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 11. Rh. atomarium. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 51. t. 343. Kleingetupfter Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. b.
- 12. Rh. viminale. Pers. l. c. Weidenblättriger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
- 13. Rh. penduliaum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 24. t. 449. Hängender Sumach. Am Cap. Jul. Aug. 6h. 5.
- 14. Rh. Thezera. Pers. l. c. Fünfblättriger Sumach. In Sicil. u. der Barbarey. . K. H. h.
- dornartiger Sumach. In Africa. -. Ch. 5.
- 16. Rh. laevigatum. Pers. 1. c. 1. p. 326. Unbehaarter Sumach. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5. Rh. elongata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 52. t. 345.

17. Rh. lucidum. Pers. I. c. Glänzender Sumach. Am Cap u. in Mexico. Jan. Jul. Ch. 5.

18. Rh. undulatum. Pers. I. c. Wellenblättriger Sumach. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. b.

mach. In Oesterr. Ungarn., Südeur. u., Sibir. Juh. Jul. Im F. 5.

20.)
21.) Drey noch unbeschriebene Arten vom Cap.

.22.)

254. Viburnum, Schneeball.

1. V. Tinus, Pers. l. c. Lorbeerartiger Schneeball. In Portug. Span. Ital. u. der Barbarey. Jnl. Aug. K. H. h.

B. tucidam. Ait. hort. kew. p. 370. Mir gläpzenden Blättern.

Viburn. lucidum. Pers. L c.

Schneeball. Auf den Canarischen Ins. —. Ch. b. B. strictiffi Hortulan. Mit geradelienigen Aesten.

3. V. prunifolium. Pers. I. c. Planmenblättriger Schneehalt. In Virgin, n. Canada. Jun. Jpl. Im F. 5.

ball. In Pensylvan. Virgin, u. Carolina. Jun. Jul. Im F. 5.

Schnecheil. (Schlinghaum). In Wäldern v. Eur. Jun Jul. Im F. 5.

- 6. V. Opulus, Pers. 1. c. Gemeiner Schneeball. In Wäldern v. Eur, Jun. Jul. Im F. \$.
 - 8. roseum Mit durchgehends unfruchtbar. Blüthen.
 - y. foliis variegatis. Mit gestreiften Blättern.
- 7. V. Lentago. Pers. l. c. Birnenblättriger Schneeball. In Canada. Jun. Jul. Im F. b.
- 8. V. eassinoides. Pers. 1. c. Dickblättriger Schneeball. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. 5.
- 9. V. punicaefolium. Catalog. hort. carlsru. han. p. 280. Granatapfelartiger Schneeball. In Nordamer. — K. H. h.

255. Cassine, Cassine.

- 1. C. capensis. Pors. l. c. Capische Cassine.
 - 2. C. Maurocenia. Pers. 1. c. Lederblättrige Cassine. Am Cap u. in Aethiqp. Jun. Jul. Ch. 5,

256, Sambueus, Hollunder,

- 1. S. Rbulus: Pers. 1. c. 1. p. 328. Zwerg-Hollunder. Attich. Im südlicher. Eur. u. der Barbarey. Jun. Jul. 1m F. 4.
- 2. S. nigra, Pers. I. c. Gemeiner Hollunder. In Eur. u. Japan. Jun. Jul. Im F. 5.
- 8. foliis variegatis. Mit gestreiften Blättern.
- 3. S. canadensis. Pers. 1. c. Canadischer Hollunder. In Canada u. Carol. Jun. Jul. Im F. b.

- 4. S. racemesa. Pers. I. c. Trauben-Hollunder. Auf waldigen Bergen in Südeur. Jun. Jul. Im F. b.
 - 257. Staphylea, Pimpernuss.
- 1. St. pinnata. Pers. l. c. Gemeine Pimpernufs. Im südlicher, Eur. May, Jun. Im F. 5.
- 2. St. trifolia. Pers. l. c. Virginische Pimpernuss. In Virgin. Jun. Jul, Im F. h.
 - 258. Tamarix, Tamariske.
- 1. T. gallica. Pers. l. c. Französische Tamariske. In Südeur. u. Nordasien. Aug. Oot. Im F. t.
- 2. T. garmanica. Pers. 1: o. Deutsche Tamariske. An Ufern der Flüsse in Deutschl. Jun. Jul. Im F. b.
 - 259. Turnera, Turnere, be-
- 1. T. ulmifolia. Pers. l. c. 1. p. 329. Rüsterblättrige Turnere. In Jamaica u. anderen Gegenden des wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. b.
 - 260. Modecca, Modecca.
- 1. M. lobata. Jacq. fragm. bot. p. 82. n. 255. t. 131. Lappige Modecca. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. h.
 - 261, Basella, Beerblume.
- Beerblume, In Ostind. Jun. W. H. O.
- 2. B. alba. Pers. 1. c. Weisse Beerblume. In China u. Amboina. Jun. W. H. O.

اند

3. B. sordifolia. Peri. h. c. Herzblättrige Beerblume. In Ostind. Jun. VV. H. O.

262. Portulacaria, Portulachaum.

1. P. afra. Pers. l. c. Africanischer Portulacbanni: In Africa. — . Ch. † . Claytonia Portulacaria. Lin. mant. 211.

TETRAGYNIA.

463. Parnassia, Parnassie.

1. P. palustris. Pers. 1. c. Weisse Parnassic. An sumpfigen Stellen in Eur. Sept. Oct. Im F. 4.

PENTAGYN-I.A.

264. Aralia, Aralie.

- 1. A. arborea. Pers. l. c. Baumartige Aralie. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. 5.
- e. A. capitata. Pers. l. c. Kopibluthige Arane. Auf Bergen zu Jamaica n. den Antill. Jul. W. H. 5.
- 3. A. spinosa. Pers. I. c. 1. p. 332. Stachlige Aralie. In Virgin v. Carol. Aug. Im F. h.
- 4. A. racemosa. Pers. l. c. Traubige Aralie. In Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

265. Armeria, Grasnelke.

1. A. vulgaris, Willd. enum. 1. p. 333. Gemeine Armerie. Auf sandigem Boden in Eur. Jun — Aug. Im F. 4.. Statice Armeria. Pers. 1. c.

- 2. A. denticulata. Bertoloni cent. pl. sicol. p. 4. Gezähnelte Grasnelke. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. 4.
- 3. A. fasciculata. Willd. l. c. 1. p. 334. Buschige Grasnelke. Zu Corsica u. Portug. Jun. Aug. K. H. ‡. St. fasciculata. Pers. l. c.
- 4. A. plantaginea. Willd. l. c. Wegetrittarlige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. A. latifolia. Willd. 1. c. Breitblättrige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. 1m F. 24. Statice cephalotes. Pers. 1. c.
 - 266. tatice, Statice.
 - 1. St. Limonium. Pers. 1. c. 1. p. 333. Meerstrands-Statice. Am Meerstrande in Eur. u. Virgin. Jun. Aug. Im F. 24.
 - e. St. Gmelini. Pers. l. c. Gmelinsche Statice. In Ungarn u. Sibir. Jun. Aug. Im F. 24.
- g. St. scoparia. Pers. 1. c. Besen Statice. In Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 4. St. spathulata. Pers. 1. c. Spatelblättrige Statice. Zu Montpellier u. in der Barbarey. Jun. Aug. K. H. 24.
- 5. St. virgata. Willd, enum. 1. p. 336. Ruthenförmige Statice. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 21.
- 6. St. tatarica. Pers. I. c. Tartarische Statice. In der Tartarey. Jun. Aug. Im F. 24.

- 7. St. purpurata. Pers. l. c. 1.p. 334. Purpurfarbige Statice. Am Cap. Jun. Aug. Ch. 4.
- 9. St. sinuata. Pers. l. c. Leyerblättrige Stetice. In Sicil. Palästina u. Atrica. Jun. -- Aug. K. H. 4.
- 10. St. mucronata. Pers. I. c. Krausblättrige Statice. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. h.

267. Linum, Flachs.

- 1. L. perenne. Pers. l. c. Ausdauernder Flachs. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. L. tenuifolium. Pers. l. c. 1. p. 335. Feinblättriger Flachs, Auf dürren Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 21.
- 3. L. maritimum. Pers. l.c. Meerstrands-Flachs. In Oesterr. bey Baden, zu Montpellier, im Orient u. in Italien. Jul. Aug. 1m F. 24.
 - 4. L. austriacum. Pers. l. c. Oesterreichischer Flachs. In Oesterr. Jun. Jul. Im F.
 - 5. L. flavum. Pers. l. c. 1. p. 336. Gelber Flachs. In Oesterr. Deutschl, u. Ruisland. Jun. Ang. Im F. 24.

6. L. trigynum. Smith. exotic bot. 1. p. 31. t. 17. Dreystieliger Flachs. In Ostindien. Jun. Jul. VV. H. h.

268. Crassula, Dickblatt.

- 1. Cr. voccinea. Lin. sp. pl. p. 404. Scharlachrothes Dickblatt. Ist wie die meisten folgenden am Cap u. in Aethiop. zu Hause. Jun. Jul. Ch. h.
 Larochea coccinea. Pers. l. c. 1. p. 337.
- e. Cr. dejecta. Jacq. hort, schoenbr. 4, p. 16. 433. Liegendes Dickblatt. Jul. Sept. Ch. 5.
- 3. Cr. alba. Hort. carlsruhan. Weißes Dickblatt.
- 146 Cr. falcata. Wendl. obs. 44. Sichelblättriges Dickbiatt. Jul. Sept. Ch. 5.

 Larochea falcata. Pers. 1. c.
 - 8. major. Mit stärkerem Wuchse,
- 5. Cr. perfoliata. Pers. 1. c. 1. p. 338. Durch-wachsenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.
- 6. Cr. perforata. Pers. l. c. Durchstochenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. b. Cr. perfosa. Decand. pl. succ. t. 25. Cr. perfosa. Scop. del. fl. et faun. insub. 3. p. 12. t. 6.
- 7. Cr. mollis. Pers. l. c. Weiches Dickblatt. Jun. Jul. Ch. 5.
- 8. Cr. tetragona. Pers. 1. c. Viereckiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. t.
- 9. Cr. imbricata. Pers. 1. c. Schuppenblättriges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.

- 10. Cr. obvallata. Pers. l. c. Messerrücken förmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. p.
- 11. Cr. capitata. Dum. Cours. botaniste cultivateur 5. p. 272. Kopfförmiges Dickblatt. —. Ch. b.
- 12. Cr. cultrata. Pers. h c. Messerförmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. h.
- 13. Cr. portulacacea. Pers. l. c. Portulacartiges Dickblatt. Jän. Febr. Ch. 5.
- 14. Cr. spathulata. Pers l. c. Spatelblättriges Dickbiatt. May — Aug. Ch. h.
 - 15. Cr. marginalis. Pers. l. c. Punktirtrandiges Dickblatt. May Decemb. Ch. t.
 - 16. Cr. cordata. Pers. l. c. Herzblättriger Dickblatt. Jun Jul. Ch. h.
 - 17. Cr. lactea. Pers. l. c. Milchfarhiges Dickblatt. Jän. — März. Ch. h.
 - 18. Cr. arborescens. Pers. I. c. Baumartiges Dickblatt. Jun. Jul Ch. †. C. Cotyledon. Jacq. misc, 2, p. 295. t. 19.
 - 19. Cr. acutifolia. Pers. l. c. 1. p. 339. Spitzblättriges Dickblatt. —. —. Ch. fb.
 - 20. Cr. orbicularis. Pers. t. c. 1. p. 340. Sternblättriges Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 21. Cr. pellucida. Pers. l. c. Durchscheinendes Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 4.
- 22. Cr. Umbella. Jacq. collect. 4. p. 172. Icon. pl. rar. 2 t. 352. Dolden Dickblatt. Am Cap. Jänn. Febr. Ch. 24.

POLYGYNIA.

269. Zanthorhiza, Gelbwurz.

1. Z. apiifolia. Pers. l. c. 1. p. 341. Sellerieblättrige Gelbwurz. In Neugeorgien u. Carol. März, Apr. K. H. b.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

270. Musa, Pisang.

- 2. M. paradisiaca, Pers. l. c. 1. p. 343. Gemeiner Pisang, In Ostind. Jun. Aug. W. H. 4.
- 2. M. maculata. Jacq. hort. schönbr. 4. p. 23. t. 446. Gefleckter Pisang. Auf der St. Morritzinsel. Jun. Aug. W. H. 4.
- 3. M. rotacea. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 22. t. 445. Rosenartiger Pisang. Auf der St. Moritzinsel. Novemb. Apr. W. H. 4.
- 4. M. sapientium. Pers. 1. c. Bananen-Pisang. In Ostind. Jun. Aug. W. H. 24.
- 5. M. coccinea. Pers. l. o. Scharlachrother Pisang. In China. Jun. — Aug. W. H. 4.

271. Bromelia, Ananas.

1. Br. Ananas. Pers. 1. c. Gemeine Ananas. Im wärmer. Amer. May, Jun. W. H. 5.

- 2/ Br. Karatas. Pers. l. c. 1. p. 344. Wilde Ananas. In Südamer. May, Jun. W. H. 5.
- 3. Br. chrysantha. Pers. l. c. Goldfarbige Ananas. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. b.
- 4. Br. humilis. Pers. 1. A Niedrige Ananas.

 May, Jun. W. H. 5.

272. Pitcairnia, Pitcairnie.

- 1. P. bromeliaefolia. Pers. l. c. Ananasblätttrige Pitcairnie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. 24.
- 2. P. latifolia. Pers. l. c. Breitblättrige Pitcairnie. In Westind. Jun. Jul. W. H. 4.

273. Tillandsia, Tillandsie.

1. T. lingulata. Pers. 1. c. 1. p. 345. Zungenblättrige Tillandsie. In Südamerica schmarosend auf alten Bäumen. —. W. H. b.

274. Tradescantia, Tradescantie.

- 1. Tr. virginica. Pers. l. c. 1. p. 346. Virginische Tradescantie. In Virgin. u. Carol. Jun., Jul. Im F. 24.
- 2. Tr. discolor. Pers. l. c. 1. p. 347. Violetblättrige Tradescantie. Am Mexicanisch. Meerbusch. Jun. Jul. VV. H. 4.
- 3. Tr. Zanonia. Pers. 1. c. Scheidenblüthige Tradescantie. In Jamaica u. Gujana. Jun. Jul. W. H. h.

275. Pontederia, Pontederie.

1. P. cordata. Pers. 1. c. 1. p. 343. Herzblättrige Pontederie. In Wässern v. Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.

276. Haemanthus, Blutblume.

- 1. H. coccineus. Pers. l. c. Scharlachrothe Blutblume. Am Cap sammt den folgenden. Jul. Aug. Ch. 24.
- 2. H. coarctatus. Pers. 1. c. Gedrängtbläthige Blutblume. Aug. Ch. 24.
- 3. H. hyalocarpus. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 5. t. 409. Glasfrüchtige Blutblume. Am Cap. Sept. Ch. 21.
- 4. H. puniceus. Pers. 1. c. Dunkelrothe Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 5. H. tigrinus. Pers. 1. c. Getiegerte Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.
 - 6. H. quadrivalvis. Pers. I. c. Vierklappige Blutblume. Jun. Jul. Ch. 4.
 - 7. H. albiftos. Pers. l. c. Weiße Blutblume. Jun. Aug. Ch. 24.
 - 8. H. moschatus. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 6. t. 410. Bisamduftende Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.

277. Malsonia, Massonie.

- 1. M. latifolia. Pers. l. c. Breitblättrige Massonie. Am Cap, wie alle folgende. Aug. Sept. Ch. 24.
- 2. M. pustulata. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 27. t. 454. Blasige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.
- 3. M. angustifolia. Pers. l. c. 1, p. 349. Schmalblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

- 4. M. longifolia. Pers. h. c. Langhlättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.
 - 278. Galanthus, Schneeglöckehen.
- 1. G. nivalis. Pers. I. c. Gemeines Schneeglöckehen. Auf Wiesen in Österr. Deutschl. u. Ital. Febr. März. Im F. 4.

279. Leucoium, Knotenblumc.

- 1. L. vernum. Pers. l. c. Frühlings Knotenblume. In Auen von Oesterr. Deutsl. der Schweiz u. Ital. Apr. May. Im F. 24.
- 2. L. aestivum. Pers. 1. c. Sommer-Knotenblume. In Oesterreich. u. Südenr auf Sumpfwiesen. May, Jun. Im F. 4.

280. Strumaria, Kropflilie.

- 1. St. linguaefolia, Pers. l. c. Zungenblättrige Kropililie. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 24.
- 2. St. filifolia. Pers. 1. c. Fadenblättrige Kropflilie. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 4.

281. Tulbagia, Tulbagié.

1. T. alliacea, Pers. l. c. Knoblauchartige Tulbagie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

282. Narcissus, Narzisse.

- 1. N. posticus. Pers. l. c. Rothrandige Narzisse. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz Ital. u. Languedoc. May, Jun. Im F. 24.
- 2. N. Pseudo Narcissus. Pers. l. c. 1. p. 350. Gemeine Narzisse. In Deutschl. Ital. Span. Engl. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

- 3. N. odorus. Pers. 1. c. Wohlriechende Narzisse. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.
- 4. N. Tazetta, Pers I. c. Tazetten Narzisse. Am Meerstrande in Südeur. May, Jun. Im F. 24.
- 5. N. Jonquilla. Pers. 1. c. Jonquillen Narzisse. In Span. u. im Orient. May, Jun. Im F. 24.

283. Pancratium, Gilgen.

- 1. P. caribaeum. Pers. l. 1. p. 351. Caraibische Gilgen. In Jamaica u. den Caraibisch. Ins. May — Oct. W. H. 4.
- 2. P. maritimum. Pers. 1. c. Meerstrands-Gilgen. Am Meerstr. in Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. K. H. 24.
- 3. P. littorale. Pers. l. c. Ufer-Gilgen. Auf der Insel Terrabomba im wärmeren Amer. Jul. Aug. VV. H. 4.
- 4. P. declinatum. Pers. l. c. Niedergebogene Gilgen. Anf den Antillen. - W. H. 4.
- 5. P. illyricum. Pers. l. c. Illyrische Gilgen. Am Meerstrande in Frankr. Jun. Jul. K. H. 4.
- 6. P. amboinense. Pers. 1. c. Amboinische Gilgen. Auf Amboina. —, VV. H. 4.

284. Crinum, Hackenlilie.

- 1. Cr. asiaticum. Pers. l. c. 1. p. 352. Asiatische Hackenlilie. In Malabar, Zeylon u. Amer. Jul. Aug. W. H. 24.
- 2. Cr. americanum. Pers. l. c. Americanische Hackenlilie. Im wärmer Amer. Jun. Jul. W. H. 4.
 - β. latifolium. Mit breiteren Blättern.

- 3. Cr. Commelini. Jacq. hort. schönhr. 2. p. 40. t. 202. Commelinsche Hackenlilie. Im wärmer. Amer. May Aug. VV. H. 4.
- 4. Cr. bracteatum. Pers. l. c. Beblätterte Hackenlilie. . Aug. Sept. W. H. 24.

285. Agapanthus, Schmucklilie.

- 1. A. umbellatus. Pers. l. c. Doldenblüthige Schmucklilie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
- 2. A. praecox, Willd. enum. 1. p. 353. Frühe Schmucklilie. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

286. Anigosanthos, Anigosanthos.

1. A. flavida. Redouté pl. liliac. 3. n. 176 Gelblicher Anigosanthos. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. 24.

287. Cyrtanthus, Bogenlilie.

- s. C. ventricesus. Pers. I. c. Bauchige Bogenlilie, Am Cap. Dec. Febr. Ch. 24. C. angustifolius. Jacq. hort schoenbr. 1. p. 40. t. 76.
 - 2. C. obliquus. Pers. 1. c. Grossblüthige Bonlilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

288. Amaryllis, Amaryllis.

- 1. A. lutea. Pers. l. c. Gelbe Amaryllis. In Span. Ital. u. der Tartarey. Sept. Oct. Im F. 4.
- 2. A. formosissima. Pers. l. c. 1, p. 353. Schönste Amaryllis. Im wärmer. Amer. Jun. Aug. W. H. 24.
- 3. A. reginae. Pers. l. c. Königliche Amaryllis. Auf den Caraibisch. Ins. Apr. May W. H. 24.

- 4. A. Belladonna. Pers. 1. c. Westindische Amaryllis. Auf den Caraibischen Ins. u. in Surinam. Aug. Sept. W. H. 4.
- 5. A. vittata. Pers. l. c. Gebänderte Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 6. A. ornata. Pers. l. c. 1. p. 354. Zierliche Amary llis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 7. A. longifolia. Pers. 1. c. Langblättrige Amaryllis. Am. Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 8. A. aurea. Pers. 1. c. Goldne Amaryllis. In China. Jul. Aug. Ch. 24.
 - 9. A. orientalis. Pers. 1. c. Orientalische. Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.
- no. A. Josephinia. Red. plant. liliac. 7° m. 370. Josephinische Amaryllis. In Mittelafrica. Jun. Jul. W. H. 24.
- 11. A. sarniensis. Pers. 1. c. Japanische Amaryllis, In Japan u. auf der Ins. Guernsey. Jul. — Sept. Ch. 24.
 - 8. flore pallido. Mit blafsrother Blüthe.
 - y. capensis. Japanische Amaryllis vom Cap.
- 12. A. curvifolia. Pers. l. c. Krummblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.
- 13. A. undulata. Pers l. c. Wel lenblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. 24.
- 14. A. humilis. Pers. 1. c. Niedrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Sept. Ch. 4.
- 15. A. flexuosa. Pers. l. c. Gebogene Amaryllis. Am Cap. Sept. Decemb. Ch. 24.

- 16. A. Radu S. Pers. l. c. Raspelblättrige Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 24.
- 17. A. crispa. Pers. l. c. 1. p. 355. Krause Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 4.

289. Allium, Lauch.

- 1. A. flavum. Pers. l. c. 1. p. 356. Gelbes Lauch. In Oesterr. u. zu Montpellier auf Kalkgebirge. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. A. angulosum. Pers. l. c. 1. p. 357. Eckiges Lauch. In Deutschl. u. Sibir. an feuchten Stellen. Jul. Aug. Im F. 4.
- 3. A. striatum. Pers. 1. c. Gestreiftes Lauch. Am Cap. Blüht im Herbste u. Winter. Ch. 24.
- 4. A. nigrum. Pers. 1. c. Schwarzes Lauch. Im Oesterreichischen Litorale, zu Algier u. in der Provence. Jun. Jul. Im F. 24.

 A. multibulbosum. Jacq. fl. austr. 1. p. 9. t. 10.
- 5. A. ursinum. Pers. l. c. Baren-Lauch. In feuchten Hainen des nördlicher. Eur. May. Im F. 24.
- 6. A. clusianum. Pers. I. c. Clusisches Lauch. In Südeur. Istrien, Dalm. May, Jun. Im F. 4.
- 7. A. fistulosum. Pers. 1. c. 1. p. 358. Röhrenstieliges Lauch. Jun. Jul. Im F. 21.
- 8. A. sibiricum. Pers. l. c. Sibirisches Lauch. Auf den Alpen Steyermarkts u. Schlesiens. Jul. Aug. Im F. 4.

290. Bonapartea, Bonapartea.

1. B. juncsa. Ruiz et Pavon flora peruv. 3. p. 38. t. 262. Simsenartige Bonapartea. In Peru. -. W. H. 5.

291. Lilium, Lilie.

- 1. L. candidum. Pers. l. c. Weisse Lilie. In Palästina, Syrien w der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. L. bulbiferum. Pers. l. c. Feuer-Lilie. Im südlicher. Eur. Oesterreich u. Sibirien auf Felsen. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. L. chalcedonicum. Pers. l. c. i. p. 359. Chalcedonische Lilie. In Persien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. L. Martagon. Pers. 1. c. Gelbwarzlige Lilie. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz, Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. L. tigrinum. Ait. hort. kew. ed. 2. p. 241. Getiegerte Lilie. InChina u. Japan. Jun. Jul. Ch. 4.
 - 292, Fritillaria, Schachblume.
- 1. Fr. pyrenaica. Pers. 1. c. Pyrenaische Schachblume. Auf den Pyrenaen u. in Russland. Jan. Im F. 24.
- 2. Fr. imperialis. Pers. l. c. Buschige Schachblume. In Persien: May — Jul. Im F. 21.
- β. lutea. Mit gelben Blüthen.

293. Eucomis, Schopflilie.

1. E. nana. Pers. l. c. 1. p. 360. Zwerg-Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

- 2. E. regia. Pers. I. c. Königliche Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
- 3. E. punctata. Pers. l. c. Punktirte Schopflilie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

294. Gloriosa, Prachtlilie.

1. Gl. superba. Pers. 1. c. Rankenblättrige Prachtlilie. Auf Malabar. Jun. Jul. W. H. 4.

295. Tulipa, Tulpe.

- s. T. sylvestris. Pers. 1. c. Willde Tulpe. In Südeur. Sibir. u. im Orient. May, Jun. Im F. 4.
- 2. T. suaveolens. Pers. 1. c. Wohlriechende Tulpe. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.
- 3. T. Gesneriana. Pers. l. c. s. p. 361. Gemeine Tulpe. In der Krim, am Caspiachen Meere u. im Orient. Apr. May. Im F. 24,

296. Albuca, Stiftblume.

- 1. A. altissima. Pers. I. c. Höchste Stiftblume. Am Cap wie alle folgende. Jul. Aug. Ch. 4.
- -2. A. major. Pers. 1. c. Große Stiftblume. Apr. Jun. Ch. 4.
- 3. A. setosa. Pers. 1- c. Borstige Stiftblume. Apr. May. Ch. 4.
- 4. A. aurea. Pers. l. c. Goldsarbige Stiftblume. May, Jun. Ch. 24.
- 5. A. frograns. Pers. 1. c. Wohlriechende Stiftblume. May, Jun. Ch. 24.
- 6. A. viscosa. Pers. 1. c. Klebrige Stiftblume May Jul. Ch. 24.

- 7. A. spiralis. Pers. 1. c. Spiralblättrige Stiftblume. May — Jul. Ch. 4.
 - 297. Hypoxis, Hartling,
- 1. H. sobolifera. Pers. l. c. 1. p. 363. Wuchernder Härtling. Am Cap. Jul. Avg. Ch. 24.
- 2. H. obliqua. Pers. l. c. Gedrehtblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 21.
- 3. H. alba. Pers. 1. c. Weißer Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.
- 4. H. verratrifolia. Pers. l. c. Germerblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4. H. plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. 55.
 - 298. Eriospermum, Wollensame.
- 1. E. latifolium. Pers. l. c. 1. p. 363. Breitblättriger VVollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.
- 2. E. lanuginosum. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 7. t. 264. Wollblättriger Wollensame. Am Cap. Ang. Ch. 24.
- 3. E. lanceaefolium. Pers. l. c. Lanzenblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.
- 4. E. parvifolium. Pers. l. c. Kleinblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.
 - 299. Ornithogalum, Vogelmilch.
- 1. O. umbellatum. Pers. l. c. 1. p. 364. Doldenblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Frankr. u. im Orient. May. Im F. 21.
- 2. O. laoteum. Pers. l. c. Milchweiße Vogelmilch. Am Cap. Aug. Ch. 4.

- S. O. altissimum. Pers. l. c. Höchste Vogelmilch. Am Cap. —. Ch. 4. O. giganteum. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 45. t. 87.
- 4. O. arabicum. Pers. 1. c. 1. p. 365. Arabische Vogelmilch. Bey Alexandrien in Aegypt. u. zu Madera. . Ch. 4.
- 5. O. thyrsoides. Pers. l. c. Straussartige Vogelmilch, Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
- 6. O. aursum. Pers. 1. c. Goldne Vogel-milch. Am Cap. Apr. May. Ch. 4.
- 7. O. caudatum. Pers. l. c. Geschwänzte Vogelmilch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
- 8. O. natans. Pers. l. c. Hängendblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 斗.

300. Scilla, Meerzwiebel.

- 1. Sc. maritima. Pers. 1. c. Gemeine Meerzwiebel. In Span. Portug. Sicilien u. Sysien. May, Jun. K. H. 24.
- 2. Sc. peruviana. Pers. l. c. 1. p. 366. Peruvianische Meerzwiebel. In Portug. u. der Barbarey.
 Jän. Febr. K. H. 4.
 - 3. Sc. amoena. Pers. l. c. Schöne Meerzwiebel. In Oesterr. Deutschl. u. Russland. May, Jun. Im F. 24.
- 4. Sc. campanulata. Pers. l. c. Glockenblüthige Meerzwiebel. In Span. u. Portug. May, Jun. K. H. 4.
 - 5. So. bifolia. Pers. 1. c. Zweyblättrige Meerzwiebel. In Auen v. Deutschl. u. Frankr. März. Apr. Im F. 4.

301. Asphodelus, Affodil.

- 1. A. luteus. Pers. I. c. 1. p. 367. Gelber Affodil. In Sicil. u. im Orient. Jun. Im F. 4.
- 2. A. fistulosus. Pers. 1. c. Röhriger Affodil. In Span. der Provence u. in Candien. May, Jun. Im F. 24.

302. Anthericum, Zaunblume.

- 1. A. revolutum. Lin. sp. pl. p. 445. Zurückgebogene Zaunblume. Am Cap. May, Jun. Ch. 24. Phalangium revolutum. Pers. l. c. 1. p. 368. A. divaricatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 7. t. 414.
- 2. A. ramosum- Lin. 1. c. Aestige Zaunblume. Auf Kalkhügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 24. Phalang. ramosum. Pers. 1. c.
- 3. A. pendulum. Hornem. catalog. hort. hafniens p. 4. Hangende Zaunblume. In Neuholl. Jun. Ch. 24.
- 4. A. Liliago. Lin. l. c. Gemeine Zaunblume. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
 Phalang. Liliago. Pers. l. c. 1. p. 369.
- 5. A. pusillum. Jacq. io. rar. 3. t. 417. Collect. suppl. 95. Kleinste Zaunblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24. Phalang. pusillum. Pers. 1. c.

303. Bulbine, Bulbine.

1. B. frutescens. Willd. enum. 1. p. 372. Strauchartige Bulbinc. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 15. Authoric. frutescens. Pers. 1. c.

- 2. B. restratz. Willd: l. c. Schnabelbättrige Bulbine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5. Antheric: rostratum. Pers. l. c.
- 3. B. alooides. Willd. l. c. Aloeblättrige Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24. Antheric. Aloides. Pers. l. c.
- 4. B. longiscapa. Willd. l. c. Langschaftige Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5. Antheric. longiscapum. Pers. l. c.
 - 304. Asparagus, Spargel.
- 1. A. officinalis. Pers, l. c. 1. p. 370. Gemeiner Spargel. Auf sandigem Boden in Eur. Jun. Im F. 4.
- 2. A. decumbens. Pers. 1. c. Liegender Spargel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
- 3. A. flexuosus. Pers. 1. c. Bogiger Spargel Am Cap. . Ch. 2.
- 4. A. scandens. Pers. 1. c. Kletternder Spargel. Am Cap. — Ch. 24.
- 5. A. falcatus. Pers. l. c. Sichelblättriger Spargel. In Ceylon. Ch. 5.
- 6. A. retrofractus. Pers. l. c. 1. p. 371. Lerchenbaumblättriger Spargel. In Africa. - . Ch. b.
- 7. A. aethiopicus. Pers. 1. c. Aethiopischer Spargel. Am Cap. Ch. 4.
- 8. A. asiaticus. Pers. l. c. Asiatischer Spargel. In Asien. —. Ch. h.
- 9. A. capensis. Pers 1. c. Capischer Spargel. Am Cap. -. Ch. b.

305. Dracaena, Drachenbaum.

- 1. Dr. Draco. Pers. 1. c. Gemeiner Drachenbaum. In Ostind. u. den Canarisch. Ins. —. VV. H. b.
- 2. Dr. tessellata. Willd. enum. 1. p. 374. Gewürfelter Drachenbaum. Auf Madagascar. —. VV. H. h. D. marginata. Pers. 1. c.
- 3. Dr. umbraculifera. Peri. 1. c. Schattenreicher Drachenbaum. Das eigentliche Vaterland dieser Pflauze ist unbekannt; cultivire findet man sie aber auf der St. Moritzinsel. Jän. Febr. VV. H. h.
- 4. Dr. terminalis, Pers. 1. c. 1. p. 372. Gränzen-Drachenbaum. In Ostind. u. China. Jän. — März. W. H. h.
- 5. D. reflexa. Pers. l. c. Zurückgebogener Drachenbaum. Auf der St. Moritzinsel. W. H. h.
- 6. Eine noch unbeschriebene Art von der Insel Bourbon.

306. Dianella, Dianelle.

- 1. D. nemorosa. Pers. l. c. Hain Dianelle. In Ostind. Apr. Sept. W. H. 24. Dracaena ensifolia. Lin. syst. veg. 275.
- 2. D. coerulea. Willd. enum. 1. p. 375. Blaublühende Dianelle. In Mexico. März, Apr. VV. H. 4.

307. Sanseviera, Sanseviere.

- 1. S. guinensis. Pers. 1. c. Guineensische Sanseviere. Zu Guinea. Jun. Jul. W. H. 4.
- 2. S. zeylanica. Pers. I. c- Zeyloniche Sanseviere. In Zeylon u. Ostind. Jun. Jul. W. H. 24.
- 3. S. pumila. Decand. catal. hort. bot. monspel. p. 58. Niedrige Sanseviere. . W. H. 4.

308. Convallaria, Mayblümchen.

- 1. C. mayalis. Pers. l. c. Gemeines Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Apr. Jun. Im F. 24.
- 2. C. japonica. Pers. 1. c. Japanisches Mayblümchen Japan. Jul. Aug. Ch. 4.
- 3. C. Polygonatum. Pers. 1. c. 1. p. 373. Weisswurzliges Mayblümchen. In Hainen des nördlicher Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. C. multiflora. Pers. 1. c. Vielblüthiges Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. u. Amer. Jun. Jul. In. F. 24.
- 5. C. latifolia. Pers. l. c. Breitblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Österr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 4.
- 6. C. bifolia. Pers. 1. c. Zweyblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

309. Polyanthes, Tuberose.

1. P. tuberosa. Pers. l. c. 1. p. 374. Gemeine Tuberosa. In Java u. Ceylon. Aug. Sept. VV. H. 24.

2. P. pygmaea. Pers. 1. c. Zwerg-Tuberase. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

310. Drimia, Giftlilie.

- 1. Dr. ciliaris. Pers. 1. c. Gefranzte Giftli. lie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.
- 2. Dr. pusilla. Pers. l. c. Niedrige Giftlilie. Am Cap. Ang. Sept. Ch. 24.
- _3. Dr. undulata. Pers. l. c. Wellenblättrige Giftlilie. Am Cap. Ang. Sept. Ch. 4.
- 4. Dr. media. Pers. l. c. Mittlere Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept.. Ch. 24.

311. Hyacinthus, Hyacinthe.

- 1. H. non scriptus. Pers. 1. c. Englische Hyacinthe. In Engl. Frankr. Span. u. Ital. Jun. Im F. 21.
- 2. H. arientalis. Pers. l. c. 1. p. 375. Gemeine Hyacinthe. In Asien u. Africa. May, Jun. Im F. 24.
- 3. H. corymhosus. Pers. l. c. Doldentraubige Hyacinthe. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

312. Muscari, Muscathyacinthe.

- 1. M. muschatum. Willd. enum. 1. p. 378-Bisamduftende Muscathyacinthe. In Asien jenseits des Bosphorus. May, Jun. Im F. 24. Hyacinth. Muscari. Pers. 1. c.
- 2. M. comosum. Willd. l. c. Schopfblüthige Muscathyacinthe. In Frankr. dem östlich. Eur. u. Persien. Jun. Jul. Im F. 24. Hyacinth. comosus. Pers, l. c.

3. M. racemosum. Willd. l. c. Trauben-Muscathyacinthe. In Sudeur. Jun. Jul. Im F. 24. Hyacinth. racemosus. Pers. l. c.

313. Phormium, Flachslilie.

1. Ph. tenas. Pers. l. c. Zähe Flachslilie. In Neusceland. —. Ch. 4.

314, Zuccagnia, Zuccagnie.

1. Z. viridis. Thunb. prodr. 192. Grüne Zuccagnie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24. Hyacinth. viridis. Pers. l. c. .
Lachenalia ——— Ait. hort. kew. 1.p. 462-

315. Lachenalia, Lachenalie, .

- 1. L. glaucing. Pers. l. c. Graugrune Lachenalie. Am Cap mit den folgenden Arten dieser Gattung. Jun. — Aug. Ch. 24.
- 2. L. paltida. Pers. l. c. 1. p. 376. Bleiche Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 4.
- 3. L. angustifolia. Pers. l. c. Schmalblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
- 4. L. pusilla. Pers. l. c. Kleinste Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
- 5. L. lancearfolia. Pers. L. c. Lanzenblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
- 6. L. unifolia. Pers. I. c. Einblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
- 7. L. tricolor. Pers. l. c. 1. p. 377. Dreyfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24. ß luteola. Mit gelblicher Blüthe.

- 8. L. pendula. Pera l. c. Hängenda Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
- 9. L. quadricolor. Pers. 1. c. Vierfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24. Nebst einigen anderen noch unbeschriebenen Arten.

316. Veltheimia, Veltheimie.

- 1. V. viridifolia. Pers. l. c. Grünblättrige Veltheimie. Am Cap. Jan. — März, Ch. 4.
- 2. V. glauca. Pers. 1. c. Graugrüne Velthei. mie. Am Cap. Dec. Febr. Ch. 24.
- 3. V. sarmentosa. Pers. l. c. Wurzeltreibende Veltheimie. Am Cap. Febr. März. Ch. 24. Aletris sarmentosa. Andrew. bot. reposit. p. 54. t. 54.
- 4. V. Uvaria. Pers. 1. c. Traubonblüthiga Veltheimie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24. Aletris Uvaria. Lin. syst. veg. 279.

317. Aletris, Aletris.

- 1. A. fragrans. Pers. 1. o. Wohlriechende Aletris. In Africa. May Aug. W. H. f.
 - e. A? virginica. Cuius?

318. Yucca, Yucce.

- 1. F. gloriosa. Pers. l. c. 1. p. 378. Prachtige Yucce: In Carolina. Jul. Sept. K. H. h.
- 2. V. aloifelia. Pers. l. c. Aloeblättrige Yucce. In Carolina, Florida u. Mexico. Jul. Aug. VV. H. b.
- 3. Y. Draconis. Pers. 1. c. Drachenhaumartige Yucce. 1m wärmer, Amer. W. H. 5.

- 4. Y. filamentosa. Pers. l. c. Fadige Yucce. In Virgin. u. Carol. —. Ch. b.
 - 319. Rhipidodendrum, Fächerbaum.
- 1. Rh. distichum. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1811. p. 5. Zweyzeiliger Fächerbaum. In Africa. Jun. Aug. Ch. b.
 Aloë plicatilis. Pers. l. c. 1. p. 379.
 - 2. Eine noch unbeschriebene Art.
 - 320. Lomatophyllum, Saumblatt.
- 1. L. borbonioum. Willd. l. c. Bourbonisches Saumblatt. Auf Bourbon. —. W. H. b. Aloë marginalis. Decand. pl. succ. p. 31. t. 31.

321. Apicra, Apicre,

- 1. A. arachnoides. Willd. l. c. Weichstachlige Apiere. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24. Aloë arachnoid. Pers. l. c.
- 2. A. atrovirens. Willd. l.c. 1. p. 8. Schwarzgrüne Apiere. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24. Aloë atrovir. Pers. l. c.
- 3. A. mirabilis. Willd. 1. c. 1. p. 9. Wunderbare Apicre. Am Cap. Aug. Ch. 24., Aloë mirabilis. Haworth act. soc. lin. lond. 7. p. 9.
- 4. A. margaritifera & major. Willd. l. c. Großperlige Apicre. Am Cap. Jun. Aug. Ch. 24.
 Aloë margaritif. Pers. l. c.
 - y. minor. Mit kleineren Perlen.

- 5. Auttenuata. Willd. 1. c. p. 10. Verdünnte Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4. Aloë, attenuata. Haw. 1. c. 7. p. 11.
- 6. A. radula. Willd. l. c. Raspelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Ang. Ch. 24. Aloë radula. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 422.
- 7. A. retusa. VVilld. l. c. p. 11. Abgestutzte Apicre. Am Cap. Jun. Aug. Ch. 24. Aloë retasa. Pers. l. c.
- 8. A. cymbaeformis. Willd. I.c. Kahnförmise Apicre. Am Cap. May Jul. Ch. 21. Aloë cymbaeform. Jacq. fragm. bot. p. 72. u. \$28. t. 112. f. 1.
- 9. A. pumilio. Willd. l. c. Niedrige Apiere. Am Cap. Febr. März. Ch. 24.
 Aloë pumilio. Jacq, hort. schoenbr. 4. p. 11.
 t. 421.
- 10. A. expansa. Willd. l. c. p. 12. Ausgespannte Apicre. Am Cap. Jun. Aug. Ch. b.
 Aloë expansa & major. Haw: l. c. 7. p. 8.

 ß major. Mit größerem Wuchse.
- 11. A. rigida. VVilld. l. c. Steife Apiore. Am Cap. Jan. — Aug. Ch. h. Aloë rigida. Jacq. fragm. het. ps. 71. n. 224. t. 108.
- 12. A imbricata. Willd. l. c. p. 13. Dachziegelblättrige Apicro. Am Cap. Jun. + Aug. Ch. h. Aloë imbricata. Haw. I. c. 7. p. 7.
- 13. A. pentagona. Willd. l. c. Fünfeckigs: Apicre. Am Cap. Jun. Aug. Ch. t. Aloë pentagona. Haw. l. c.

- 14. A. bullata. Willd. 1. c. Blasige Apicre. Am Cap. May, Jun. Ch. t.
 Aloë bullulata. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 225.
 1. 109.
- 15. A. viscosa. Willd. l. c. p. 14. Klebrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5. Aloë viscosa. Pers. l. c. 1. p. 379.

6. major. Mit größerem Wuchse.

- 16. A. tortuosa. Willd. l. c. Gedrehte Apicre. Am Cap. Jun. Aug. Ch. h. Aloë tortuosa. Haw. l. c.
 - 17.) 18.) Noch unbeschriebene Arten.

319. Aloë, Aloe.

- 1. A. obscura. Willd. I. c. p. 15. Dunkelfleckige Aloe. Am Cap. — . Ch. 5.
- 2. A. angulata β unilateralis. Willd. l. c. p. 16. Eckige Aloe mit einseitigen Blättern. Am. Cap. Ch. h.

7. truncata. Mit abgestutzten Blättern.

- 3. striata. Mit gestreiften Blättern.
- 3. A. excavata. Willd. l. c. Ausgehöhlte. Aloe. Am Cap. May Jul. Ch. 5.
- 4. A. trigona. Hort. bot. vindobon. Dreyeekige Alee. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 5. A. Lingua. Thunb. difs. n. 11. Zungen-blättrige Aloe. Am Cap. Jun. Aug. Ch. b. Aloe linguaeformis. Pers. 1. c.
 - β. verrncosa. Mit warzigen Blättern.

- 6. A. bifaria. Hort. bot. vindobon. Zweyseitige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h. Aloe obliqua. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9. t. 418.
- 7. A. intermedia. Willd. l. c. p. 17. Mittlere Aloe. Am Cap. — Ch. b.
- 8. A. verrucosa. Ait. hort. kew. 1. p. 46%. Warzige Aloe. Am Cap. Jun. Aug. Ch. h. Aloë Serra β? verrucosa. Pers. l. c.
- 9. A. pseudo-verrucosa. Hort. dyckens. Unächtwarzige Aloe: Am Cap — Ch. 5.
- io. A. conspurcate. Hort. dyckens. Beschmutzte Aloe. Am Cap. —. Ch. h.
- 11. A. carinata. Pers. l. c. 1. p. 379. Hohlblättrige Aloe. Am Cap. — . Ch. h. S. subglabra. Mit fast glatten Elättern.
- 12. A. echinata. Willd. enum. 1. p. 385. Weichstachlige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24. Aloë humilis. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 420.
 - β. divaricata. Mit ausgesperrten Blättern.
 - 7. alia varietas. Eine andere Abart.
- 13. A. obliqua. Haw. l. c. 7. p. 14. Schiefblättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. t. . Aloë maculata. Pers. l. c.
- 14. A. pulchra. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 419. Schöne Aloe. Am Cap. März. May. Ch. t.
- 15. A. variegata. Pers. l. c. Bunte Aloe. Am Cap. May, Jun. Ch. t.
- 16. A. tenuifolia. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin. 1811. p. 19. Dünnblättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. b.

- 17. A. virens. Willd. L. c. Grüne Aloe. Am Cap. . Ch. t.
- 18. A. picta. Pers. l. c. 1. p. 378. Bemahlte Aloe. Am Cap. Jun. Aug. Ch. t. A. obscura. Haw. miscell.
- 19. A. umbellata. Decand. pl. succ. p. 98. Doldenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. Aug. Ch. h. Asaponaria. Haw. miscell.
 - B. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.
- 20. A. saponaria Hortulan. Seifen-Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. t. A. latifolia. Haw. miscell.
- 21. A. vulgaris. Pers. l. c. Gemeine Aloe.

 Zu Barbados, Jamaica, am Cap u. in Ostindien.

 —. Ch. b.

 A. barbadensis. Haw, l. c. 7. p. 19.
 - 22. A. glauca. Willd. l. c. p. 20. Grawgrüne Aloe. Am Cap. -. Ch. t.
 - 23. A. rhodacantha. Pers. 1. c. Rosendornige Aloe. Am Cap. . Ch. 5.
 - 24. A. paniculata. Jacq. fragm. bot. p. 48. n. 162. t. 62. Rispenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24. Aloë striata. Haw. l. c. 7. p. 18.
 - 25. A. succotrina. Decand. pl. succ. p. et. 85. Offizinelle Aloe. Am Cap. . Ch. j. A. sinuata. Pers. l. c.
 - 26. A. guttata. Hort. schoenbr. Betropfta

- 27. A. arberescens. Decand. pl. succ. p. et t. 38. Baumartige Aloe Am Cap. —. Ch. b. A. fruticosa. Pers. l. c.
 - β. foliis angustioribus. Mit schmäleren Blättern.
- 28. A. Commetini. Willd. l. c. p. 22. Commelinische Aloe. Am Cap. —. Ch. t. A. supralaevis. Haw. l. c. 2. p. 186.
- 30. A. albi. spina. Haw. miscell. Weisstacklige Aloc. Am Cap. . Ch. 3.
- 31. A. Serra. Pers. l. c. 1. p. 379. Sägeblättige Aloe. Am Cap. Jun. Aug. Ch. b.
- 32. A. africana. Haw. miscell? Africanische Aloe. In Africa. —. Ch. t.
- 33. A. brevifolia. Pers. 1. c. Kurzblättrige Aloe. Am Cap. -. Ch. 5.
- 34. A. depressa. Haw. miscell? Niederge-drückte Aloe. Am Cap. —. Ch. b
 - 35. Eine noch unbeschriebene Art.

320. Agave, Agave.

- - y. foliis luteo striatis. Mit gelbgestreiften Blattern.
- 2. A. vivipara. Pers. 1, c. 1. p. 13n. Lehendiggebährende Agave. In Amer. —. W. H. h.

- 3. A. lurida. Pers. l. c. Dunkle Agave. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. 5.
- 4. A. foetida. Pers. 1. c. Stinkende Agave. Zu Curassao. . VV. H. h.
- 5. Eine noch unbeschriebene Art von St. Domingo.
- 6. Eine andere noch unbeschriebene Art v. Caracas.

321. Alstroemeria, Alströmerie.

- 1. A. Pelegrina. Lin. sp. pl. p. 461. Bunte Alströmerie. Auf Hügeln in Peru u. Lina, Jul. Ch. 21. A. peregrina. Pers. l. c. 1. p. 380.
- 2. A. Ligtu. Pers. l. c. Rachenförmige Alströmerie. Zu Lima. Jul. Ch. 24.

322. Hemerocallis, Tagblume.

- 1. H. flava. Pers. l. c. 1. p. 381. Gelbblühende Tagblume. Auf Feldern der Schweiz, Ungarns u. Sibiriens. Jun. Jul. Im F. 2.
 - 2. H. fulva. Pers. l. c. 1. p. 382. Braunrothe Tagblume. In China. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. H. alba. Pers. l. c. Weisblühende Tagblume. In Japan. Jun. Jul. Gh. 24. H. japonica. Thunb. act. societ. line lond. 2. p. 335. Hosta japonica. Trattinnick observat. bot. fasc. 2. p. 55. n. 89.
 - 4. H. coerulea. Pers. l. c. Blaublühende Tagblume. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24. H. japonica β coerulea. Andrews repos. bot. t. 6. Hosta coerulea. Tratt. l. c.

323. Acorus, Calmus.

1. A. Calamus. Pers. l. c. Gemeiner Calmus. In Teichen und Sümpfen von Eur. Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

324. Orontium, Wasserähre.

v. O. japonicum. Pers. l. c. Japanische Wasserähre. In Japan. Aug. — Oct. Ch. 24.

325. Corypha, Schirmpalme.

1. C. umbraculifera. Pers. 1. c. Grofsblättrige Schirmpalme. In Ostind: —. W. H. 5.

326. Thrinax, Schilfpalme.

1. Th. parviflora. Pers. 1. c. 1. p. 383. Klein-blüthige Schilfpalme. Am Meerstrande in Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. h.

327. Berberis, Berberitze.

- 1. B. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 387. Gemeine Berberitze. In Europäisch. n. Nordamericanischen Wäldern. May, Jun. Im F. h.
 - 6. canadensis. Gemeine Berberitze aus Nord-
- e. B. sibirica. Pers. l. c. Sibirische Berberitze. In Sibirien. May, Jun. Im F. 5.
- 3. B. sinensis. Desfont. cat. hort. paris. p. 150. Chinesische Berberitze. In China. . Ch. 5

328. Prinos, Winterbeere.

- Winterbeere. In Sumpfen v. Virgin u. Pensylv. May, Jun. K. H. 5.
 - 2. Pr. glaber. Pers. l. c. 1. p. 388. Canadische Winterbeere. In Canada u. Florida. May, Jun. K. H. h.

329. Cleome, Cleome.

- 1. Cl. pentaphylla. Pers. 1. c. 1. p. 390. Funfblättrige Cleome. In Ostind. Aug. Sept. V/. H. O.
- 2. Cl. dodecundra. Pers. I. c. 1. p. 391. Zwölffädige Cleume. In beyden Ind. Aug. W. H. O.
- 3. Cl. uniglandulosa. Pers. 1. c. Eindrüsige Cleome. In Mexico. Jul. Sept. W. H. 4.
- 4. Cl. gigantea. Pers. l. c. Riesenartige Cleeme. In Guinea. Aug. W. H. h.

330. Stephania, Stephanie.

1. St. Cleomoides. Pers. 1. c. Cleomeartige Stephanie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. h. Capparis paradoxa. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 58. t. 111.

331. Canarina, Canarina. 😘 🛝

1. C Campanula. Pers. 1. c. 1. p.392. Glockenblüthige Canarina. Auf den Canarischen Insela-Decemb. — Febr. Ch. 24.

332. Frankenia, Frankenie.

- 1. Fr. laevis. Pers. 1. c. Glatte Frankenie. Am Meerstrande in Südenr. Jul. - Sept. K. H. 4.
- 2. Fr. thymifolia. Pers. l. c. 1. p. 393. Thymianblättrige Frankenie. In Span. u. der Barbarey. . K. H. t.

333. Bambusa, Bambos.

- 1. B. arundinacea. Willd. sp. pl. 2. p. 244. Gemeiner Bambos. In beyden Ind. —. W. H. h. Bambos arundinacea. Pers. 1. c.
- 8. latifolia. Mit breiteren, weichkaarigen Blättern.

334. Lomandra, Lomandra.

- 1. L. latifolia. Labillardiere. Breitblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 4.
- 2. L. angustifolia. Labill. Schmalblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 24.

DIGYNIA.

335. Oryza, Reis.

- 1. O. sativa. Pers. l. c. 1. p. 394. Gémeimer Reis. In Ostind. Jun. Im F. O.
 - 3. mutica. Mit grannenlosen Spelzen.
 - 336. Atraphaxis, Atraphaxis.
- 1. A. spinosa. Pers. I. c. Stachlige Atraphaxis. In Medien u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 3.

1. A. undulata. Pers. l. c. Wellenblättrige Atraphaxis. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. b.

TRIGYNIA.

337. Rumex, Ampfer.

- 1. R. Patientia. Pers. 1. c. Gemüse Ampfer. In Deutschl. u. Ital. May, Jun. Im F. 24.
- 2. R. sanguineus. Pers. l. c. Blutadriger Ampfer. In Nordamer. May, Jun. Im F. 2.
 - 3. R. Lunaria. Pers. l. c. 1. p. 395. Baumartiger Ampfer. Auf den Canarisch. Ins. Jun.

 Aug. K. H. 5.
 - 4. R. scutatus. Pers. 1. c. Grauer Ampfer. In Südeur. Jun. Im. F. 4.
 - 5. R. cordatus. Desfont. catal. hort. paris. p. 40. Herzblättriger Ampfer. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
 - 6. R. Acetosa. Pers. 1. c. Gemeiner Ampfer. Auf sandigen Trieften in Eur. May, Jun. Im F. 24.

338. Veratrum, Germerkraut.

- r. V. nigrum. Pers. l. c. 1. p. 397. Schwarzes Germerkraut. Auf trockenen Hügeln in Oester. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. V. album. Pers. 1. c. Weisses Germerkraut. An Bächen u. auf feuchten Waldwiesen in Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

339. Myrsiphyllum, Myrtenblatt.

1. M. asparagoides. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 25. Spargelartiges Myrtenblatt. Am Cap u. in Aethiopien. Jun. Ch. p. Medeola asparagoides. Pers. l. c. 1. p. 398.

340. Colchicum, Zeitlose.

1. C. autumnale- Pers. 1. c. Herbst - Zeitlose. Auf Wiesen in Eur. Sept. Oct. Im F. 4.

8. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe-

341. Chamaerops, Zwergpalme.

1. Ch. humilis. Pers. l. c. 1. p. 400. Niedrige Zwergpalme. In Dalmatien, Span. u. der Bar. barey. Blüht zu verschiedenen Zeiten im Jahre. K. H. 5.

β arborescens. Mit sehr hohem Stamme.

342. Aponogeton, Aponogeton.

1. A. distachyon. Pers. l. c. Zweyzeyliger Aponogeton. In Bächen am Cap. Jul. — Oct. Im freyen Wasserbekälter. 24.

CLASSIS YIL

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

343. Disandra, Disandra,

1. D prostrata. Pers. l. c. 1. p. 402. Liegende Disandra. Im Orient u. zu Madera, Bl. dem ganzen Sommer hindurch. VV. H. 4.

344. Pisonia, Pisonie.

- 1. P. aculeata. Pers. l. c. Stachlige Pisonie. In Südamer. -. VV. H. t.
- P. fragrans. Desfont. catal. hort. paris. p. 46. VVohlriechende Pisonie. In Südamer. W. H. h.
- 3. P. nitida, Desfont. l. c. Glänzende Pisonie. In Südamer. —. W. H. h.
- 4. P. obtusata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 35. t. 314. Stumpfblättrige Pisonie. Auf der Insel Providenz. May, Jun. W. H. b.

345. Petiveria, Petiverie.

1. P. alliacea. Pers. l. c. Knoblauchartige Petiverie. In Hainen v. Jamaica. May — Sept. VV. H. b.

346. Aesculus, Rosskastanie.

- 1. Ac. Hippocastanum. Pers. I. c. 1. p. 403. Gemeine Rofskastanie. Im nördlicher. Asien. May. Im F. h.
- 2. Ac. Pavia. Pers. l. c. Rothe Roiskastanie. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.
- 3. Ac. flava. Ait. hort. kew. 1. p. 494. Gelbe. Rofskastanie. In Nordearolina. Jun. Jul. Im F. 5. Ac. lutea. Pers. I. c.
- 4. Ac. macrostachia. Pers. l. c. Langahrige Rofskastanie. In Georgien u. am Savannah. Jun. Jul. Im F. b.

347. Dracontium, Zehrwurz.

- 1. Dr. lancedefolium. Jacq. ic. rar. 3. t. 612. Collect. 4 p. 118. Lanzenblättrige Zehrwurz. Zu Caracas auf Bäumen schmarozend. Jun. Aug. VV. H. 24.
- 2. Dr. pertusum, Mill. dict. p. 1. ic. t. 296. Durchlöcherte Zehrwurz. 1n Südamer. Jun. — Aug. W. H. 5.

348. Galla, Schlangenkraut.

1. C. aethiopica. Lin. sp. pl. p. 1373. Capisches Schlangenkraut. Am. Cap. Jun: — Aug. Ch. 24

TETRAGYNIA.

- 349. Saururus, Eidechenschwanz.
- 1. S. cernuus. Pers l. c. Hängender Eidechsenschwanz. In Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.

2. S. Lucidus. Donn catal. hort. cantabrig. p. 66. Gläuzender Eidechenschwanz. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. 4.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

350. Tropaeolum, Kapuzinerkresse.

- 1. Tr. minus. Pers. l. c. 1. p. 405. Kleine Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. O.
- 2. Tr. maius. Pers. l. c. Grosse Kapuziner-kresse. In Peru. Iun. Aug. Im F. .

331. Oenothera, Nachtkerze.

- 1. Oc. biennis. Pers. 1. c. 1. p. 407. Gemeine Nachtkerze. In Virgin. jetzt auch in Eur. an Flüssen u. Bächen. Jun. Jul. Im F. 7.
- 2. Oe. muricata. Pers. l. c. 1. p. 408. Weichstachlige Nachtkerze. In Canada. Jun. Jul. Im F. J.
- 3. Os. molissima. Pers. 1. c. Weichblättrige Nachtkerze. Zu Buenos Ayres. Jul. Aug. Im F. O.
- 4. Oc. odorata. Pers. 1. o. Wohlriechende Nachtkerze. In Patagonien, Aug. Im F. 4.
- 5. Oe. rosea. Pers. l. c. 1; p. 409. Resenrothe Nachtkerze. In Peru. Jun. — 118g. K. H. 4.

332. Gaura, Prachtkerze.

1. G. mútabilis. Pere. I. c. Veränderliche Prachtkerze. In Mexico. May, Jun. Ch. b.

333. Epilobium, Weidenröslein.

- 1. E. angustifolium. Lin. sp. pl. p. 493. Schmalblättriges VVeidenröslein. In Nordeur, Jun. Jul. Im F. 4. E. spicatum. Pers. 1. c.
- 2. E. angustissimum. Web. dec. pl. minus cognit. p. 3. Rosmarinblättriges Weidenröslein. In Gebirgsholzschlägen in Oesterreich, Grönland u. Südeur. Jun. Jul. Im F. 4. E. angustifolium. Pers. 1. c.
- 3. E. hirsutam. Pers. 1. c. 1. p. 410. Großblüthiges Weidenröslein. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

334. Fuchsia, Fuchsie.

1. F. coccinea. Pers. 1. c. Scharlachrothe Fuchsie. In Chili bis zur Magellanischen Landenge. May — Aug. Ch. 5.

335. Melicocca, Honigfrucht.

- 1. M. bijuga, Pers. l. c. 1. p. 413. Gefiederte Honigfrucht. In Südamer. — . W. H. h.
 - 2. Eine noch unbeschriebene Art von Caracas.
 - 336. Koelreuteria, Kölreuterie.
- 1. K. paniculata. Pers. I. c. Rispenblüthige Kölreuterie. In China. Jul. Aug. Im F. h.

337. Amyris, Balsamstrauch.

- 1. A. polygama. Pers. l. c. 1. p. 414. Geschlechtändernder Balsamstrauch. In Chili. —. Ch. b.
- 2c A. maritima. Pers. l. c. Meerstands Balsamstrauch. Auf Meeresfelsen in Amer. Jul. Aug. W. H. h.

858. Dodonaea, Dodonaa.

1. D. triquetra, Pers. l. c. 1. p. 415. Dreytantige Dodonaa. In Neuholl. Aug. Ch. 5.

359. Acer, Ahorn.

- 1. A. tataricum. Pers. l. c. 1. p. 417. Taritarischer Ahorn. In der Tartarey. May, Jun. Im F. t.
- 2. A. Pseudo Platanus. Pers. l. c. Weißer Ahorn. In Deutschl. der Schweiz, Engl. u. Frankr. May. Im F. 5.
- 3. A. obtusatum. Waldstein et Kitaib. mecrp. Stumpthlättniger Ahorn. In Ungarn u. Croatien. May. Im F. 5.
- 4. A. platanoides. Pers. 1. c. Spitz-Ahorn. Im nördlichen Eur. n. auf Bergen in Steyerm. u. Savoyen. May, Jun. Im F. 5.
 - la iniatum Hortulan. Mit zerschlitzten Blättern.
 - y. palmatum Hortulan. Mit handförmigen Blättern.
- 5. A. rubrum. Pers. 1. c. Rother Ahorn. In Pensylv. u. Ca.ol. Marz, Apr. Im F. 3.
 - A. floribus flavescentibus. Mit gelblichen Blüthen.

- 6. A. dasycarpum. Pers. l. c. Silberblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. b.
- 7. A. saccharinum. Pers. 1. c. Zucker-Ahorn. Von der Hudsonsbay bis Carol. May. Im F. 5.
- 8. A. pensylvanicum. Lin. sp. pl. p. 1496. Gestreifter Ahorn. In Canada, seltner in Carol. u. Florida. May. Im F. t. A. striatum. Pers. l. c.
- 9. A. montanum. Ait. hort. kew. 3. p. 435. Berg - Ahorn. In Canada u. auf dem hohen Alleghanischen Gebirge bis gegen Florida. May. Im F. h. A. spicatum. Pers. 1. c.
- 10. A. campestre. Pers. l. c. Feld-Ahorn. Im südlicher Eur. May. Im F. 3.
- 11. A. Opalus. Pers. 1. c. Italienischer Ahorn. In der Schweiz, Frankr. u. Ital. - Im F. 5.
- 12. A. monspessulanum. Pers. l. c. Französischer Ahorn. In Krain, Ital. u. Frankr. May. Im F. h.
- 13. A. creticum. Pers. l. c. Candischer Ahorn. Im Orient. May. Im F. 5.
- 14. A. Negundo. Pers. l. c. 1. p. 418. Eschenblättriger Ahorn. In Pensylv. n. Carol. May. Im F. h.

360. Correa, Correa.

1. C. alba. Pers. l. c. 1. p. 419. Weisse Cerrea In Neaholl, Jän. — Aug. Ch. 5.

'361. Erica, Heide.

1:

- 1. E. urosolaris, Pers. l. c. 1. p. 420. Becherformige Heide. Am Cap wie die meisten folgenden Arten dieser Gattung. . Ch. h.
- 2. E. aggregata. Donn. cat. cantabrig. p. 110. Gehäuftblüthige Heide. . Ch. 5.
- 3. E. arborea. Pers. l. c. 1. p. 421. Baumartige Heide. In Südeur. May. Ch. 5.
- 4. E. striota. Pers. l. c. Steife Heide. May, Jun. Ch. h.
- 5. E. Tetralix β alba. Pers. l. c. 1. p. 422. Weisse Sumpf - Heide. In Sümpfen des nördlicheren Eur. — Im F. h.
- 6. E. mammosa. Pers. 1. c. Zitzenförmige Heide. May. Ch. t.
- 7. E. vulgaris. Pers. 1. c. Gemeine Heide Auf dürren Hügeln u. in Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. 5.
- 8. E. scoparia. Pers. l. c. 1. p. 423. Besenformige Heide. In Südeur. May, Jun. K. H. h. E. fucata. Thunb. diss. n. 9.
- 9. E. australis. Pers. 1. c. Südliche Heide. In Spanien. — . K. H., h. E. pistillaris. Salish. linnaean. transact. 6. p. 368.
- 10. E. pedunculata. Donn. cat. cantabr. p. 111. Gestielte Heide. Jul. Aug. Ch. 5.
- 11. E. baccans. Pers. l. c. Beerenformige Heide. May, Jun. Ch. p.
- 12. E. arbutifora. Donn. catal. cantabrig. p. 112. Sandbeerenblüthige Heide. —. Ch. h.

- 13. E. hizvida. Andrew. Ericae 2. n. 100. Borstige Heide . Ch. b.
- 14. R. versicolor. Pers. l. c. 1. p. 426. Bunte Heide. Ch. t.
- 15. E. grandiflora. Pers. 1. c. 1. p. 427. Grofsblüthige Heide. Ch. b.
- 16. R. curviflora. Pers. I. c. Krummblüthige Heide. Aug. Ch. h.
- 17. E. simpliciflora. Pers. 1. c. Einfachblüthige Heide. Ch. 5.
- 18. E. mediterranea. Pers. l. c. 1. p. 428. Mittelländische Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. 5.
- 19. E. multiftora. Pers. l. c. Vielblüthige Heide. In Engl. Südfrankr. u. im Orient. März — May. K. H. h.
- 20. E. herbacea. Pers. 1. c. Krautartige Hoide. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. h.
- 21. E. purpurascens. Per. l. c. Italienische Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. h.
- 22. E. longiflora. Pers. l. c. 1. p. 432. Langblüthige Heide. Jun. Jul. Ch. 5. E. elata Hortulan.

362. Daphne, Seidelbast.

- 1. D. Mezereum. Pers. l. c. 1. p. 434. Gemeiner Seidelbast, In Wäldern v. Eur. März. Apr. Im F. h.
- 2. D. alpiña. Pers. I. c. Alpen-Seidelbast. Auf Alpen in Tyrol, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. K. H. h.

- 3. D. Laureola. Pers. 1. c. 1. p. 435. Immergrüner Seidelbast. In Waldern des südlicher. Eur: März, Apr. Im F. ty.
- 4. D. pontica. Pers. 1. c. Pontischer Seidelbast. Im Pontus. May, Jun. K. H. 5.
- 5. D. Gnidium. Pers. l. c. Rispenbläthiger Seidelbast. In Span. Ital. u. Languedoc. May. K. H. 5.
- 6. D. adora, Pers. 1. c. Wohlrischender Seidelbast, In China u. Japan. Jän. März. Ch. p.
- 7. D. Cneorum. Pers. 1. c. Niedriger Seidelbast. In Oesferr. Deutschl. der Schweiz u. Frankrauf sonnigen Hügeln. May, Jun. Im F. h.
- 8. D. oleoides. Pere, l. c. Qelbaumblättriger Seidelbast. In Candien. Jun. — Aug. K. H. h.
- 9. D. collina. Pers. 1, c. Stumpfblättriger Seidelbast. Auf Hügeln in Südital. u. Candien März, Apr. K. H. h.
 - 10. D? Von Caracas.
 - 364. Gnidia, Gnidie.
- 1. G. simplex. Pers. l. c. 1. p. 436. Einfache Gnidie. Am Cap. Apr. — Ang. Ch. 3.
 - 364. Passerina, Vogelkopf.
- 1. P. filiformis. Pers. l. c. Fadenförmiger Vogelkopf. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
 - 365. Lachnaea, Lachnaea.
- 1. L. congtomerata. Pers. 1. c. 2. p. 438. Knaulblüthige Lachnäa. Am Cap. —. Ch. 5.

DIGYNIA.

366. Mochringia, Möhringie.

1. M. muscosa. Pers. I. c. Moosige Möhringie. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Montpellier an Bächen u. Quellen. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

367. Polygonum, Kuöterig.

- 1. P. Bistorea, Pers. l. c. 1. p. 439. Wiesen-Knöterig. Auf Wiesen u. Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.
- 2. P. viviparum. Pere. l. c. Zwiebeltragender Knöterig. Auf Bergen u. trockenen Trieften in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. P. amphibium. Pers. l. c. 1. p. 440. Wasser-Knöterig. In Wassern v. Eur. Jun. Aug. Im F. 24.
- 4. P. orientale. Pers. l. c. Tabacksblättriger Knöterig. Im Orient. May - Jul. Im F. O.
- 5. P. divaricatum. Pers. 1. c. 1. p. 441. Ausgebreiteter Knöterig. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 21.

368. Coccoloba, Sectraube.

- 1. C. uvifera. Pers. 1. c. 1. p. 442. Gemeine Sectraube. In Amer. . W. H. 5.
- 2. C. excoriata, Pers. l. o. Rindenlose Sectranbe. In Westind. —. W. H. b.

- 3. C. punctata. Pers. 1. c. Punctirte Sectraube. In Jamaica. März, Apr. W. H. h.
- 4. C. laurifolia. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. 1. 267. Lorbeerblättrige Seetraube. Zu Caracas. May Jul. W. H. 5.
- 5. C. fagifolia. Jacq. l. c. 3. p. 55. t. 352. Buchenblattrige Sectraube. Zu Caracas. Apr. May. VV. H. 5.
- 6. Eine noch unbeschriebene Art, welche in Caracas zu Hause ist.

369. Paullinia, Paullinie.

- 1. P. cauliflora. Pers. 1. c. 1. p. 443. Stammblüthige Paullinie. Zu Caracas. Jun. Aug. W. H. h.
- 2. P. hispida. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 268. Borstige Paullinie. Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. 5.

370. Seriana, Seriane.

- 1. S. caracasana. Pers. l. c. 1. p. 444. Weitzähnige Seriane. Zu Caracas. Jun. W. H. t. . Paullin. caracasana. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 52 t. 99.
- 2. S. mexicana. Pers. l. c. Mexicanische Seriane. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. h. Paullin. mexicana. Lin. sp. pl. p. 525.
- 3. S. triternata. Pers. l. c. Dreymalgedreys te Seriane. In St. Domingo. W. H. h. Paullin. triternata. Jacq. stirp. amer. 110. t. 180. f. 32

371. Sapindus, Seifenbaum.

- . 1. S. rigidus. Pers. 1. c. 1. p. 445. Eschenblättriger Seifenbaum. Im wärmer. Amer. - . W. H. b.
- 2. S. indicus. Desfont. catal. hort. paris. p. 135. Indischer Seifenbaum. In Ostind. . W. H. h.

TETRAGYNIA.

372. Calanchoë, Calanchoe.

- 1. C. aegyptiaca. Pers. l. c. 1. p. 446. Aegyptische Calanchoe, In Aegypten. K. H. f. Cotyledon nudicaulis. Murr. syst. veget. 14. p. 489.
- 2. C. Verea. Pers. l. c. Gekerbte Calanchoe. In Siera Leone. Jun. —. Aug. W. H. h. Verea crenata Andrew. bot. repos. p. et. t. 21.

373. Halloragis, Meerträublein.

r. H. prostrata. Pers. l. c. Liegendes Meerträublein. In Neuseeland u. der Botanybay. Jun. Jul. Ch. h.

CLASSIS. IX.

ENNEANDRÍA.

MONOGYNIA.

374. Laurus, Lorbeer.

1. L. Cassia, Pers. l. c. r. p. 448. Cassien-Lorbeer In Malabar, Sumatra u. Java. — W. H. h.

- e. L. Camphora. Pers. 1. c. Kampfer-Lorbeer. In Japan. Jun. Jul. Ch. 5.
- 3. L. nobilis. Pers. l. c. Gemeiner Lorbeer. In Ital. u. Griechenl. May, Jup. K. H. 5.
- 4. L. indica. Pers. 1. c. Indischer Lorbeer. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jul. Aug. Ch. 5.
- 5. L. foetens. Pers. l. c. Stinkender Lorbeer. Zu Madera u. den Canarisch. Ins. - Ch. 5.
- 6. L. Borbonia. Pers. l. c. 1. p. 449. Rother Lorbeer. In Carol. u. Virgin. K. H. b.
- 7. L. caroliniensis. Pers. l. c. Carolinischer Lorbeer. In Carol. —. Ch. 5.
- s. L. Diospyrus. Pers. l. c. 1. p. 450. Persimonenartiger Lorbeer. In Nordamer. K. H. t. L. melissaefolis. VValt. fl. carolin.p. 134.
- 9. L. Bonzoin. Pers 1. c. Benzoin Lorbeer. In Virgin. - . K. H. b.
- 10. L. Sassafras. Pers. l. c. Sassafras-Lorheer. In Virgin. Carol. u. Florida. - R. H. h.

375. Rheum. Rhabarber.

- 1. Rh. Rhaponticum. Pers. l. c. 1. p. 451. Stumpfblättrige Rhabarher. In Servien, Pohlen n. Rufsland. Jun. Jul. Im F. 24-
- 2. Rh. undulatum. Pers. l. c. Wellenblättrige Rhabarber. In China u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. Rh. palmatum. Pers. 1. c. Schlitzblättrige Rhabarber. In China. Jun. Jul. Im F. 4.

- 4. Rh. compactum. Pers. 1. c., Dichte Rhabarber. In der Tartarey u. China. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 5. Rh. hybridum. Pers. l. c. Bastard Rhabarber. ln Nordasien. Jun. Jul. Im F. A.

376. Butomus, Wasserlisch.

1. B. umbellotus. Pers. l. c. Doldenblüthiger Wasserlisch. In Pfützen u. Teichen v. Eur. Jan. Jul. lin freyen Wasserbelfältef. 4.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

377. Sophora, Sophore,

- 1. S. tetraptera. Pers. I. c. 1. p. 442. Flügelfrüchtige Sophere. In Neuseeland. Apr. May. K. H. 5.
 - 2. S. microphylla. Pers. 1. c. Kleinblättrige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. 5.
 - 3. S. alapseuroides. Pers. l. c. Fuchsechwanzartige Sophore. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 4. S. Vomentosa. Pers. 1. c. Filzige Sophore. In Neuseeland. — . K. H. b.
 - 5. S. japonica. Pers. 1. c. Japanische Sophere. In Japan. Aug. Sept. Im F. 5.

378. Podalyria, Podalyrie.

- 1. P. australis. Pers. l. c. 1. p. '453. Südliche Podalyrie. In Carolina, Jun. Jul. Im F. 4.
- s. P. genistoides. Willd. sp. pl. 2. p. 502. Ginsterartige Podalyrie. Am Cap. - . Ch. p.
- 3. P. myrtillifolia. Pers. l. c. Heidelbeerblättige Podslyrie. Am Cap. . Ch. 5.
- 4. P. biflora. Pers. 1. c. Zweyblüthige Podalyrie. Am Cap. -. Ch. h.

379. Anagyris, Anagyris.

1. A. foetida. Pers. l. c. 1. p. 454. Stinkende Anagyris. Auf Bergen in Span. Ital. u. Sicilien. May. K. H. 3.

380. Cercis, Judasbaum.

- 1. C. Siliquastrum. Pers. 1. c. Europäischer Judasbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. h.
- 2. C. canadensis. Pers. l. c. Canadischer Judasbaum. In Pensylv. Virgin. u. Carolina. May, Jun. Im F. b.

381. Bauhinia, Bauhinie.

- 1. B. aculeata. Pers. l. c. Stachlige Bauhinie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.
- 2. B. porrecta, Pers. l. c. Spitzblättrige Bauhinie. In Jamaica u. Hispaniela. — . W. H. b.

382. Hymenaea, Locustbaum.

1. H. Courbaril. Pers. l. c. 1. p. \455. Gemeiner Locustbaum. In Südamer. — . W. H. b.

383. Cassia, Cassie.

- 1. C. Absus. Pers. l. c. 1. p. 456. Agyptische Cassie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.
- 2. C. bicapsularis. Pers. l. c. Zweyfächrige Cassie. In Ostind. May, Jun. W. H. 15.
- 3. C. acuminata. Pers. l. c. Langspitzige Gassie. In Wäldern von Gujana. W. H. h.
- 4. C. corymbosa, Pers. 1. c. Doldentraubige Cassie. Zu Buenos Ayres, Jun. W. H. h.
- 5. C. occidentalis. Pers. 1. c. 1. p. 457. Westindische Cassie. In Jamaica. May -Jul. W. H. 5.
- 6. C. atomaria. Pers. 1. c. Punktirie Cassie. In Amer. —, VV. H. 7.
- 7. C. chinensis. Pers. l. c. Chinesische Cassie. Bey Pecking in China. Apr. May. W. H. h.
- 8. C. tomentosa. Pers. l. c. 1. p. 458. Filzige Cassie. In Südamer. . W. H. 5.
- g. C. alata. Pers. l. c. Gessügelte Cassie. Im wärmer. Amer. —. VV. H. h.
- 10. C. marilandica. Pers. l. c. Marilandische Cassie. In Virgin. u. Mariland. Jul. Aug. Im F. 24.

384. Bactyrilobium, Rohrcassie.

1. B. Fistula. Willd. enum 1. p. 439. Röhvenfrüchtige Rohrcassie. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h. .
Cathartocarpus Fistula. Pers. I. c. 1. p. 459.
Cassia Fistula. Lin., sp. pl. p. 540.

385. Parkinsonia, Parkinsonie.

1. P. aculeata. Pers. l. c. Stachlige Parkinsonie. Im wärmer. Amer. Jun, Jul. W. H. 5.

386. Caesalpinia, Caesalpinie.

- 1. C. vesicaria. Pers. l. c. 1. p. 460. Ausgerandetblättrige Cäsalpinie. In Jamaica. —. W. H. h. C. bijuga. Swarz observ. 166.
- 2. C. Sappan. Pers. l. c. Brasilienholz Cisalpinie: In b yden Ind. -. W. H. f.
- 3. C. Crista. Pers. 1. c. Vielstachlige Cäsalpinie. In Jamaica. W. H. b.

387. Hoffmanseggia, Hoffmanseggie.

1. H. falcaria. Pers. I. c. Sichelfrüchtige Hoffmanseggie. Auf hohen Bergen im Südamer. —-VV. H. b.

388. Moringa, Behennufs.

1. M. zeylonica. Pers. l. c. 1, p. 461. Zeylonische Behennufs. In Zeylon, Amer. u. Aegyptauf sandigem Boden. Jun. W. H. h. Hyperanthera Moringa. Vahl symbol. 1. p. 30. Gudandina. Moringa. Lin. sp. pl. p. 546.

369. Adenanthera, Drüsenblume.

Drusenblume. In Ostind. — W. H. 5.

390. Schotia, Schotie.

- 1. Sch. speciese. Pers. l. c. 1. p. 462. Prächtige Schotie. In Senegall u. am Cap. Aug. Sept. W. H. h.
- 2. Sch. latifolia. Jacq. fragm. bot. p. 23. n. 6e. t. 15. f. 4. Breitblättrige Schotie. Am Cap. Ang. W. H. b.

391. Guaiacum, Franzosenholz.

blättriges Franzosenholz. In Hispaniola u. Jamaioa. Jun. — Aug. W. H. h.

392. Zygophyllum, Doppelblatt.

- 1. Z. Fabago. Pers. l. c. Gemeines Doppelblatt. In Syrien, Mauritanien u. am Caucasus. Jun. Jal. Im F. 24.
- 2. Z. foetidum. Pers. I. c. Stinkendes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. b.
- 3. Z. Morgsana. Pers. l. c. Kurzgestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
- 4. Z. sessilifolium. Pers. I. c. Ungestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

393. Dictamnus, Diptam.

1. D. alhus. Lin. sp. pl. p. 548. Weißwurzlicher Diptam. In Süddeutschl. Ital. u. Frankr. auf Kalkgebirge. May, Jun. Im F. 4. D. Fraxinella. Pers. l. c. 1. p. 464.

B. floribus albis. Mit weißen Blüthen.

394. Ruta, Raute.

- 1. R. graveolens. Pers. 1. c. Gemeine Raute. In Sudeur. Jun. Jul. Im F. 5.
- 2. R. montana. Pers. l. c. Berg-Raute. Auf Hügeln in Südeur. Jun. Jul. K. H. 5. R. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. Collect. 1. p. 74.
- 3. R. chalepensis. Pers. l. c. Aleppische Rante In Natolien. Jun. Jul. K. H. 5.

395. Limonia, Limonie.

1. L. trifoliata. Pers. l. c. 1. p. 466. Dreyblättrige Limonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. b.

396. Murraya, Murraye.

1. M. exotica. Pers. l. c. Indische Murraye. In Ostind. May, Jun. W. H. b.

397. Kookia, Kookie.

1. R. punctata. Pers. l. c. Punktirte Koekie. In China. Jun. Jul. VV. H. 3.

398. Trichilia, Trichilie.

. 1. Tr. spondiodes, Pers. l. c. 1.p. 468. Mirobalanenartige Trichilie. Auf waldigen Bergen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. b.

2. Tr. capensis. Pers. l. c. Capische Trichilie. Am Cap in Waldern. Jun. W. H. t. Ekebergia capensis. Sparmann act. holm. 1779. p. 252. t. 9.

399. Melia, Zedrach.

- 1. M. Asedarack. Pers. l. c. 1. p. 469. Glatter Zedrack. In Syrien, Zeylon u. Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.
- 2. M. sempervirens, Pers. 1. c. Immergrüner Zedrach. An Hecken in Jamaica. Jun. Aug. VV. H. B.

400. Melastoma, Schwarzschlund.

1. M. cymosum, Pers. l. c. 1. p. 471, Afterdoldiget Schwarzschlund. In Südsmer. — . IV. H. b.

401. Kalmia, Kalmie.

- 1. K. latifolia. Pers. 1. c. 1. p. 477. Breitblättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. b.
- 2. K. angustifolia. Pers. 1. c. Schmalblättige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. 5.
- 3. K. glauca. Pers. l. c. Graugrune Kalmie. Zu Terra Nova. May. K. H. 5.

402. Ledum, Porst.

- 1. L. palustre. Pers. l. c. Sumpf-Porst. In Sümpfen v. Nordeur. Apr. May. K. H. h.
- 2. L. tatifolium. Pers. 1. c. Breitblättriger Porst- In Sümpfen v. Grönland u. Amer. Apr. May. K. H. t.

403. Rhododendron, Alphalsam.

- 1. Rk. ferrugineum. Pers. I. c. 1. p. 478. Rostfärbiger Alphalsam. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. Aug. K. H. 5.
- e. Rh. hirsutum. Pers. 1. c. Gefranzter Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Salzh. n. der Schweiz. Jun. — Aug. K. H. b.
- 3. Rh. Chamaecistus. Pers. 1. c. Drüsiger Alphalsam. Auf den Oesterr. Krainerschen u-Salzburgeralpen. Jun. Jul. K. H. .
- 4. Rk. ponticum. Pers. I. c. Pontischer Alpbalsam. Im Orient u. bey Gibraltar. May — Jul. K. H. 5.
 - β. foliis undulatis. Mit wellenförmigen Blätternγ. variogatis gestreiften
 - 3. obtusis. stumpfen.
 - s. -- angustis schmalen
- 5. Rh. maximum. Pers. 1. c. Großer Alpbalsam. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. 5.

404. Vaccinium, Heidelbeere.

- 1. V. Myrtillus. Pers. l. c. Gemeine Heidelbeere. In schattigen Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. h.
- 2. V. orboreum. Pers. l. c. 1. p. 479. Baumartige Heidelbeere. In Nordamericanischen Wäldern. K. H. 5.
- 3. V. pensylvanicum. Pers. 1.c. Pensylvanische Heidelbeere. In Pensylv. May. K. H. 5.

405. Andromeda, Andromede.

- 1. A. polifolia. Pers. l. c. 1. p. 481. Poleyblättrige Andromede. Auf Torfboden in Oesterr. Nordenr. u. Amer. Jun. Jul. K. H. t.
 - 8. latifolia. Mit breiteren Blättern.
- 2. A. repens. Hort. paris. Kriechende Andromede. —. Jun. Jul. K. H. .
- 3. A. paniculata. Pers. 1. c. Rispenblüthige Andromede. In Virgin. — . K. H. 5.
- 4. A. axillaris. Pers. 1. c. Winkelblättrige Andromede. In Virgin. Carol. u. Georgien. - K. H. 5.
- 5. A. acuminata. Pers. l. c. Zugespitzte Andremede. In Nordamer. — K. H. 5. A. lucida. Jacq. ic. rar. 1. t. 79. Collect. 1. p. 95.
- 6. A. serratifolia. Catal. hort. carlsruh. 1. p. 88. Sägeblättrige Andromede. . R. H. 5.
- 7. A. calyoulata. Pers. 1. c. Gekelchte Andromede. In Eur. Asien u. Nordamer. -. K. H. 5.
- 8. A. orispa. Hort. paris. Krause Androme-

406. Arbutus, Sandbeere.

- 1. A. Unedo. Pers. 1. c. 1. p. 482. Erdbeerartige Sandbeere. In Südeur. Croatien u. im Orient, Nov. Jänn. K. H. h.
- 2. A. Andrachne. Pers. 1. c. Candische Sandbeere. Im Orient. Nov. Febr. K. H. 5.
 - β. foliis serratis. Mit gesägten Blättern.

3. A. Uva-ursi. Pers. l. c. 1. p. 483. Gemeine Sandbeere. Im nördlichen u. auf Alpen in Südeur. Jun. Jul. K. H. ty.

407. Clethra, Clethra.

- 1. Cl. alnifolia. Pers. 1. c. Ellerblättrige Clethra. In Pensylv. Jun. Jul. Ch. 5.
- 2. Cl. pubescens. Willd. enum. 1. p. 455. Weichhaarige Clethra. In Carolina. Jun. Jul. K. H. b. Cl. incana. Pers. l. c.
- 3. Cl. arborea. Pers. 1. c. Baumartige Clethra. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

408. Pyrola, Wintergrun.

- 1. P. rotundifolia. Pers. 1. c. Rundblättriges Wintergrün., In Waldungen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. P. secunda. Pers. 1. c. Einseitiges Wintergrün. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

409, Styrax, Storax.

1. St. officinale. Pers. l. c. Aechter Storax. In Syrien, Judäa u. Italien. — . K. H. h.

410. Terminalia, Catappenbaum.

1. T. Benzoë. Pers. l. c. 1. p. 485. Schmalhlättriger Catappenbaum. In Ostind. Jun. W. H. h. T. angustitolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 51. t. 100-

DIGYNIA.

411. Royena, Royene.

- 1. R. lacida. Pers. 1. c. 1. p. 486. Glänzende Royene. Am Cap. Jul. Ch. † .
- 2. R. glabra, Pers. 1. c. Glatte Royene. Am. Cap. . Ch. 5.
- 3. R. pubescens. VVilld. enum. 1. p. 457. Weichhaarige Royene. Am Cap. . Ch. 5. R. hirsuta. Pers. 1. c.
- 4. R. hirsuta. Willd. l. c. Haarige Royene. Am Cap. —. Ch. 5.
- 5. R. polyandra, Pers. l. c. Vielfadige Royene. Am Cap. - . Ch. b.
- 6. Eine noch unbeschriebene der vorhergehenden ähnliche Art, die ebenfalls am Cap zu Hause ist.

412. Hydrangea, Hydrangea.

- 1. H. arborescens. Lin. sp. pl. p. 568. Baumartige Hydrangea. Auf Bergen in Virginien u. Carol. May. R. H. 5.
 H. vulgaris. Pers. l. 4.
- 2. H. hortensis. Smith ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Garten Hydrangea. in China u. Japan, Jun. Aug. Ch. 5.

 Hortensia speciosa. Pers. 1. c. 1. p. 505.

-- opuloides. Lam encycl. 3. p. 136.

3. H. radiata. Lam. illustr. gen. t. 370. f. 2. Herzblättrige Hydrangea. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. t. H. nivea, Pers. l. c.

4. H. quercifolia. Bartram itin. ed. germ. p. 366. t. 7. Eichenblättrige Hydranges. In Florida. Jul. Aug. K. H. h.

413. Saxifraga, Steinbrech.

- 1. S. intacta. Willd. hort. berol. 2. p. 75. t. 75. Unversehrter Steinbrech. Auf Tyroleralpen. Jur. Jul. Im F. 24.
- 2. S. crassifolia, Pers. l. c. 1. p. 488. Dickblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Sibirien. Apr. May. Im F. 24.
- 3. S. sarmentosa. Pers. 1. c. Wuchernder Steinbrech. In China u. Japan. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. S. umbrosa. Pers. I. c. Schattenliebender Steinbrech. Auf Bergen in England. Jun. Jul. Im F. 4.
 - 5. S. cuncifolia, Pers. 1. c. Keilblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr, u. der Schweiz-Jun, Jul. Im F. 21.
 - 6. S. oppositifolia. Lin. sp. pl. p. 575. Paarblättriger Steinbrech. Auf Alpen in der Schweiz, Lappland, den Spitzbergen u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 24. S. coerulea Pers. 1. c.
 - 7. S. Geum. Pers. l. c. Nierenblättriger Steinbrech. Auf europ. Alpen Jun. Jul. Im F. 4.
 - 8. S. rotundifolia. Pers. 1. c. 1. p. 489. Rundblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jan. Jul. Im F. 24.
 - g. S. decipiens. Pors. l. c. r. p. 490. Trüglicher Steinbrech. Auf Niederalpen in Deutschland m. England. Jun. Jul. Im F. 4.

414. Gypsophila, Gypskraut.

- 1. G. repens. Pers. L. c. 1. p. 492. Kriechendes Gypskraut. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. May, Jun. Im F. 4.
- 2. G. paniculata. Pers l. c. Rispenblüthiges Gypskraut. In Sibir. u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. G. Saxifraga. Pers. 1. c. Steinbrechartiges Gypskraut. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 4.

415. Saponaria, Seifenkraut.

- 1. S. officinalis. Pers, l. c. Gemeines Seifenkraut. In Mitteleur. an Bächen. Jun, Jul. Im F. 24.
- 2. S. Ocymoides. Perg. l. c. Rundblättriges Seifenkraut. In der Schweiz, Ital. u. Montpellies. Jun. — Aug. K. H. 4.

416. Dianthus, Nelke.

- 1. D. barbatus. Pers. l. c. 1. p. 493. Bart-Nelke. In Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. D. asper. Willd. enam. 1. p. 466. Rauhe Nelke. In Tyrol u. der Schweiz, Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. D. corthusianorum. Pers. l. c. Feld Nelke. Auf sonnigen Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. D. Armeria. Pers. 1. c. Brischel-Nelke. Auf durrem Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. O.

- 5. D. prolifer. Pers 1. c. Sprossende Nelke. Auf Hügeln im südlicher. Eur. u. den Linienwallen VViens. Jun. Jal. Im F. 24.
- 6. D. Caryophyllus. Pers. l. c. Garten Nelke. In Ital. Jul. Aug. K. H. 4.
- 7. D. sylvestris. Pers. l. c. Wilde Nelke. In der Schweiz. Krain u. Kärnthen. Jun Jul. Im F. 24.
- 78. D. fruticosus. Pers. 1. c. Strauchartige Nelke. In Griechenl. Jul. — Sept. K. H. t.
- 9. D. chinensis. Pers. l. c. 1. p. 494. Chinesische Nelke. In China. Jup. Aug. Im F. O.
- 10. D. deltoides. Pers. 1, c. Deltasseckige Nelke. In Eur. Jul Im F. 4.
- 11. D. plumarius. Pers. 1. c. Feder, Nelke. In Eur. Jun. Aug. Im F. 4.
- 12. D. superbus. Pers. l. c. 1. p. 495. Stelze Nelke. Auf feuchten Waldwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.
 - 13. D. alpinus. Pers. l. c. Alpen Nelke. In Oesterr. Steyerm. u. Sibir. Jun, Jul, K. H. 4.

TRIGYNIA.

417. Cucubalus, Taubenkropf.

- 1. C. Behen. Pers. 1. c. Aufgeblasener Taubenkropf. Auf Wiesen im nördlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. C. maritimus. Pers. l. a. 1. p. 496. Meerstrands-Taubenkropf. Jn Südfrankr. am Meerstrande, Jun. Jul. Im F. 24.

g. C. italicus. Jacq. obs. bot. 4. p. 12. t. 79. Italienischer Taubenkropf. In Italien. Jun. — Aug. Im F. 斗.
Silene italica. Pers. l. c. 1. p. 498.

418. Silene, Silene,

- 1. S. quinquevulnera. Pers. l. c. Fünffleckige Silene. In Südeur, Jun. Jul. Im F. Q.
- 2. S. nutans. Pers. I. c. Hängende Silene. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. S. fruticosa. Pers. l. c. 1. p. 497. Strauchartige Silene. In Sicil. Jun. Jul. K. H. 5.
- 4. S. viridiflora. Pers. 1. c. Grünblüthige Silene. In Ungarn, Portugall, u. Spanien. Jun. Jul. Im F. J.
- 5. S. gîgantea. Pers. 1. c. Hohe Silene. In Africa: Jun. Aug. K. H. J.
- 6. S. ornata. Pers. l. c. 1. p. 498. Dunkelfarhige Silene. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 7.
- 7. S. bipartita. Pers. l. c. 1. p. 499. Zweytheilige Silene. In Sibir. Jun. Aug. K. H. O.
- 8. S. Armeria. Pers. l. c. Garten Silene. In Engl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. O.
- 9. S. alpestris. Pers. 1. c. 1. p. 500. Alpen-Silene. Auf den Oesterr. Alpen. Jun. - Aug. K. H. 24.
- 10. S. acaulis. Pers. 1. c. Stiellose Silene. Auf Europ. Alpen. Jun. — Ang. K. H. 4.

419. Stellaria, Sternmiere.

1. St. graminea. Pers. 1. c. 1. p. 301. Gras. artige Sternmiere. Auf trockenen Trieften in Eur. May. Im F. 24.

420. Arenaria, Sandkraut.

- 1. A. glandulosa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 56. t. 355. Drüsiges Sandkraut. Am Cap. Jun. Aug. Ch. 4.
- 2. A. graminifolia. Willd. enum. 1. p. 481. Grasblättriges Sandkraut. In Sibir. der Ukrain u. Tartarey. Jun. Jul. Im. F. 4.

421. Malpighia, Malpighie.

- 1. M. glabra. Pers. l. c. 1. p. 505. Glatte Malpighie. In Jamaica, Curassao, Surinam u. Brasilien. May, Jun. W. H. ‡.
- 2. M. glandulifera. Jacq. collect. 4. p. 207. Ic. rar. 3. t. 466. Drüsentragende Malpighie. In Wäldern zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5. M. glandulosa B glandulifera. Pers. 1. c.
- 3. M. argentea. Jacq. fragm. bot. p. 57.n. 186. t. 83. Silberne Malpighie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. b.
- y 4. M. tuberculata. Pers. l. c. Warzige Malpighie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. h.
- 5. M. urèns. Pers. l. c. 1. p. 506. Brennende Malpighie. Im wärmer. America. — VV. H. b.
- 6. M. coccifera. Pers. 1. c. Stachelblättrige Malpighie. Im wärmer. Amer. —. VV. H. h.
 - 7. M.? Von der Insel Providenz.

422. Banisteria, Banisterie.

- 1. B. angulosa. Pers. l. c. Eckige Banisterie. Im wärmer. Amer. Jun. W. H. 5.
- 2. B. ciliata. Pers. l. c. 1. p. 507. Gefranzte Banisterie. In Brasilien. Jun. Jul. W. H. h.
- 3. B. chrysophylla. Pers. l. c. Goldblättrige Banisterie. In Brasilien u. zu Caracas. Jun. — Aug, W. H. h.
- 4. B. tomentosa. Desfont. cat. hort. paris. p. 136. Filzige Banisterie. In Südamer. —. W.H. 5.
- 5. B. laurifolia. Pers. 1. c. Lorbeerblättrige Banisterie. In Hispaniola u. Jamaica. —. VV.H. b.
 - 6. Eine noch unbeschriebene Art v. Caracas.

PENTAGYNIA.

423. Cotyledon, Nabelkraut.

- 1. C. orbiculata. Pers. l. c. 1. p. 510. Kreisblättriges Nabelkraut. Am Cap. - . Ch. b.
- *. C. paniculata? Pers. l. c. Rispenblüthiges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. 5.
- 3. C. fascicularis. Pers. l. c. Büschelblättriges Nabelkraut. Am Cap. — . Ch. h.
- 4. C. Umbilicus. Pers. 1. c. Gemeines Nabelkraut. In Portugall, Span. s. Engl. May, Jun. K. H. 21.
- 5. C. hemisphaerica. Pers. 1. c. Halbkugelförmiges Nabelkraut. In Aethiop. Jul. Aug. Ch. 5.
- 6. C. coccinea. Pers. 1. c. Scharlachrothes Nabelkrant, . Febr. Ch. 5.

- 7. C. sparia. Pers. 1. c. Bastard-Nabelkraut. Am Cap. Ch. 5.
- 8. C. tuberculosa. Pers. 1. c. 1. p. 511. Höekeriges Nabelkraut. Am Cap. — Ch. 5.
- 9. C. ungulata. Pers. l. c. Hufformiges Nabelkraut, In Africa. —. Ch. 5.

424. Sedum, Mauerpfesser.

- 1. S. Telephium. Pers. l. c. 1. p. 511. Knolliger Mauerpfeffer. Auf trockenen Hügeln v. Eur. Aug. Sept. Im F. 4.
- 2. S. Anacampseros. Pers. l. c. Rundblättriger Mauerpfeffer. Auf Felsen in der Provence u.-Ital. May, Jun. Im F. 24.
- 3. S. Cotyledon. Jacq. eelog. fasc. 2. p. 27. t. 17. Nabelkraut-Mauerpfoffer. — Jun. Jul. Ch. 4.
- 4. S. Aizoon. Pers. l.c. Gelber Mauerpfeffer. Sibir. May, Jun. Im F. 4.
- 5. S. hybridum. Pers. l. c. Gamanderblättriger Mauerpfesser. In der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 21:
- 6. S. populifolium. Pers. 1. c. Pappelblättriger Mauerpfesser. Auf Alpen in Sibir. Jun. Jul. Im F. h.
- 7. S. Rhodiois. Decand. pl. succ. p. 143. t. 143. Rosenwurzartiger Manerpfesser. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien, Lappland u. England. Jun. Jul. Im F. 4. Rhodiola rosea. Pers. l. c. 2. p. 625.

- 8. S. spinesum. Willd. enum. 1. p. 485. Stachliger Mauerpfesser. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
 Crassula spinosa. Pers. l. c. 1. p. 339.
- 9. S. dasyphyllum. Pers. 1. c. 1. p. 512. Bereifter Mauerpfeffer. Auf Felsen in Südeur. besonders der Schweiz. Jun. Jul. K. H. 24.
- 10. S. reflexum. Pers. l. c. Zurückgebogener Mauerpfeffer. Am Fusse der Berge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 11. S. rupestre. Pers, l. c. Felsen-Mauerpfeffer. Auf Felsen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

425. Oxalis, Sauerklee.

- 1. O. monophylla. Pers. l. c. 1. p. 514. Einblättriger Sauerklee. Ist, wie alle folgende, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. Nov. Dec. Ch. 24.
- 2. O. lepida. Pers. 1. c. Niedlicher Sauerklee. Oct. - Dec. Ch. 24.
- 3. O. rostrata. Pers. 1. c. Schnabelförmiger Sauerklee. Oct. Dec. Ch. 4.
- 4. O. asinina. Perse l. c. Eselsohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.
- 5. O. leporina. Pers l. c. Hasenohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.
- 6. O. crispa. Pers. 1. c. Krauser Sauerkles. Oct. Nov. Ch. 4.
- 7. O. fabaefolia. Pers. 1. Bohnenblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 21.

- s. O. unduleta. Pers. 1. c. Wellenblättriger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 2.
- g. O. virgines. Jacq. hort. schoenhr. 3. p. 13. t. 275. Blaiser Sauerkiee. Sept. Oct. Ch. 4.
- 10. O. fuscata, Pers. 1. c. Braunfleckiger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.
- 11. O. exaltata. Pers. 1. c. Steifschaftiger Sanerklee. Dec. Ch. 24.
- 12. O. grandiflora. Pers. l. c. 1. p. 515. Großblüthiger Squerklee. Nov. Dec. Ch. 4.
- 13. O. purpurea. Pers. 1. c. Purpurblättiger Sauerklee Sept. Oct. Ch. 4.
- 14. O. laxula. Pers. l. c. Schlaffer Sauerklee. Oct. Dec. Ch. 21.
 - B. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.
- 15. O. speciosa. Pers. l. c. Schönster Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
 - β. suggillata, Mit blaurothen Blattstielen.
- γ. rigidula. Mit steifen Blattstielen.
- erklee. In schattigen Hainen v. ganz Eur. u. Japan. Apr. Jun. Im F. 4.
 - 17. O. marginata. Pers. I. c. Randblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 4.
 - 18. O. pulchella. Pers. I. c. Schöner Sauer-klee. Oct. Ch. 24.
 - 19. O. punctata. Pers. I. c. Punktirter Sauer-klee. Oct. Ch. 4.
 - 20. O. pusilla. Pers. I. c. 1. p. 516. Niedriger Sanerkles. Dec. Ch. 24.

- 11. O. cruentata. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 66. t. 45. Bluthfleckiger Sauerklee. Apr. May. Ch. 24.
- 22. O. compressa. Pers. 1. c. Flachstieliger Sauerklee. Jän. Febr. Ch. 21.
- 23. O. tetrophylla, Pers. 1. e. Vierblättriger Sauerkiee. In Mexico, Jun. Jul. Ch. 24.
- 24. O. violacea. Pers. l. c. Violeter Sauerklee. In Virgin. u. Canada. Bl. den ganzea Sommer hindurch. Ch. 24.
- 25. O. cernua. Pers. l. c. Langender Saucz-kiee. Oct. Febr. Ch. 24.
- 26. O. dentata, Pers. l. c. Gezähnter Sauer-klee. Nov. Ch. 4.
 - 27. O. livida. Pers. 1. c. Blaublättriger Sauer-klee. Nov. Dec. Ch. 24.
 - 28. O. purpurata. Jacq., hort. scheenbr. 3. p. 57. t. 356. Purpurblättriger Sauenkles. Nov. Dec. Ch. 24.
 - 29. O. convexula. Pers. 1. c. 1. p. 517. Bogigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 4.
- 30. O. versicolor. Pers. l. c. Bunter Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
 - 31. O. elongata. Pers. I. c. Langstieliger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
 - 32. O. polyphylla. Pers. 1. c. Vielblättriger Sanerklee. Oct. Dec., Ch. 24.
 - 33. O. Airta. Pers. 1. c. Rauher Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.
 - 34. O. multiflora. Pers. l. c. 1. p. 513. Vielblüthiger Sauerkles. Oct. Nov. Ch. 24.

- 35. O. rubella. Pers. 1. c. Röthlicher Sauer-Ries Oct. — Dec. Ch. 24.
- 36. O. reptatrix. Pers. 1. c. Wuchernder Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.
- 37. O. incarnata. Pers. 1. c. Fleischfarbigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.
- 38. O. stricta. Pers. 1. c. Steifer Sauerklee. In Virgin. u. Jamaica. May — Aug. Im F. 4.
- 39. O. pectinata. Pers. l. c. 1. p. 519. Langblättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.
 - 8. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.
- 40. O. flabellifolia. Pers. l. c. Fächerblättriger Sanerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
- 41. O. flava. Pers. I. c. Gelber Sauerklee. Sept. Ch. 24.
- 42. O. corniculata. Pers. 1. c. Gehörnter Sauerklee. In Südeur: u. Japan. Jun. — Aug. Im F. 21.
 - **(3.**)
 - 45.) Noch unbeschriebene Capische Arten-
 - 46.)
 - 47.)

426. Agrostemma, Raden.

- 1. A. Coronaria. Pers. l. c. Garten-Raden. In Ungarn, Ital. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 6. 8. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.
- 2. A. Flos jovis. Pers. l. c. 1. p. 520. Doldentraubiger Raden. In der Schweiz, der Pfalz us Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

3. A. Coeli rosa, Pers. 1. c. Glattblättriger Raden. In Sicilien u. im Orient. Jun. Jul. Im F. Q.

427. Lychnis, Lichtröslein.

- 1. L. chalcedonica. Pers. l. c. Scharlachrothes Lichtröslein. In ganz Russland. Jun. Im F. 24.
- 2. L. Flos cuculi. Pers. l. c. Kuckucks Licht-röslein. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. L. coronata, Pers. 1. c. Großblüthiges Lichtröslein, In China u. Japan. Jul. Ch. 24. L. grandiflora, Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Collect. 1.p. 142.
- 4. L. Viscaria. Pers. l. c. Klebriges Lichtröslein. Auf trockenen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. A.
- 5. L. dioica. Pers. l. c. Gemeines Lichtröselein. Zwischen den Saaten im Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 6. L. lasta, Pers. 1. c. Angenehmes Licht-röslein. In Portugall, Jun. Jul. 1m F. O.

DE CAGYNIA.

428. Phytolacca, Kermesbeere.

- 1. Ph. octandra. Pers. l. c. 1. p. 522. Acht-fadige Kermesbeere. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.
- 2. Ph. abyssinica. Pers. 1. c-1. p. 523. Abyssinische Kermesbeere. In Abyssinien. . W. H. h.

3. Ph. decandra. Pers. 1. c. Zehnfädige Kermesbeere. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 4.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

429. Asarum, Haselwurz.

z. A, curopaeum. Pers. l. c. 2. p. 1. Europäische Haselwurz. In Hainen v. Eur. Apr. Im F. 2.

430. Bocconia, Bocconie.

1. B. frutescens. Pers. l. c. Strauchartige Bocconie. In Westind. Dec. - Febr. W. H. 5.

2. B. cordato. Pers. l. c. Hereblättrige Boc-

431. Halesia, Halesie.

1. H. tetraptera. Pers. 1. c. 2. p. 4. Vier-Bügliche Halesie, In schattigen Wäldern zu Carolina. Jun. K. H. h.

-432. Decumaria, Decumarie.

1. D. barbara. Pers. l. c. Gemeine Decuma rig. In Carol. Jun. K. H. 1.

433. Canella, Canellbaum.

1. C. alba. Pers. I. c. Weisser Canellbaum, Iu den innern Vyäldern v. Ostind. Jun. Jul. VV. H. 5.

434. Triumfetta, Triumfette.

- 1. Tr. Lappula. Pers. l. c. 2 p. 5. Kelchlose Triumfette. In Jamaica, Brasilion u. den Bermudischen Inseln. Jun. Jul. VV. H. b.
- Trumfette. Im wärmer. Amer. Dec. Märn. W. H. h.

435. Portulação, Portulak.

v. P. pilosa, Pers. l. p. 2. p. 6. Haariger Portulak. In Südamer. Jun. Jul. Ch. O.

436. Talimum, Talinum.

- 2. T. filamentosum. Curt. bot. mag. t. 1367. Vielfädiges Talinum. Am Cap. - . Ch. h.

437. Lythrum, Weiderich.

- 2. L. Salicaria. Pers. 1. c. 2. p. 7. Gemeiner Weiderich. An Bächen in Eur, Jun. Jul. Im. F. 24.
- Veiderich. In Oesterr. Sibirion u. der Tartaren auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 2.

DIGYNIA.

438. Heliocarpus, Sonnenfrucht.

1. H. americana: Pers. I. c. 2. p. 9. Americanische Sonnenfrucht. Auf Veracrux. Febr.-März. VV. H. h. Heliocarpus americana. Jacq. hort. schoenbr.

439. Agrimonia, Odermennig.

nemig In Europ. Waldern: Jul. Aug: Im F.

2. A. odorata. Pers. l. c. Wohlriechender Odermennig. In Brab June Jali Im F. 24.

THIGYNIA AND MALE

440. Reseda, Resede 7

2. R. odorata. Pers. 1. c. Wohlriechentte Resede. In Aegypten Blüht den genzes Semmer hindurch. K. H.

441. Aristotelia, Aristotelie.

i. A. Macqui, Pers. L.c. Chilische Aristote-lie. In Chili, May, Jun. Ch. b.

442. Euphorbia, Wolfsmilch.

- 1. E. antiquerum. Pers. I. c. Wahre Wolfsmilch. In Ind. u. Aegypt. . VV. H. t.
 - 2. E. trigona. Mill. dict. n. 2. Dreyeckige Wolfsmilch. In Westind. W. H. h.
 - 3. E. canariensis. Pers. 1. c. Canarische Wolfsmilch, Auf den Canarisch, Inseln. . Ch. b.

- 4. E. cereiformis. Pers. 1, c. Fackeldistelartige Wolfsmileh. In Acthiop. —. Ch. t.
- Volfsmilch. Im wärmer. Africa. —. W. H. 5.
- 6. E. nereifolia. Pers. l. c. 2. p. 11. Olean derblättrige Wolfsmilch. In Ostind. . VV. H. b.
- il 7. E. loricata. Pers. 1. c. Vieldornige Wolfs-milch. Am Cap. Jan. Jal. Ch. 17. E. Histrix. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 43. t. 207.
- 8. E. Capus medusae. Pers. 1. c. Medusenhaupt - Wolfsmilch. Am Cap u. in Aethiop. — . Ch. 5.
- 9. E. Ornithopus. Jacq. fragm. bet. p. 76. n. 238. t. 120. f. 2. Vogelfusartige Wolfsmilch. Am Cap? Jun. Jul. Ch. h.
- 10. E. buplaurifolia. Pers. l. c. Hasenöhrlein-Volfsmilch. Am Cap. März, Apr. Ch. 5.
- 11. E. mauritanica: Pers. l. c. Mauritanische Wolfsmilch. In Africa. Jul. Aug. W. H. h.
- 12. E. bracteatu. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 14. t. 276. Beblätterte: Wolfsmilch. — . Apr. — Ang. W. H. 5.
- 13. E. atropurpurea. Willd. enum. 1 p. 501.

 Dunkelrothe Wolfsmilch. Zu Teneriffa. W.,
 H. h.
- 14. E. pischtoria. Pers. I. c. Fischer-Wolfsmilch. Auf Madera u. den Canarischen Inseln.

 —. Ch. t.
- 15. E. biglandulosa. Willd. enum. suppl. p., 27. Zweydrüsige Wolfsmilch. . W. H. b.

- 16. E. Tithymoloides. Pers. 1. c. Saftige Wolfsmilch. Im wärmer Amer. —. W. H. 3.
- 17. E. cyatophoza. Pers. l. ce 2. p. 12. Geigenblättrige Welfsmilch, Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. h.
- 18. E. nudiflora. Pers. I. c. Nacktblüthige Wolfsmilch. — . Jun. Jul. W. H. h.
- 19. E. mellifera. Pers. 1. c. Honigbringende Wolfsmilch. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. 15.
- 20. E. linariifolia. Pers. 1. c. Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. - . Aug. - Oct. Ch. 5.
- 21. E. picta, Pers. l. c. 2. p. 13. Bemahlte Wolfsmilch. Auf Venezuela. . W. H. 24.
- 22. E. spartioides. Jacy. hort. schoenbr. 4. p. 44. t. 486. Pfriemenartige Wolfsmilch. Am Cap-Jun. Jul. Ch. b.
- 23. E. Lathyris. Pers. l. c. 2. p. 15. Kreuzblättrige VVolssmilch. In Deutschl. Ital. Frankr. u. der Schweiz. Aug. Im F. d.
- 24. E. lasta. Pers. 1. c. Seidelbasthlättrige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. Ch. b. E. divaricata. Jacq. ic. rer. t. 87. Collect. rs p. 58.
- 25. E. nummulariasfolia. Willd. enum. 1. p. 503. Pfennigkrautblättrige Wolfsmilch. —. —. Ch. b.
- 26. R. dulcis. Lin. sp. pl. p. 656. Süsse Wolfsmilch. In Waldungen v. Oesterr. Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. O. E. purpurata. Pers. l. c. 2. p. 16.
- 27. E. portlandica. Pers. l. c. Englische-Welfsmilch. In England. Jun. Jul. K. H. b.

- volfsmilche In Deutschl. Niederland z. Südschweden, Jul. Aug. Im F. 24.
- Volfsmilch In Frankr. Span. u. Ital. Jun. Dec. K. H. t.
- 30. E. veneta. Willd. enum. 1. p. 507. Venetianische Wolfsmilch. Im Venetianischen am Meeresstrande. Jul. Aug. K. H. b.
 - 31. Eine noch unbeschriebene Art.

. 443. Visnea, Visnea.

2. V. Mocanera. Pers. 1. c. Canarische Visnea. Auf waldigen Bergen der Canarisch. Inseln. —. Ch. h.

DODECAGYNIA.

444. Sempervivum, Hauswurz.

- 2. S. urboreum. Pers. l. c. 2. p. 20. Baumartige Hauswurz. In Portugal, Candien, Corfu u. Zante. May, Jun. K. H. h.
 - B. foliis luteo marginatis. Mit gelbgeränderten Blättern.
- 2. S. canariense. Pers. 1. c. Canarische Haugwurz. Auf den Canarischen Inseln. May, Jun. R. H. h.
- wurz. Zu Madera. Febr. May. Ch. 3.
- 4. 5. globiferum. Pers. 1. c. Kugelknospige Hauswurz. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. u. Rufsland. Jun. Jul. Im. F. 24.

- 3. S. torinosum. Pers. 1. c. Gedrante Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. — K. H. h.
- 6. S. stellatum. Pers. l. c. Sternförmige Hauswurt. Auf dem Monte Baldo. Jan. Julak. H. O.
- 7. S. arachnoideum. Pers. l. c. Spinnenwebenartige Hauswurz. Auf Alpen in Tyrol, Ital. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jul. Aug. K. H. 4.
- 8. S. sediforme. Jacq. hort. vindob. 1. p. 35. t. 81. Mauerpsesserartige Hauswurz. In Sudeur. Jun. Jul. Im. F. 24. Sedum altissimum. Pers. l. c. 1. p. 512.
 - 9. S. monanthos. Pers. 1. c. Einblüthige Hauswurz. Auf den Canarischen Indeln. Jun. Jul. K. H. 24.

CLASSIS XII.

MONOGY NIA.

445. Cactus, Fackeldistel.

- 1. C. mamillaris. Pers. L. c. 2. p. 22. Warzentragende Fackeldistel. Auf Felsen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.
- 2. C. coronatus., Willd. enum. suppl. p. 30. Gekrönte Fackeldistel. Im warmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.
- 3. C. stellatus. Willd. 1. c. Gesternte Fackeldistel. Im wärmer: Amer. März, Jul. VV. H. b.
- 4. C. abnormis. Willd. l. c. p. 31. Abweichende Fackeldistel. Im warmer. Auter. W.H. h. C. monstrosus. Hort. paris.

- go Carpytharbous, Port. 1. o. Welzenfürmige Fackeldittek In Peru: Wi Hil Haril 34.
- 16.4C; selpontinus; Willed J. o. Schlängenförnlige Facketdistel, rom: re. all. H. . . .
- 7. C. speciosus. Willd. l. c. Schöne Fackel. distell Inn. Kalow. H. ht.
- 8. C. tetragonus, Pers. L. c. Viereckige Facheldistel., Zu Carassac, W. H. h.
- g. C. pentagonus. Pers. l. c. Fünfeckige' Fackeldistel. In Sürlange. — VV. H. t. . (10) C. hekulgonus. Pers. 11 c. Bechseckige! Fackeldistel. Zu Surinan. Jul. VV. H. t.
- Fackeldistel In Peru. . VV. H. b.
- 12. C. Popandus. Pers. I. c. Ausgeschweifte Fa.
- 143. C. riger: Hort. hyckensis. Schwarze Fackeldistel! In Südamer. W. H. 5
- 14. C. flavispinus. Hort. dyck. Gelbstachlige Fackeldistel, in Südamer. W. H. t.
- 15. C. Royent. Pers. l. c. 2. p. 23. Royensche Fackeldistel, Im warmer. Amer. —: W. H. 5. C. crenulatus. Hort. dyck.
- 16. C. eburneus, Hort. dyck. Elfanbeinstachlige Fackeldistel. In Curassac, - W. H. h.
- 17. C. multangularis. Willd. E. c. p. 38. Vieleckige Fackeldistel. . W.H. W.H. 17.
- 18. C. grandiflorus. Pers. 1. c. Großblumige Fackehlistel. In Jamaica u. Veracrux. Jun. Jul. VV. H. b.

ckeldistyl. In Südamer. W. H. ib.

190. C. Regelliformis. Pers. L. e. Peitschenförmige Facketklistel. Im wärmer. Amer. Jan. Jal. VV. H. b.

21. C. pendulus, Pers. I. c. Hängende Fackedistel. Zu Jamaica u. Hispaniola. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. 5. Rhipsalis Cassuta. Gaertn. de som: 1. p. 137. t. 28. f. 1.

22: C. paratiticus. Pers. I. c. Sohmarozende Fackeldistel. In Westind u. Südamer. - W. Hb.

- 23. C. triangularis. Pers. 1. c. Dreveckige Fackeldistel. In Brasilion, Jamaica u. Martinique. — W. H. b.
- okeldistel. In Westind n. Südamet. W.H.b.
- 25. C. brasiliensis. Willd I. c. Brasilianische
- lige Fackeldistel. In Sudamer. —. W. H. h.
- 27. C. Opuntia. Pers. l. c. Gemeine Fackel distel. In Peru, u. Virgin. jetzt auch in Südiyrol, der Südschweiz, Ital. Minorca, Spanien u. Portugall. May, Jun. K. H. b.

28. C. polyanthos. Decand. pl. succul. fasc. 24. n. 138. Vielblumige Fackeldistel. In Sudamer. — VV. H. b.

C. Opustia & polyanthes. Pers. l. c.,

29. C. setaceus. Hort. dyck. Borstige Fackoldistel, In Südamer. - W. H. 5.

30. C. Ficus indica. Pers. 1. c. Indische Fackeldistel. In wärmer. Amer. —. W., H. b.

- Fackeldistel. -. -. VV. H. b.
- 32. C. elongatus, Willd. 1. c. Verlängerte Fabkeldistel. . . VV. H. b.
- 33. C. Tuna. Pers 1. c. Breite Fackeldistel. Im wärmer. Amer. u. Jamaica. — . VV. H. b.
- stel. Auf der Insel St. Eustach. —. VV. Hi. b. C. Tuna & elatior. Pers. l. e4
 - 35. C. triacanthos, Willd. L. c. Dreystachlige Fackeldistel. In Westind. W. H. 5.
 - 36. C. inormis. Hort. dyck. Vehrlose Fa-
- 37. C. curassavicus. Pers. l. c. Curassavische Fackeldistel., In Curassao. — W. H. 5.
- 38. C. spinosissimus. Pers. I. c. Vielstachlige Fackeldistel. In Jamaica. W. H. 5.
- 36. C. foliosus. Willd. I. c. p. 35. Behlätterte Fackeldistel. — . W. H. 5.
- 40. C. pusillus. Hort. dyck. Kleine Fackel-distel. In Südamer. W. H. t.
- 41. C. alatus. Pers. 1. c. Geflügelte Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. h.
- 42. C. Phyllanthus. Pers. 1. c. Dünngliedrige Fackeldistel. In Brasilien u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. b.
- 43. C. Pereskia, Pers. l. c. Großblättrige Fackeldistel Imwärmer. Amer. W. H. h.
 - 44.) Eine noch unbeschriebene Art.

446. Philadelphus, Pfeifenstrauch.

1. Ph. coronarius. Pers. l. c. 2. p. 24. Wohl-riechender Pfeifenstrauch. In Südeur. May, Jan. Im F. 5.

β. nanus, Mit zwergartigesh Wuchse.

2. Ph. grandiflorus. Willd. enum. 1. p. 511. Groseblüthiger Pfeifenstruuth. In Noudamer. Jun. Im F. ty. Ph. inodorus. Hortulan.

447. Leptospermum, Sudseemyrthe.

- 1. L. scoparium. Pers. l. c. Besenartige Südscemyrthe. VVächst wie die folgenden in diestralien. — Ch. 5. L. squarrosum. Gaert. de sem. 1, p. 174. t. 85-
- 2. L. lanigerum. Pers. 1, c. Wollige Südseemyrthe. 1. Ch. 5.
- 3. L. pubescens.: Pers. l. c. Weichbehaarte Sudseemyrthe. Jul. Aug. Ch. h.
- 4. L. juniperinum. Pers. l. c. Wachholderblättrige Südseemyrthe. — Ch. 5.
- 5, L. ambiguum. Pers. l. c. Zweifelhafte Sudseemyrthe. — Ch. 5. Metrosideros corifolia. Vent. hort. malmais. p. 46. 1. 46.
 - 6. L.? rubricaule. Hort. paris. Rothstielige Südseemyrthe. -. Ch. t.

448. Fabricia, Fabricie.

1. F. lasvigata, Pers. l. a., 2. p. 25. Glatte Fabricie. In Neuholl. —. Ch. b.

449. Metrosideros, Eisenmass.

- 1. M. angustifolia. Pers. l. c. Schmalblättriges Eisenmaß, Am Cap. Jun. Jul. Ch., h.
- 2. M. laurifolia. Desiont. catalog, hort. paris. p. 171. In Neuholl. —. Ch. h.
- 3. M. marginata. Pers. I. c. Gerändertes Eisenmaß. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. b.
- 4. M. linearis. Pers. l. c. 2-p. 26. Linienblättriges Eisenmass. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. b.
 - 5. M. lanceolata, Pers. 1. c. Lanzenblättriges Eisenmaß. In Netholl, Jun. Jul. Ch. b. M. lophantha. Vent. hort. cels. p. 69. t. 69. citrina. Curt. bot. mag. t. 260.
- 6. M. saligna. Pers. 1. o. Weidenartiges Eisenmaß. In Neuholl. Ch. 5.
 - p. 145. Weichbaariges Eisenmaß. In Neuholl. —. Ch. h.
 - 8. M. myrtifalia. Hort paris: Myrthenblättriges Eisemhale. In Neuholi. Ch., b.
 - 9. M., rigida, Donn catalog. hert. cantabr. p. 145. Steifes Eisenmafs. In Neuholl. Ch. b.
 - 11110. Eine noch unbeschriebene Art.

and a track of a second

- 450. Melaleuea, Melaleuca.
- 1. M. squarrora. Pers. I. c. Sparrige Melaleuca. Ist sammt den folgenden in Neuholland zu Hause. — Ch. 5: M. myrtifolia. Vent. hogt malmais. p. et t. 47.

- 2. M. styphelioides. Pers. L. c. Styphelienarige Melaleuca. Ch. 5.
 M. obliqua. Hortulan.
- 3. M. ericaefolia. Pers. 1. c. Heidenartige Melaleuca. Jun. Jul. Ch. h. M. alba. Hortulan.
- 4. M. nodosa. Pers. l. c. Knotige Melaleuca.
- 5. M. thymifolia. Pers. 1. c. Quendelblättrige Melaleuca. -. Ch. b.
- 6. M. hypericifolia. Pers. l. c. 2 · p. 27. Jehanniskrautartige Melaleuca. — Ch. b.

551. Psidium, Gujavabaum.

- 1. Ps. pemiferum. Pers. 1. c. kepfeltragesder Gujavabaum. In beyden Ind. Jun. W. H. b.
- 2. Ps. guineense. Pers. l. c. Africanischer Gujavabaum. Auf der Prinzeninsel boy Guinea -. VV. H. 5.
- 3. Ps. montanum. Pers. 1. c. Berg-Gnjavabaum. Auf Bergen in Jamaica. — W. H. b.

452. Eugenia, Jambusenbaum.

- 1. E. Jambes. Pers. 1,1 c. Gemeiner Jambesenbaum. In Ostind. Jul. Aug. W. H. 5.
- 2. E. baruensis. Pers. T. c. Baruscher Jambusenbaum. Auf der Insel Baru bey Carthagens in Amer. Jul. Aug. W. H. 5.
- 3. E. balsamica. Jacq. fragm. bot. p. 41. s. 138. t. 45. f. 2. Balsamischer Jambusenbaum. In Jamaica. May, Jun. VV. H. b.

4. E. uniflera, Pett. 1, c. 2. p. 29. Einblüchiger Jambusenbaum. In Brasil. Apr. — Jun. VV. H. h.
Plinia pedunculata. Lin. suppl. 253.

453. Myrtus, Myrthe.

- ne Myrthe. In Südeur. Asien u. Africa. Jun. Aug. K. H. 5.
 - B. tarentina. Mit Bucheblättern.
 - 7. italica. scharfgespitzten Blättern waanfrochten Zweigen.
- . 3. bactica. Mit Pomeranzenblättern.
- 2. M. Pimenta. Pers. l. c. 2. p. 31. Pfefferatige Myrthe. In Westind. W. H. h.

454. Eucalyptus, Schönmütze.

- 1. E. resinifera. Pers. 1. c. 2. p. 32. Harzbringende Schönmütze. In Neaholl, wie alle folgende. — . Ch. h.
- 2. E. saligna. Pers. 1. c. Weidenblättrige Schinmitze Ch. 4.
- 3. E. oblique. Pers. 1. c. Schiefblättrige Schönmütze. — Ch. b.
- 4. E. glauca. Donn cat. hort. cantabr. p. 446. Grangrune Schönmütze. —. Ch. h.
- 5. E. hypericifolia. Hort. paris. Harthenblättrige Schönmütze: - . Ch. h.

455. Punica, Granate.

- 1. P. granatum. Pers. l. c. 2. p. 33. Gemeine Granate. In Sudeur, u. Persien. Jul. Aug. K. H. h.
 - 8. floribus plenis rabrise Mit rothgefüllten Blithen.
- floribus plems albis. Two Weingefüllten

. 456. Amygdalus, Mandel.

- 1. A. Persica. Pers. 1. c. Rersische Mandel. (Pfirschig). In Persien. Apr. Im F. b.
- 2. A. communis. Pers. 1. c. 2: p. 34. Gemeine Mandel. In Mauritanieh u. der Schweiz: Apr. Im F. 5.
 - B. amara. Mit bittern Früchten.
- 3. A. pumila. Willd. 1. p. 516. Niedrige Mandel. In Africa. Apr. Im F. 5.
- 4. A. hana. Pers. I. c. Zwerg Mandel. In Ungarn, Croatien, Sibirien u. der Tartarey. Apr. Im F. h
- 5. A. orientalis. Pers. L. c. Silberblättrige Mandel. Im Orient. May. Im F. 5. A. argentea. Lam. encycl. 1. p. 103.

457. Prunus, Pflaume,

- 1. Pr. Padus. Pers. 1. c. Vogel Planine. (Elexe). In Eur. Apr. Im F. b.
- 2. Pr. rubra. Willd, arb. berol: p. 250, Rethfrüchtige Pflaume. — May. Im F. h. P. Padus & rubra. Pers. 1. c.

- 3. Pr. virginiana. Popol. a. Visginiothe Pilaume. In Virgin. May, Jun. Im F. 5.
- 4. Pr. serotina. Pers. 1. c. Späthblühende Pflaume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.
- 25. Pr. canadensis. Pers. 1: c. Canadische Pilaume. In Nordamer. Apr. Im F. 7.
- 6. Pr. Iusitanica Pers. L. c. Portugisische Pflaume. In Portuge u. Pensylvan. Jun. Im F., b.,
- 7. Pr. caroliniana. Pers. 1. c. Carolinische Pflaume. In Südcarolina. Apr. May. K. H. h.
- 8. Pr. Lauro Cerasus Pers. 1 c. Lorbeerblattriga Pilaume. (Kirschlorbeer). Zu Trapezunt. May. K. H. h.
- 9. Pr. Mahaleb. Pera l. c. Mahaleb Pilaume. In Deutschl. u. der Schweiz. Apr. Im F. h.
- 10, Pr. Armeniaca. Lin. sp. pl. p. 679. Apricesen-Pflaume. (Apricose). Im Orient. Apr. 1m F. 5. Armeniaca vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 36.
 - 8. praecox. Mit kleinen gelben Früchten.
- 7. persicoides. Mit etwas zusammengedrückten großen Früchten.
- 11. Pr. dasycarpa. Ehrh. Beytr. 6. p. 90. Rauhe Pflaume. (Schwarze Apricose). Im Orient? Apr. Im F. h. Armeniaca sibirica & dasycarpa! Pers. l. c.
- 12. Pr. pumila. Pers. l. c. 2. p. 34. Zwerg. Pflaume. Ba Canada. May. Im F. 5.
- 13. Pr. Chamaecerasus, Pars I, c. Strauchartige Pflaume Auf Oesterr, Alpen, May, Im F. b.
- 14, Pr. Cerasus. Pers. l. c. Saure Phaumb. (Weichsel). In Eur. May. Im F. 5.

- 15. Pr. minn. Pers. l. c. t. p. 25. Sisse Plaume (Kirsche). Im nördlicher. Eur. Apr. May. Im F. b.
- 16. Pr. semperforens. Pers. 1. c. Immerblihende Pflaume. —. Bl. den ganzen Sommer hindarch. Im F. 3.
- 17. Pr. pensylvanica. Pers. 1. c. Pensylvanische Pfisume. In Nordamer. May. Jm F. 3.
 - 18. Pr. nigra. Pers. l. c. Schwarze Pflanme. In Nordamer. May. Im F. 3.
 - 19. Pr. domestica. Pers. L. c. Gemeine Pflaume. Auf Höhen in Eur. May, Jun. Im F. 5.
 - 20. Pr. cerasifera. Pers. I. c. Runde Pflamme. In Nordamer. May. Im F. b.
 - 21. Pr. insitiois. Pers. l. c. Krichen-Pflamme. In Deutschl. der Schweiz u. England. May, Jan. Im F. h.
 - 22. Pr. spinosa. Pers. 1. c. Schlehen-Pflaume. Auf sonnigen Hügeln in Eur. May, Jun. Im F. th.
 - 23. Eine noch unbeschriebene Art, mit ausgerandeten Kelchblättern.

DIGYNIA.

458. Waldsteinia, Waldsteinie.

1. W. geolder. Pers. 1. c. 2. p. 36. Geumartige Waldsteinte. In Ungarns schattigen Wälders. Apr. Im F. 24.

459. Sorbus, Eberesche.

- 1. S. aucuparia. Pers. 1. c. 2. p. 38. Gemeine Eberesche. (Vogelbeere). In kalten Gegenden v. Eur. Jun. Jul. Im F. 1).
 - s. S. hybrida Pers. 1. c. Bastard Eberesche. In Gothland u. Thüringen. Jun. Im F. b.
- 3. S. domestica. Pers. I. c. 2. p. 39. Zahme Eberesche. (Speyerling), Im warmer. Eur. Jan-Im F. 5.

PENTAGYNIA.

460. Mespilus, Mispel.

- In Waldern cv. Eur. July Em. F. b.
- pel. In Japan. Nov. Ck. b.:
- 3. M. Prrecantha. Lin. sp. pl. p. 685. Immergrune Mispel. In Südfrankr. u. Italien. Jun. Im F. 5.
 Crataegus pyracantha. Pers. 4. c. 2. p. 37.
- 4. M. Cotoneaster. Pers. 1. c. Quittan-Mispel. Auf sonnigen Berghügeln im kälter. Eur. May, Jun. Im F.
- 5. M. Chamae Mespilus. Lin. I. c. Niedzige Mispel. Auf Alpen in Oesterr. u. den Pyrsnäen. Jun. Im F. 5. Aronia Chamae - Mespilus. Pers. l. c. 2. p. 39.

- 6. M. Crus, galli: Willd :ensm. 1. p. 522. Glänzende Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im Crataeg. Crus galli. Pers. l. c. 2, p. 37.
- 7. M. coccinera. Willd. l. c. 1. p. 523. Scharlachnothe Mispel. In Virgin, Pensylvan u. Canada. Apr. May. Im F. 5 Crataeg. coccinea. Pers. I. c. 2. p. 36.
- 8. M. cordata. Willd. L. c. Ahornblattrige Mispel. In Nordamer. May, Jun. Int F. 5. Crataeg. cordata. Pers. l. c.
- 9. M. pyrifeliat Willdy L. c. Birnenblättrige Mispel. In Nordamer. May. Im F. b. Crataeg. pyrifolia. Pers. 1. c.
- 10. M. glandulosa. Willd. l.c. Drüsige Mispel. In Nordanier: Jun. Im With the Crataeg. glandulosa. Pers. 4. c. 2. p. 37.
- 11. 11. M. punctata: Willd. "line, 15 p. 524. Punktirte Mispel. In Worthmer. Jun. In F. 1.7 Crataegus punctata. Pers. l. c. cuncifolia. Elirh. Beytr. 3. p. 21.
- 12. M. nigra. Willd. l. c. Schwarze Mispel. In Ungarn. Just. Im F. b. Crataegus nigra. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. m p. 62. 4. 62. 3934 (1975) 3744 N
- 13. M. Oxyacantha. Willd. I. c. Welfsdorn. Mispel Auf trockenen Hügeln in Eur. Jun. Jul. 1 Im F. 4. , 13. (4 Crataeg. Ozyacantha. Pers. J. c. 2. p. 38.

Mispel. An Hecken in Eur. Jun. Jul. Im F. S. Crataeg. monogyna. Pers. l. c.

6. floribus rubris. Mit rothen Bluthen.

7. Blathen. — plenis. Mit rothgefüllten

15. M. Azarolus. Willd. I. c. 1, p. 525.
Azarol-Mispel In Krain, bey Florenz, u. Montpellier. May. Im F. 5.
Crataeg. Azarolus. Pers. L. c.

16. M. pentagynat Willd: 4: cal Fünfsamige Mispel. In der Syrmier Gespannschaftnin Sclavenien u. im Banat. Jun. Im F. 5: 1 1 Crataeg. pentagyna. Pers. 1. c.

tar is all the

461. Pyrus, Birne.

- 1. P. arbutifolia. Lin. suppl. \$56. Sandbeer-blättrige Birde. In Virgin. Jun. Im F. Aronia arbutifolia. Pers. 1. 6. 2. p. 36. 181. Mespilus arbutifolia. Lin. sp. pl. p. 685.3 181.
- 2. P. Both apium. Lin. suppl. 255. Traubon-Birne. In Virgin. u. Canada. Jun. Im F. h. Aronia Botryapium. Pers. l. c. Mespil. canadensis. Lin. sp. pl. l. c.
- g. P. Amelanchier. Lin. suppl. 255. Felsen-Birne. Auf Felsen in Oestern Deutschl. u. Frankt. May, Jun. Im F. 5. Aronia rotundifolia. Pers. 1. c. Mespil. Amelanchier. Lin. sp. pl. 1. c.
- 4. P. communis. Pers. I. c. 2. p. 40. Gemeine Birne. In Eur. Jun. Im F. 5.
- 5. P. Pollveria, Pers. 1. c. Hanbutten Birne. In Deutschl. Jun. Im F. 5.

- 6. R. salicifoka. Pers. 1. c. Weidenblättrige Birne. In Sibirien u. Armenien. Jun. Im F. 5.
- 7. P. nivalis, Pers. 1. c. Schnee-Birne. Auf Oesterreichischen Alpen. Apr. May. Im F. 5.
- g. P. Malus. Pers. 1. c. Aepfel Birne. (Apfel). In Eur. Jun. Im F. t.
- o. P. spectabilis. Pers. l. c. Prächtige Birne. In China. Jun. Im F. f.
- 10. P. prunifolia. Pers. l. c. Pflaumenblättrige Birne. In Sibirien. Jun. Im F. 5.
 - 11. P. coronaria. Pers. 1. c. Wohlriechende Birne. In Virgin. Jun. Im F. 5.
 - 12. P. angustifolia. Pers. 1. c. Schmalblättige Birne. In Nordames, —, Im F. 5. P. sempervirens. Hortulan.
 - 13. P. alpina. Willd. enum. 1. p. 527. Alpen-Birne. —. Jun. In F. b. Crataeg. alpina. Hortulan.
 - 14. P. Aria. Ehrh. Beitr. 4. p. so. Mehl-Birne In Europ. Wäldern. Jun. Im F. 5. Sorbus Aria. Pers. 1. c. s. p. 38. Crataeg. Aria. Lin. sp. pl. p. 681.
 - 15. P. intermedia. Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Oxel Birne. In Schweden u. Russland. Jun. Im F. h. Sorbus intermedia. Pers. l. c. Crataeg. Aria & suecica. Lin. sp. pl. p. 681.
 - 16. P. torminalis. Ehth. Beitr. 6. p. 92. Elzbeer Birne. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. u. im Orient in Wäldern. Jun. Im F. h. Sorthe torminalis. Pers. 1. c. Crataeg. Lin. 1. c.

462. Cydonia, Quitte.

2. C. vulgaris. Willd. enum. 1. p. 538. Gemeine Quitte. In Deutschl. an steinigen Ufern. Jun. Im F. h.
Cydonia Cydonia. Pers. l. c.
Pyrus Cydonia. Lin. l. c. p. 687.

463. Tetragonia, Vierecksfrucht.

- 1. T. fruticasa. Pers. I. c. 2. p. 41. Strauckartige Vierecksfrucht. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 3.
- 2. T. desuinbens. Pers. l. c. Liegende Vierecksfrucht. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 3. T. capanso. Pers. I. c. Ausgebreitete Vierecksfrucht. In Neusweland n. Japan. Jal. Aug. Im F. O.

464. Mesembrianthemum, Zaserblume. (Mittagsblume).

- 1. M. fissem. Haworth dissert. Messembrianth, ed. 2. n. 11. Spaliblättrige Zaserblame. Wächst, wie alle folgende, bey denen das Vaterland nicht ahgegeben ist, am Cap. —. Ch 24.
- 2. M. scalpratum. Haw. l. c., n. 34. Messer-formige Zuserblume. Jul. Oct. Ch. 4.
 M. linguiforme a scalpratum. Pers. l. c.
 M. linguiforme Lin. sp. pl. p. 699.
- 3. M. linguiforme. Haw. 1. c. n. 38. Zungenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4. M. obliquum, Pers. 1. 6.
- 4. M. latim, Pers. I. c. Breitblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4.

- Zaserblume: Jun; Aug. Ch. h.
- 33. M. noctifforum, Peri. I. c. Nächtliebe Zaserblume, Jun. Aug. Ch. b.
- 34. M. umballatum. Pers. 1. c. Doldentragende Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. 5.
- 35. M. tuberosum, Pers. I. c. Kuellige Zeserblume. Jun. Sept. Ch. t.
- 36. M. bicolorum. Pers. I. c. Zweyfarbige Zaserblume, Jun. Sept. Ch., h.
- 37. M. tenuifollum. Pers. 1. c. Dunnblättrige Zauerhlume. Jan. (Sept. Ch. 5.
- 38. M. aduneum. Haw. I. c. n. 177. Krummblättrige Zeierbinnie. Junia Sepa. Ch. h.
- 39. M. fillcaule. Haw. I. c. p. 176. Fadenstielige Zaserblume. -. Ch. b.
- 40. M. stipulaceum. Pers. l. c. Steifstielige Zaserblume. - Ch. b.
- 41. M. corniculatum. Pers. l. c. Hornformige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. b.
- 42. M. loreum. Pers. L. c. 2. p. 44. Riemenartige Zaserblume. Jun. Sept. Ch. 4.
- 43. M. veruculatum. Pers. I. c. Bogigblättzige Zaserblume. May — Jul. Ch. b.
- 44. M. eraceum Jacq. fragm. bot. p. 17.1: 11. f. 2. Safranfarbige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5. M. insititium. Willd. enum. 1. p. 536.

- 45. M. echinatum. Pers. 1. o. Weichstachlige Zaserblume. Jun. Sept. Ch. 5.
 - 8. floribus luteis, Mit gelben Blüthen.
- 46. M. viridiflorum. Pers. l. c. Grünblüthige Zaserblume. Jun. - Aug. Ch. b.
- 47. M. spinuliferum. Haw. l. c. n. 97. Stasheltragende Zaserblume. Jnn. — Aug. Ch. t.
- 48. M. splendens. Pers. l. c. Glänzende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
- 49. M. villosum. Pers. l. c. Zottige Zasef-blume. Jun. -- Aug. Ch. h.
- 50. M. micans. Pers. 1. c. Schimmernde Zaserblume May Aug. Ch. b.
- 51. M. speciosum. Haw. l. c. n. 199. Prächtige Zaserblume. —. Ch. h.
- 52. M. pulveralentum. Haw.l. c. n. 201. Bestäubte Zaserblame. . Ch. h.
- 53. M. Haworthi, Donn. cat. horti. cantabr. p. 66. Haworthische Zaserblume. —. Ch. b.
- 54. M. tricolorum. Haw. l. c. n. 53. Dreyfarbige Zaserblume. Jun. Jul. Ch. h. M. stramineum. Willd. enum. 1. p. 533.
- 55. M. grossum. Pers. 1. c. Dickstielige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. p.
- 56. M. brachiatum. Pers. 1. c. Weitästige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. 5.
- 57. M. brevifolium. Pers. I. c. Kurzblättrige Zaserblume. . Ch. b.

- 58. M. erigeristorum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 39. t. 477. Berufungskrautartige Zaserblume. Jur. - Aug. Ch. h.
- 8. floribus pallidioribus. Mit blafsrothen Blüthen.
- 59. M. hispidum. Pers. I. c. Borstige Zaser-blume. Jun. Oct. Ch. t.
- 60. M. striatum. Haw. I. c. m. 89. Gestreifte Zaserblume. — Ch. h.
- 61. M. barbatum. Pers. I. c. Bartige Zaser-blume. Jun. Aug. Ch. 1.
- 62. M. hirsutum. Haw. l. c. n. 93.Rauhe Zaserblume. Jun. — [Aug. Ch. ‡. M. barbatum & hirsutum. Pers. l. c. M. stellatum. Decand. pl. succ. fasc. 5.
- 63. M. densum, Haw. l. c. n. 94. Dichte Zaserblume. Jun. Aug. Ch. h. M. barbatum 7 densum! Pers. l. c.
- 64. M. falcatum. Pers. l. c. Sichelblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 65. M. glomeratum. Pers. l. c. Knaulblättrige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ty.
- 66. M. roseum Willd. ennm. 1. p. 535. Rosenrothe Zaserblume. Jun. Aug. Ch. 5.
- 67. M. carneum. Haw. Mesembr. ed. 1, n. 55.
 Fleischfarbige Zaserblume. Ch. t.
- 68. M. pulchellum. Haw.diss. ed. 2. n. 138. Hübsche Zaserblume. — . Ch. 5.
- 69. M. reptans. Pers. 1. c. Kriechende Zaser-blume, Jul. Aug. Ch., b.

- 70. M. elegans. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 15. t. 436. Schöne Zaserblume, Jun. Aug. Ch. h.
- 71. M. australe. Pers. 1. c. Südliche Zaserblume. — . Ch. h.
- 72. M. lazum. Willd. enum. 1. p. 536. Schlaffe Zaserblume. —. Ch. 5.
- 73. M. spinosum. Pers. l. c. s. p. 45. Stachlige Zaserblume. Jun. Aug. Ch. 5.
- 74, M. crassifoldum. Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. t.
- 75. M. heteropetalum. Haw. l. c. n. 123. Verschiedenblumenblättrige Zaserblume. . Ch. 5.
- 76. M. molle. Pers. 1. c. Weiche Zaserblume. Jun. Jul. Ch. 5.
- sche Zaserblume. Jun. Aug. Ch. p.
 M. Aduncum. Jabq. fragm. bot. p. 43. n. 148. t.
 51. f. 2.
- 78. M. glausum. Pers. l. c. Grangrune Za-serblume. Jun. Aug. Ch. 5.
- 70. M. spectabile. Pers. I. c. Ansehnliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 80. M. emarginatum. Pers. l. c. Ausgerandete Zaserblume. Jun. Aug. Ch. h.
- .81. M. virgatum. Haw. l. c. n. 180. Ruthenformige Zaserblume. — Ch. 5.
- 82. M. aureum. Pera. 1. c. Goldfarbige Za-.. serblume. Jun. Aug. Ch., h.
- 83. M. agrantium. Haw. le of n. 189. Otangenfarbige Zaserblume. — Ch. 5.

- 84. M. scabrum. Pers. l. c. Scharfblättrige-Zaserblume. Jun. - Aug. Ch. h.
- 85. M. bracteatum. Pers. 1. c. Dickhlättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. b.
- 86. M. uncinatum, Pers. l. c. Hackenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 87. M. perfoliatum. Haw. I. c. n. 187. Durchwachsene Zaserblume. Jun. Aug. Ch. 54. M. uncinatum β perfoliat. Pers. 1. c.
- 88. M. capitatum. Haw. I. c. v. 56. Kopfförmige Zaserblume. Jun. Aug. Ch. b.
 M. pugioniforme. Pers. I. c.
- 89. M. pugioniforme. Haw. l. c. n. 57. Dolchformige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
- 90. M. viride. Haw. l. c. n. 189. Grüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.
 - β. folis dentatis. Mit gezähnten Blättern.
- 91. M. tenellum. Haw. 1. c. n. 190. Zarte Zaserblume. Ch. h.
- 92. M. aequilaterale. Pers. & c. Gleichseitige Zaserblume. -. Ch. 3.
- 93. M. filamentosum. Pers. l. c. Fädige Zaserblume. -. Ch. h.
- 94. M. acinaciforme. Pers. I. c. Säbelförmige Zaserblume. -. Ch. 5.
- 95. M. lacerum. Haw. l. c. n. 122. Zerrissenhlättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h. M. gladiatum. Jaeq. hort. schoenbr. 4. p. 19. t. 438.

96. M. rubricaule. Haw. l. c. n. 152. Rothstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5.

β. foliis. angustioribus. Mit schmäleren Blättern.

97. M. maximum. Haw. l. c. n. 121. Größ-

98. M. forficatum. Pers. 1. c. Scheerenförmige Zaserblume. —. Ch. b.

99. M. edule, Pers. l. c. Geniessbare Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

100. M. subalatum. Haw. l. c. n. 148. Fliegelstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. h.

101. M. laevigatum. Haw. l. c. n. 147. Glatte Zaserblume. - . Ch. h.

102. M. includens. Andrews bot. reposit. t. 388. Offenblüthige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. b.

103. M. mutabile. Haw. I. c. n. 142. Veränderliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 5. M. tricolor. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 20. t. 40.

104. M. lunatum. Willd. enum. 1. p. 538. Mondblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. b.

105. M. deltoides. Pers. l. c. Deltablättrige Zaserblume. May — Sept. Ch. t.

106. M. caulescens. Haw. l. c. n. 121. Hohe Zaserblume. — . Ch. t. . M. deltoides & caulescens. Pers. l. c.

107.)
108.) Noch unbeschriebene Arten.
109.)

465. Spiraea, Spierstaude.

- 1. Sp. laevigata. Pers. 1. c. 2. p. 46. Glatte Spierstande. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. p.
- 2. Sp. salicifolla. Pers. 1. c. Weidenblättrige Spierstaude. In Oesterr. Böhmen, Sibir. u. Nordamer. an Bächen. Jun. Im F. h.
- 3. Sp. hypericifolia. Pers. 1. c. Hartheublättrige Spierstaude. In Canada u. Pensylvanien. Jun. Im F. h.
- 4. Sp. chamaedrifolia. Pers. 1. o. Gamander. blättrige Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun.-Im F. 3.
- 5. Sp. ulmifolia. Pers. 1. c. Rüsterblättrige Spierstande. In Krain. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. b. Sp. chamaedrifolia. Jacq. hort. vind. 2. p. 66. t. 140.
- 6. Sp. crenata. Pers. l. c. Gekerbte Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jan. Im F. 3.
- 7. Sp. obovata. VValdst. et Kitaib. mscrpt. Verkehrteyförmige Spierstaude. In Ungarn. Jun. Im F. h.
- 8. Sp. triloba. Pers 1. c. Dreylappige Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. b.
- 9. Sp. opulifolia. Pers. l. c. Schneeballblättrige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Im F. b.
- 10. Sp. sorbifolia. Pers. 1. c. Ehereschenblättrige Spierstaude. In Sümpfen v. Sihirien u. Kamtschatka, Jun. Jul. Im F. b.

- 11. Sp. Aruncus: Pers. l. c. Geissbart Spierstaude. In Oesterr. Deutschl. u. den Pyrenäen, Jun. Im F. 24.
- 12. Sp. Pilipendula, Pers. I. c. Knollige Spierstaude. Auf Wiesen in Eur. Jun. Im F. 4.
- 13. Sp. Ulmaria. Pers. 1. c. 2. p. 47. Sumpf. Spierstaude. Auf feuchten Wiesen in Eur. May Jul. Im F. 24.
- 14. Sp. lobata. Pers. l. c. Lappige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Jul. 1m F. 24.
- 15. Sp. trifbliata. Pers. 1. c. Dreyblättrige Spierstaude. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 21.

POLYGYNIA.

466. Rosa, Rose.

- 1. R. lutea. Ait. hort. kew. 2. p. 200. Gebbe Rose. In Deutschl. u. Engl. May, Jun. Im F. h. R. eglanteria. Pers. l. c.
 - p. 1. Mit zweyfarbigen Blüthen.

 punicea, Pers. I. co.
- Rose. Im Orient. May, Jun. Im F. ...
- 3. R. blands. Pers. J. c. Hudsonshay-Rose. An der Hudsonsbay. May, Jun. Im. F. h.
- 4. R. cinnamomea. Pers. 1. c. Zimmt-Rose. In Sudeur. May. Im F. 5.
- 5. R. kamtschatica. Pers. 1. c. Kamtschat.ka'sche Rose. Zu Kamtschatka. May, Jun. Im F. h.

- 6. R. pimpinellifolia. Pers. l. c. Pimpinellenblättrige Rose. In Südeur. May Jul. Im F. h.
- 7. R. spinosissima. Pers. l. c. 2. p. 48. Vielstachlige Rose. Auf Hügeln in Deutschl. n. der Schweiz. May, Jun. Im F. h.
- 8. R. ferox. Biberst. cent. pl. rar. Tanr. et Cauc. p. et t. 37. Langstachlige Rose. Am Tanrus u. Cancasus. Jul. Im F. h.
- 9. R. lucida. Pers. 1. c. Glänzende Rose. In-Nordamer. May, Jun. Im F. 15.
- 10. R. carolina. Pers. 1. c. Carolinische Rose. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ty.
- ti. R. villota. Pers. l. c. Weichhaarige Rose. In Eur. Jun. Im F. t.
- 12. R. provincialis. Pers. l. c. Provencer Rose. In Böhmen, Ital. Span. n. Frankr. May, Jun. Im F. t.
- 13. R. centifolia. Pers. l. c. Garten. Rose. —. May, Jun. Im F. h.
- 214. R. gallica. Pers. 1. c. Zucker-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. 5.
- 15. R. alba. Peis. l. c. e. p. 49. Weiße Rose. In Südenr. May, Jun. Jm F. 5.
- 16. R. pumila. Pers. 1. c. Niedrige Rose. In Oesterr. u. Ital. Jun. Im F. 5.
- 17. R. turbinata. Pers. 1. c. Kreiselförmige Rose. In Eur. May, Jun. Im F. 5.

- 18. R. rubiginosa. Pers. l. c. Wein-Rose. Auf sonnigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. h.
- 19. R. muscosa. Pers. I. c. Moos-Rose. Jun. 1m F. h.
- 20. R. maschatz. Pers. l. c. Bisam Rose. In der Barbarey, Aug. Sept. K. H. h.
 - β. caule altiore. Mit höherem Wuchse.
- 21. R. rubrifelia. Pers. l. c. Rothblättrige Rose. In Oesteur. der Schweiz u. Dauphine auf Bergen. Jun. Im F. h.
- 22. R. alpina. Pers. 1. c. Alpen-Rose. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 5.
- 23. R. pendulina. Pers. I. c. Hängende Rose. In Eur. May. Im F. h.
- 24. R. pyrenaica. Pers. l. c. Pyrenaische Rose, Auf den Pyrenaischen, den Schweizer u. Schlesteralpen. May. Im F. t.
- 25. R. multiflora. Pers. l. c. 2. p. 50. Vielblüthige Rose. In Japan. May, Jun. Ch. b.
- 26. R. canina. Pers. l. c. Hecken-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. b.
- Rriechende Rose. In Oesterr. Ungara, Sclavon.
 u. Krain. May, Jun. Im F. h.
 R. arvensis. Pers. l. c. 2. p. 47.
- Rose. Auf Hügeln in Oesterr. May, Jun. Im F. h.
- 129. R. parvifolia. Pers. 1. o. Burgunden. Rase, In Eur. May, Jun. Im F. 5.

30. R. semperflorens. Curt. bot. mag. t. 284. Immerblühende Rose. In China. Blüht das ganze Jahr hindurch. Ch. t.

R. bengalensis. Pers. l. c.

sinica. Lin. syst. veg. 394.

B. punicea. Willd. enum. 1. p. 547. Mit duakelrother Blüthe.

- chinensis Pers. l. c.

- y. pallida. Willd. l. c. Mit blassrother Blüthe.
- 31. R. bracteata: Pers. l. c. Deckblättrige Rose. In China. Jul. Aug. Ch. 5.

467. Rubus, Himbeere,

- 1. R. rosaefolius. Pers. l. c. Rosenblättrige Himbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. b.
- 2. R. Idaeus. Pers. l. c. 2. p. 51. Gemeine Himbeere: Auf steinigen Hügeln in Eur. May. Im F. t.
- 3: R. occidentalis. Pers. l. c. Schwarze Himbeere. In Canada. May. Im F. 5.
- 4. R. vaesius. Pers: 1. c. Kriechende Himbeere. An Hecken in Eur. May. Im F. b.
- 5! M. fruticosus. Pers. 1. 6! Strauchartige Minbeere. In Eur. May. Im F. 5.
 - B. fructibus albis. Mit weißen Früchten.
 - y. floribus plenis albis. Mit weissgefühlten Blüthen.
- 6. R. laciniatus. Willd. hort. berol. 2. p. 82. Se Schlitzblättrige Himbeden May. Im F, t. .
 - 7. R. canadensis. Pers. 1. C. Canadische Himbeere. In Canada, May. Im F. b.

3. R. odoratus. Pers. 1. c. 2. p. 52. Wohlriechende Himbeere. In Canada Jun. Jul. Im F. 5.

468. Fragaria, Erdbeere.

- beere. In Europ. Waldern. Apr. May. In F. 2.
- Auf dürren Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz, Apr., May. Im F. 4.
- 1. 3. Fr. elatior. Pers. I. c. Garten Erdbeere-In Amer.? Apr. May. Im F. 24.
 - 4. Fr. graodiflora. Ananas-Erdbeere. Zu Surinam. Apr. May. Int F. 44.
 - sin 51 Fr. akiloensis. Pers. l. c. Chilische Erdbeere. In Sudamer, Apr. May. Im F. 24.

469, Potentilla, Fingerkraut.

- g. P. fruticosa. Pers. l. c. Strauchartiges Fingerkraut. In Engl. u. Sibir. Jun. Im F. 5.
- 2, P. bifurca. Pers. l. c. 2. p. 54: Spaltelblättriges Fingerkraut. In Sibir. u. Armenien. May, Jun. Im F. 24.
- 3. P. pensylvanica. Pers. l. c. Pensylvanisehes Fingerkraut. In Csnada u. Sibir. Jun. Aug. Im F. 24.
- 4. P. recta. Pers. 1. c. Gerades Fingerkraut. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. 24.
- 5: P. argentea: Pers. 1. c. Silberblättriges Fingerkraut. In Eur. May. — Jul. Im F. 24.

- 6. P. opaca. Pers. l. c. Dunkelblät triges Fingerkraut. In Oesterr, Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 4.
- 7. P. aurea. Pers. 1. c. 2. p. 55. Goldfarbiges Fingerkraut. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dänemark. May, Jun. Im F. 24.
- 8. P. alba. Pers. I. c. Weisses Fingerkraut. Auf Bergen in Oesterr. Steyermark: Ungarn u. Deutschl. May, Jun. Im Fr 4.
- g. P. clusiana. Pers. l. c. Clusisches Fingerkraut. Auf Oesterreichischen Alpen: Jun. — Aug. Im F. 2.

470. Tormentilla, Tormentill.

1. T. erecta. Pers. l. c, 2. p. 56. Aufrechte Tormentille. In Eur. May, Jun. Int F. 4.

471. Geum, Geum.

- 1. G. virginianum. Pers. l. c. Weilses Genna. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. G. urbanum. Pers. l. c. 2. p. 57. Gemel. nes Geum. In Eur. May, Jun. Im F. 4.
- 3. G. rivale. Pers. l. c. Wasser-Geum. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. G. montanum. Pers. l. c. Berg-Goum. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien a. Dauphine. Jun. Jul. Im F. 4.

472. Dryas, Dryade.

1. Dr. octopetala. Pers. 1. c. Alpen Divade. Auf den Europ. Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

473. Calycanthus, Kelchbiume.

- i. C. Aoridus. Pers. 1, c. 2. p. 58. Carolinische Kelchblume. In Carol. Jun. Jul. K. H. b.
- 2. C. laevigatus. Willd. hort. berol. 1. p. 80. t. 80. Virginische Kelchblume. Auf hohen Bergen in Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. 5. C. ferax. Pers. l. c.
- 3. C. práctow. Pers. l. c. Japanische Kelchblume. In Japan. Jän. Febr. Ch. p.

CLASSIS. XIII.

r suitable

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

474. Capparis, Capper.

- a. C. spinosa. Pera l. c. z. p. gg. Gemeine Capper. In Südeur. im Orient u. Africa. Jun. Jul. K. H. b.
- 2. C. mariana, Pers. l.: c. 2. p. 60. Marianische Capper. Auf den Marianischen Inseln. —. W. H. h.
- 3. C. frendosa. Pers. 1. c. Buschige Capper. In Wäldern zu Carthagena u. St. Domingo. Jas. Febr. W. H. h.
- 4. C. odoratissima. Pers. l. c. Woalriechen-
- 5. C. Cynophallophora. Pers. 1. c. Langschotzige Capper. Im warmer. Amer. W. H. h.

- 3. N. Letus. Pers. 1. c. Aegyptische Seerose. In Wässern v. Ostind. u. Aegypt. dann in warmen Bädern Ungarns. Iun. — Aug. K. H. 24.
- 4. N. coerulea. Pers. 1. c. Blaublühende Secrose. In Wässern v. Aegypten. Jun. Aug. K. H. 24.

481. Bixa, Orleanbaum.

1. B. Orellana. Pers. 1. c. Gemeiner Orleanbaum. Im wärmer, Amer. am Grähen u. Quellen-Jan. Jul. VV. H. h.

482. Sparmannia, Sparmannie.

1. Sp. africana. Pers. l. c. 2. p. 64. Africanische Sparmannie. In Wäldern am Cap. May, Jun. Ch. t.

483. Grewia, Grewie.

1. Gr. occidentalis. Pers. l. c. 2. p. 65. Abendländische Grewie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Chr. 24.

484. Tilia, Linde.

- 1. T. ouropaea. Lin. sp. pl. p. 733. Großblättrige Linde. In Böhmen u. Krain. May, Jun. Im F. t.

 T. europ. β grandifolia. Pers. l. c. s. p. 66.
- 2. T. microphylla. Willd. enum. 1. p. 565. Kleinblättrige Linde. In Wäldern v. Eur. May, Jun. Im P. 5.
 T. europea. Pers. 1. 0.

- 3. T. argentea. Decand. cat. horti bot. mons pel. p. 150. Silberblättrige Lindé. In Ungarn u. im Orient. Jun. Im F. p. T. alba. Pers. 1. c.
- 4. T. alba. Ait. hort. kew. 2. p. 230. Weilse Linde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.
 - 5. T. americana, Pers. 1. c. Schwarze Linds. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. th.
 - 6. T. pubescens. Pers. 1. c. Feinbehaarte Linde. In Carolina. Im F. b.

485. Corchorus, Sattkraut.

- 1. C. olitorius. Pers. I. c. 2. p. 67. Gemüse-Sattkraut. In Asien, Africa u. Amer. Jun. K. H. O.
- 2. C. japonicus. Pers. 1. c. Japanisches Sattbraut. In Japan. März - Jul. Ch. 5.
- 3. C. siliquosus. Pers. 1. c. Schottiges Sattkrant. In Südamer. Apr. VV. H. 5.

486. Clusia, Clusie.

- 1. Cl. alba. Pers. l. c. 2. p. 68. Weisse Clusie. Auf Martinique, —. W. H. 5.
- 2. Cl. flava. Pers. 1. c. Gelbe Clusie. Zu Jamaica. . W. H. h.

487. Mentzelia, Mentzelie.

M. hispida, Pers. 1. c. 2. p. 71. Rauhe Mentzelic, In Mexico, Jup. Jul. W. H. 24.

488. Lagerstroemia, Lagerstromie.

1. L. indica. Pers. 1. c. Chinesische Lageratrömie. In China, Cochinchina u. Japan. Jun. Jul. Ch. 5.

489. Trilix, Trilix.

1. Tr. lutes. Pers. l. c. 2. p. 72. Gelhe Tri-Tix. Zu Carthagena in Amer. May. Jun. W. H. h.

490. Ludia, Aenderling.

1. L. sessiliflora. Pers. l. c. Stiellosblüthiger Aenderling. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. VV. H. 5. L. tuberculata. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 59t. 114.

491. Thea, Thee,

- Thee. In China u. Japan. -. Ch. b.
- 2. Th. viridis. Pers. L. c. Grimer Thee. In China. Ch. 4.
 - 492. Ternstroemia, Ternströmie.
- 1. T. meridionalis. Pers. l. c. Mittägige Ternströmie. In Südamer. W. H. b.

493. Citrus, Citrone.

1. e. medichi. Pers. I. c. Saure Citrone. (Limonie). Im Orient, Jun. Jul. K. H. 5.

- 2. C. Aurantium. Pers. 1. c. 2. p. 74. Susse Citrone. (Pomeranze). In Ostind. Jun. Jul. K. H. b.
- 3. C. decumana. Pers. 1. c. Pompelmus Citrone. In Ostind. Jun. Jul. K. H. 17.
- 4. C. trifoliata. Pers. l. c. Dreyblättrige Citrone. In Ostind. —. W. H. b.
- 5. C. Hystrix. Decand cat. horti bot monspel. p. 97. Vieldornige Citrone. Auf der St. Meritzinsel. —. W. H. h.

494. Cistus, Cistenrose.

- 1. C. villosus. Pers. l. c. Rauhe Cistentose. In Ital. Span. u. Nordafrica, Jan. Jul. K. H. b.
- 3. C. laurifolius. Pers. 1. c. Lotheerblättrige Cistenrose. In Span. Jun. Jul. K. H. h.
- 3. C. vaginatus. Pers. 1, c. 2. p. 75. Scheidentragende Cistentose. Auf Teneriffa. Jun. Jul. K. H. 5.
- 4. C. ladaniferus. Pers. 1. c. Ladanumgebende Cistenrose. Auf Hügeln in Span. u. Portug. May, Jun. K. H. †.
- 5. C. monspeliensis. Pers. l. c. Französische Cistenrose. Zu Montpellier u. Dauphine. Jul. K. H. b.
- 6. C. salvifolius. Pers. 1. c. Salveyblättrige Cistenrose. In Krain, der Schweiz, Ital. Südfrankr. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. t.
- 7. C. incanus. Pers. 1. c. Bestäuhte Cistenrosse. In Narbonne u. Span. May, Jun. K. H. b.

- 2. C. creticus. Pers. l. c. Candische Cistenre-2e. In Candien u. Sirien. Jun. R. H. h.
- 9. C. purpureus. Pers. l. c. Purpurfarbige Cistenrose. May, Jun. K. H. t.
- 11. C. crispus. Pers. 1. c. Krause Cistenrose. Zu Portug. Aug. K. H. h.

495. Helianthemum, Sonnenröschen.

- 1. H. laevipes. Pers. l. c. 2. p. 76. Glattstieliges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. K. H. b.
- 2. H. Fumana. Pers. 1. c. Dünnes Sonnenröschen. In Oesterreich, der Schweiz, Frankr. v. Gothland auf trockenen Hügeln. Jun. Jul. K. H. 5.
- 3, H. marifolium. Pers. l. c. Marumblättriges Sonnenröschen. Auf Meeresfelsen zn Massilien, Verona u. in Span. Jun. K. H. 5.
- 4. H. ledifolium. Pers. l. c. 2. p. 77. Porstblättriges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun Jul. Im F. .
- 5.'H. angustifolium. Pers. 1. c., 2. p. 79. Schmalblättriges Sonneuroschen. . Jun. Jul. K. H. b.
- 6. H. vulgare. Pers. 1. c. Gemeines Sonnenröschen. Auf trockenen Trieften in Eur. May, Jun. Im F. b.
- 7. H. mutabice. Pers. 1. c. Veränderliches Sonnenröschen. In Südfrankreich, Jun. Jul. K. H. b.

- 8. H. apenninum. Pers. l. c. s. p. 80. Apenninisches Sonnenröschen. Auf den Apenninen. Jun. Jul. K. H. 5.
- 9. H. polifolium. Pers. 1. c. Poleyblättriges Sonnenröschen. In England. Jun. Jul, K. H. h.

DIGYNIA.

496. Paeonia, Päonie.

- i. P. officinalis. Pers. 1. c. 2. p. 81. Gemeime Päonie. Auf Bergen im Banat, der Schweiz u. am Ida in Candian. May, Jun. Im F. 24.
- f \$. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.
 - floribus plenis albido rubris. Mit blassrothgefüllten Blüthen.
- 's. P. Aumilis. Pers. l. c. Niedrige Päonie. In Spanien May, Jun. Im F. 24.
- 3. P. albiflora. Pers. 1. c. Weissblühende Päonie. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. P. Moutan. Curt. bot. magaz., t, 1154. Moutan-Päonie. In China. Apr. May. Ch. b. P. fruticosa: Willd. enum. suppl. p. 39. P. suffruticosa. Andrews bot. reposit. 6. n. 373.
- 5. P. tennifolia. Pers. l. c. Feinblättrige Päenie. Im Banat, der Ukraine u. Sibir. May, Jun. Im F. 4.

497. Forthergilla, Fothergille.

1. F. alnifolia. Pers. 1. c. Ellerblättrige Fothergille. In Carolina. - K. H. 5.

TRIGYNIA.

498. Homalium, Glattstrauch.

1. H. racemosum. Pers. 1. c. 2. p. 82. Tranbiger Glattstrauch. Auf Martinique u. Jamaica. — . W. H. b.

499. Delphinium, Rittersporn.

- 1. D. Ajacis. Pers. l. c. Garten Rittersporn. In der Schweiz. May — Jal. Im F. O. Sammt mehreren Abarten.
- 2. D. grandistorum. Pers. l. c. Großblüthiger Ritterspern. In Sibir. Jun. Jul. Im F. h.
 - \$. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.
- 3. D. intermedium. Pers. l. c. Mittlerer Rittersporn. Auf Bergen in Ungarn u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. D. elatum. Pers. l. c. Hoher Rittersporn. In Sibir. u. der Schweiz. May - Jul. Im F. 2.
 - 5. D. exaltatum. Pers. 1. c. Americanischer Rittersporn. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.
 - 6. D. urceolatum. Pers. l. c. Hohlblättriger Rittersporn. — Jun. Jul. Im F. 4.
 - 7. D. pictum. Willd. enum. 1. pr 574. Be-mahlter Rittersporn. In Südenr. Jun. Jul. K. H. J.

500. Aconitum, Eisenhut.

1. A. Lycoctonum. Pers. 1. c. 2. p. 83. Wolfs Eisenhut. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Ital, n. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

- 2. A. pyrenaicum. Pers. 1. c. Pyrenäischer Eisenhut. In Sibir. der Tartarey u. den Pyrenäen. Jul, Im F. 24.
- 3. A. neomontanum. Pers. 1. c. Neubergischer Eisenhut. Auf Oesterreichischen, Steyerschen, c. Kärnthensehen Alpen. Jun. Jul. Im F.24.
- 4. A. Cammarum. Pers. 1. c. Langhelmiger Eisenhut. In Oesterr. u. Steyerm. auf Niederalpen. Jan. Jul. Im F. 24.

PENTAGYNIA.

501. Aquilegia, Ackeley.

- 1. A. vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 85. Gemeine Ackeley. In steinigen Hainen v. Eur. May. Jun. Im F. 4. Sammt mehreren, sich durch die Blüthenfarbe unterscheidende Abarten.
- 2. A. canadensis. Pers. 1. c. Canadische Ackeley. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 3. A. atropunpurea. Willd. enum. 1. p. 577. Darkelpurpurrothe Ackeley- In Sihir. Jun. Im F. 24.
- 4. A. viridiflora. Pers. 1. c. Grünblüthige Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 2.

502. Nigella, Schwarzkümmel.

1. N. damascena. Pers. 1. c. Garten-Schwarzkümmel. Zwischen den Saaten in Sudeur. Jun. Jul. Im F. O.

3 th 4 . L. II 4433. ;

- 2. N. sativa. Pers. 1. c. Gemeiner Schwarz-kümmel. Erdbarsame. In Aegypt. u. Cand. Jun. Jul. Im F. O.
- 3. N. bispanica. Pers. l. c. Spanischer Schwarzkümmel. In Span. u. bey Montpellier. Jun. Jul. Im F. O.
- 4. N. orientalis. Pers. 1. c. Orientalischer Schwarzkümmel. Bey Aleppo, Jun. Jul. Im F. O.

503. Hypericum, Hartheu.

- 1. H. balearicum. Pers. l. c. 2. p. 86. Balearisches Harthen. Auf Hügeln zu Majorca Jul. Aug. K. H. 5.
- 2. H. monogynum. Pers. 1. c. 2. p. 87. Indisches Hartheu. In China, Japan u. Ostind. Jul. Aug. Ch. b.
- 3. H. calycinum. Pers. l. c. Grofsblumiges Hartheu. In Griechenland. Jun. Oct. Im F. b.
- 4. H. Androsaemum. Pers. 1. c. Englischet Hartheu, In England, Ital. u. Languedoc. Jun. Jul. Im F. 5.
- 5. H. congresse. Pers. 1. c. Canarisches Harthen. Auf den Canarischen Inseln. Jul. Oct. K. H. h.
- 6. H. elatum. Pers. 1. c. 2. p. 88. Hohes Hartheu. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 5.
- 7. H. hircinum. Pers. 1. c. Stinkendes Hartheu. In Sicilien, Calabrien u. Candien. Jun. Jul. Im F. 5:
- 8. H. quadrangulars. Pers. 1. c. 4. p. 89. Vierkantiges Hartheu. Auf Wiesen in Eur. May,
 Jul. Im F. 24.

- 9. H. dubium. Pers. l. c. Zweifelhastes Harthen. Auf Niederalpen in Deutschl. Ital. u. England. Jun. Aug. Im F. 24.
- 10. H. perforatum. Pers. l. c. Gemeines Hartheu. In Eur. May, Aug. Im F. 24.
- 11. H. barbatum. Pers. l. c. 2. p. 90. Bartiges Harthen. In Oesterr. bey Mauerbach auf Bergwiesen. Jun. Jul. Im F. 4.
- 12. H. hirsutum. Pers. 1. c. Haariges Hartheu. Auf Hügeln, Bergen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

POLYGYNIA.

504. Dillenia, Dillenie.

1. D. scandens. Pers. l. c. 2. p. 92. Rankende Dillenie. In Neuholl. Aug. Ch. t.

505. Liriodendron, Tulpenbaum.

1. L. Tulipifera. Pers. l. c. 2. p. 93. Virginischer Tulpenbaum. In Nordamer. Jun. Jul. 1m F. t.

506. Magnolia, Magnolie.

- 1. M. grandiflora. Pers. l. c. Grossblüthige Magnolie. In Carol. u. Florida, Jul. Aug. K. H. h.
- 2. M. glauca. Pers. l. c. Grangrüne Magnolie. In Pensylvan, Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. 5.
- 3. M. obovata. Pers. 1. c. Rothe Magnolie. In Japan u. China. —. Ch. 5. M. purpurea. Curt. bot. mag. t. 390.

- 4. M. tripetala. Pers. l. c. Dreyblättrige Magnolie. In Virgin, u. Carol. Jun. Jul. K. H. 5.
- 5. M. fuscata. Pers. 1. c. Braune Magnolie. In China. . Ch. 5.
- 6 M. auriculata. Pers. l. c. Geöhrte Magnolie. Auf den höchsten Bergen in Carol. K. H. b.

507. Annona, Flaschenbaum.

- 1. A: muricata. Pers. 1. c. 2. p. 95. Stachliger Flaschenbaum. Im wärmer. Amer. —. W. H. 5.
- 5. A. glabra. Pers. 1. c. Glatter Flaschenbaum. In Carol. May. K. H. 5.
- 3. A. triloba. Ait. hort. kew. 2. p. 254. Dreylappiger Flaschenbaum. In Carol. K. H. t. Porcellia triloba. Pers. l. c.

508. Hepatica, Leberkraut.

1. H. triloba. Decand. fl. Franc. 4. p. 885. Drey lappings Leberkraut. In Europ. Hainen. März, Apr. Im F. h.
Anemone hepatica. Pers. l. c. 2. p. 96.

509. Pulsatilla, Küchenschelle.

- 1. P. patens. Mill. dict. n. 4. Ausgebreitete Küchenschelle. Auf Alpen in Böhmen, Schlesien, der Lausitz u. in Sibirien. May. Jun. F. 4. Anemone patens. Pers. 1. c.
- 2. P. vernalis. Mill. dict. n. 3. Frühlings Küchenschelle. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz u. Schweden. März. Im F. 21. Anemone vernalis. Pers. 1. c.

- 2. P. vülgeris. Mill. dict. n. s. Gemeine Küchenschelle. Auf dürren Hügeln in Eur. März, Apr. Im F. 4.

 Anemone Pulsatilla. Pers. l. c.
- 2. P. pratensis. Mill. dict. n. 2. Wiesen-Küchenschelle. In Deutschl. auf trockenen Wiesen, u. Hügeln. Apr. Im F. 24.
 Anemone pratensis. Pers. l. c. p. 97.

510. Anemone, Anemone.

- 1. A. coronaria. Pers. 1. c. Gemeine Anemone. Im Orient. May. Im F. 24.
- 2. A. hortensis. Pers. 1. c. Garten-Anemone. In Suddyrol, Ital. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 4.
- 3. A. sylvestris. Pers. I. c. Wald Anemone. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.
- 4. A. virginiana. Pers. l. c. Virginische Anemone. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 2.
- 5. A. nemorosa. Pers. l. c. 2. p. 08. Busch Anemone. In Europ. Hainen. May. Jun. Im F. 4.
- 6. A. ranunculoides. Pers. 1. 2. Ranunkelartige Anemone. Auf schattigen Wiesen im nördlicher. Eur. May. Im F. 21.
- 9. A. narcissiflora. pers. l. c. Narzissenblüthige Anemone. Auf Alpen in Oesterr. Schlesien, Schweiz, Frankr. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

511. Atragene, Atragene.

1. A. alpina. Pers. l. c. Alpen Atragene. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. b.

512. Clematis, Waldrebe.

- 1. C. cirrhosa. Lin. sp. pl. p. 769. Einfachblättrige VValdrebe. In Andalusien u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. 5. Atragene cirrhosa. Pers. l. c.
- 2. C. florida. Thunb. jap. 240. Großblüthige Waldrebe. In Japan. Jun. Jul. Ch. th. Atrag, florida. Pers. l. c.
- 3. C. Viticella, Pers. l. c. 2. p. 99. Italienische Waldrebe. In Span. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 21.
 - B. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.
- 4. C. crispa. Pers. l. c. Krausblüthige Waldrebe. In Carolina. Jun. Jul. K. H. 5.
- 5. C. calycina. Ait. hort. kew. 2. p. 259. Gekelchte Waldrebe. Zu Minorca. Jun. Jul. K. H. 5.
 Atrag. balearica. Pers. l. c. 2. p. 96.
- 6. C. glauca. Pers. l. c. 5. p. 99. Meergrüne Waldrebe. In Sibir. u. im Orient. Aug. Im F.
- 7. C. virginiana. Pers. 1 c. Virginische Waldrebe. In Nordamer. Sept. Im F. 5.
- 8. C. Vitalba. Pers. 1. c. 2. p. 100. Gemeine Waldrebe. In Deutschl. der Schweizu. Frankr. Jun. Aug. Im F. t.
- g. C. Flammula, Pers. 1. c. Scharfe Waldrebe. Zu Montpellier u. in Graubündten. Jun. Jul. Im F. h.
 - 10. C. erecta, Pers. l. c. Aufrechte Waldreke- Auf Hügeln in Oesterr. Ungarn, der Schweiz zu Montpellier u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 4.

11. C. integrifolia. Pers. l. c. Einfache Waldrebe. In Ungarn u. der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

513. Thalictrum, Thalictrum.

- 1. Th. fostidam, Pers. 1. c. Stinkendes Thalictrum. In der Schweiz. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.
- 2. Th. majus. Pers. I. c. Grosses Thalictrum In Oesterr, und Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. Th. minus. Pers. l. c. Kleines Thalictrum. Auf Kalkgebirge in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 4. Th. purpurascens. Pers. I. c. Röthliches Thalictrum, In Canada. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. Th. angustifolium. Pers. l. c. 2. p. 101. Schmalblättriges Thalictrum. In Oesterr. u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.
- 6. Th. flavum. Pers. 1. c. Gemeines Thalictrum. Auf sumpfigen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 7. Th. speciosum. Pers. 1. c. Schönes Thalictrum. In Südfrankr. u. Span. Jun. Jul. Im F. 24.
- 8. Th. rugosum. Pers. I. c. Runzliges Thalictrum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.
- 9. Th. nigricans. Pers. 1. c. Schwärzliges Thalictrum. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.
- 10. Th. aquilegifolium, Pers. l. c. Ackeley-blättriges Thalictrum. In Deutschl. d. Schweiz u. Schweden. Jun. Jul. Im F. 4.

514. Adonis, Adonis.

1. A. vernalis. Pers. l. c. 2. p. 102. Frühlings-Adonis. Auf sonnigen Hügeln im mittler. Europa. Apr. May. Im F. W.

515. Ranunculus, Ranunkel. (Hahnenfuss.)

- 1. R. Flammula. Pers. l. c. Beissender Ranunkel. An Wassergräben in Eur. Jun. Aug. Im F. 2.
- 2. R. gramineus. Pers. 1. c. Grashlättriger Ranunkel. Auf feuchten Wiesen in Frankreich. May, Jun. Im F. 24.
- 3. R. Thora. Pers. I. c. 2. p. 103. Giftiger Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Dauphine u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. 24.
- 4. R. auricomus. Pers. 1. c. Verschiedenblättriger Ranunkel. In feuchten Hainen v. Eur. un. Jul. Im F. 24.
- 5. R. illyricus. Pers. I. c. Illyrischer Ranunkel. In Oesterr. Ungarn, Ital. u. Languedo Jun. Jul. im F. 24.
- 6. R. asiaticus. Pers. l. c. 2. p. 104. Garten-Ranunkel. In Asien u. Mauritanien. May, Jun. Im F. 24-
- 7. R. montanus. Pers. l. c. Berg Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. in der Dauphine. Jun. Aug. Im F. J.
- 8. R. bulbosus. Pers. 1. c. Knolliger Ranunkel. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 2.

- 9. R. repens. Pers. 1. c. 2. p. 205. Kriechender Ranunkel. In ausgetrockneten Wassergräben v. Europa. Jul. Aug. Im F. 24.
- 10. R. lanuginosus. Pers. 1. c. Wolliger Ranunkel. Auf Bergwiesen in Eur. Jun. Aug. Im F. 24.

516. Trollius, Trollblume.

- 1. T. europaeus. Pers. l. c. 2. p. 106. Europäische Trollblume. Auf Bergwiesen in Deutschl. Engl. u. Schweden. Jun. Aug. Im F. 4.
- 2. T. asiaticus. Pers. l. c. Asiatische Trollblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 4.

517. Isopyrum, Isopyrum.

1. I. thalistroides. Pere. 1. 2. c. p. 107 Thalictrumartiges Isopyrum. In schattigen Hainen v. Oesterr. Krain, Ungarn u. Ital. May. Im F. 4.

518. Helleborus, Christwurz.

- 1. H. hyemalis. Pers. l. c. 2. Winter Christwurz. In Oesterr. det Schweiz u. Italien. Febr. März. Im F. 24.
- 2. H. niger. Pers. 1. c. Schwarze Christwarz. In Oesterr. u. Toscana. Jän. — Apr. Im F. 4.
- 3. H. viridis. Pers. l. c. Grüne Christwurz. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Ital. März, Apr. Im F. 24.
- 4. H. foetidus. Pers. l. c. Stinkende Christwurz. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. März, Apr. Im F. 24.

5. H. lividus. Pers. 1. c. Schmutzigweiße Christwurz. In Corsica. Apr. May. Im F. 4.

519. Caltha, Kuhblume.

1. C. palustris. Pers. l. c. Gemeine Kuhblume. Auf feuchtem Boden in Eur. Asien u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

CLASSIS, XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

520. Teucrium, Gamander.

- 1. T. fruticans. Pers. l. c. 2. p. 110. Strauchartiger Gamander. In Ital. Span. Sicil. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. h.
- 2. T. Marum. pers. l. c. Katzon-Gamandor. Zu Valenzia in Span. Jul. Aug. K. H. h.
- 3. T. multifforum. Pers. 1. c. Vielblüthiger Gamander. In Span. Aug. Ch. b.
 - 4. T. Laxmanni. Pers. l. c. Laxmanuischer Gamander. Auf trockenen Plätzen in Ungarn, Sclavonien u. Sibirien. Jun. Aug. Im F. 24.
 - 5. T. virginicum. Pers. 1. c. 2. p. 111. Virginischer Gamander, In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 6. T. hyrcanicum, Pers. l. c. Hyrcanischer Gamander. In Hyrcanien. Jun. Jul. K. H. 24.
 - 7. T. abutiloides. Pers. l. c. Großblättriger Gamander. Zu Madera. May Jul. Ch. 5.

- 8. T. Scorodonia. Pers. 1. c. Scorodonien-Gamander. Auf Sandhügeln in Deutschl. der Schweiz, Frankr. Engl. u. Niederland. Jun. Aug. Im F. 24.
- 9. T. betonicum. Pers. 1. c. Betonienartiger Gamander. An Flüssen zu Madera. Jul. Aug. Ch. 5.
- 10. T. massiliense. Pers. 1. c. Französischer Gamander. In Candien u. in Südfrankr. Jun. Aug. K. H. ty.
- 11. T. flavum. Pers. l. c. 2. p. 112. Gelber Gamander. In Ital. Span. Frankr. u. der Barbarey. Jun. Aug. K. H. h.
- 12. T. montanum. Pers. l. c. Berg. Gamander. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. Jun. Aug. Im F. 24.

521. Satureia, Pfefferkraut. (Saturey.)

- 3. S. Thymbra. Pers. 1. c. 2. p. 113. Candisches Pfefferkraut. In Candien u. Tripoli. Jun.

 Aug. K. H. 5.
- 2. S. montana. Pers. 1. c. Berg-Pfefferkraut. In Krain, Croatien, Ital. Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. t.
 - 3. S. hortensis. Pers. 1. c. Gemeines Pfeffer-kraut. In Ital. u. Languedoc. Jun. Aug. Im. F. O.

522. Hyssopus, lsopp.

1. H. officinalis. Pers. l. c. 2. p. 114. Gemeiner Isopp. In Südeur. Jun. Jul. Im F. h.

- 2. H. orientalls. Willd. enum. 2. p. 599-Orientalischer Isopp. Am Caucasus. Jul. — Oct. K. H. b.
- 3. H. scrophularifolius. Pers. 1. c. Langräslicher Isopp. In Canada. Jun. Jul. Im F. d.

423. Nepeta, Katzenmünze.

- 1. N. Cataria. Pers. I. c. Gemeine Katzenmünze. Im Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. N. violacca. Pers. l. c. 2. p. 11 5. Violete Katzenmünze. In Span, Sibir. u. Krain, Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. N. Nepetella, Pers. 1. c. Kleine Katzenmunze. In Sudeur, Jun. Jul. K. H. 24.
- 4. N. colorata. Willd. enum. 2. p. 601. Be-mahlte Katzenmüntze. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 2.
 N. melissaefolia. Pers. l. c.

522. Lavandula, Lavendel.

- 1. L. Spica. Pers. l. c. 2. p. 116. Gemeiner Lavendel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. h.
- e. L. Stoechas. Pers. l. c. Schopf-Lavendel, In Südfrankr. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. h.
- 3. L. dentata. Pers. 1. c. Gezähnter Lavendel. In Span. Nordafr. u. im Orient, May Sept-Ch. t.
- 4. L. pinnata. Pers. 1. c. Gefiederter Lavendel. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

- 5. L. multifida. Pers. 1. c. Vielspaltiger Lavendel. In Africa u. Span, Jun. Jul. Ch. h.
- 6. L. abrotanoides. Pers. l. c. Stabwurzartiger Lavendel. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. 5.

525. Sideritis, Gliedkraut.

- 1. S. canariensis. Pers. 1. c. Canarisches Gliedkraut. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. b.
- 2. S. candicans. Pers. 1. c. Weissliches Gliedkraut. Zu Madera. Jun. Jul. Gh. 5.
- 3. S. cretica. Pers. l. c. Candisches Glied-kraut. In Candien. Jul. K. H. h.
- 4. S. syriaca. Pers. l. c. 2. p. 117. Syrisches Gliedkraut. In Ital. Candien u. im Orient. Jun. Jul. K. H. b.

526. Bistropogon, Kelchbart.

1. B. punctatum. Pers. I. c. 2. p. 118. Punktirter Kelchbart. Auf Madera. —. Ch. b.

527. Mentha, Münze,

- 1. M. sylvestris. Pers. l. c. 2. p. 119. Wald-Münze. In Deutschl, Engl. u. Frankr. an Bächen. Jun. — Aug. Im F. 4.
- 2. M. viridis. Pers. l. c. Grüne Münze. In Deutschl. Engl. Frankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. M. piperita. Pers. 1.7 c. Pfeffer-Münze. In Engl. Jun. Jul. Im F. 4.

- 4. M. rotundifolia Pers. l. c. Rundblättrige Münzs. An feuchten Stellen in Deutschl. u. Engl. Jun. Jul. Im F. 24.
 - s. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.
- 5. M. crispa. Pers. 1. c. Krause Münze. In Deutschl. d. Schweiz u. Sibirien. May, — Jul. Im F. 21.
- 6. M. aquatica. Pers. 1. c. Pferde-Münze. Am Wasser in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.
- 7. M. austriaca. Pers. l. c. 2. p. 120. Oesterreichische Münze. In Oesterr. Deutschl. u. Frankreichs Sümpfen. Jun. Jul. Im F. 4.
- 9. M. pulegium. Pers. l. c. Poley-Münze Iu Deutschl. d. Schweiz, Engl. u. Frankr. in lehmigen Boden. Jun. Jul. Im F. 24.
- g. M. cervina. Pers. l. c. Hirsch-Münze. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

528. Perilla, Perille. .

1. P. ocymoides. Pers. l. c. Basilicumartige Perille, In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.

529. Lamium, Bienensaug.

- 1. L. orvala. Pers. l. c. 2.p. 121. Grossblüthiger Bienensaug. In Pannonien, Istrien, Ital. u. Croatien. May Jul. Im F. 24.
- 2. L. garganicum. Pers. l. c. Italienischer. Bienensaug. Auf dem Bergen Gargano iu Apulien. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 9. L. album. Pers. l. c. a. p. 122. Weiser Bienensang. In Eur. May, - Jul. Im F. 4.

530. Betonica, Betonie.

- 1. B. officinalis. Pers l. c. Gemeine Betonie. In Eur. Jun. Aug. Im F. 24.
- 2. B. stricta. Pers. l. c. 2. p. 123. Steife Betonie. In Deutschl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 5.
- 3. B. orientalis. Pers. 1. c. Orientalische Betonie. Im Orient. May — Jul. Im F. 24.

531. Stachys, Ziest.

- 1. St. circinata. Pers. 1. c. Stumpfblättriger Ziest. In Africa. Sept. Oct. Ch. 4.
- 2. St. coccinea. Pers. l. c. Scharlachrether Ziest, In Mexico u. Chili, Jun. Jul. Ch. 24.
- 3. St. alpina. Pers. 1. c., Gebirgs-Ziest. In Deutschl. u. d. Schweiz auf Bergen, May — Jul. Im F. 24.
- 4. St. germanica. Pers. l. c. Deutscher Ziest. In Deutschl. Engl. Frankr. u. Sibir. May, Jun. Im F. h.
- 5. St. lanata. Pers. l. c. Wolliger Ziest. In Sibirien. May, Jul. Im F. 24.
- 6. St. rugosa, Pers. l. c. 2, p. 124. Runzliger Ziest. Am Cap. Jul. Sept. Cb. 5.

532. Marrubium; Andorn.

1. M. peregrinum. Pers. l. c. 2. p. 125. Fremder Andorn. Auf trockenen Boden in Oesterr. Sicil. u. Candien. May — Aug. Im F. 24.

- 4. M. crispum. Pers. 1. c. Krauseblättriger Andorn. In Ital. u. Span. Jun. Jul. K. H. 2.
- 3. M. hispanicum. Pers. 1. Spanischer Andorn. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.
- 4. M. Pseudo Dictamnus. Pers. l. c. Dostartiger Andern. In Candien. Jun. Jul. K. H. b.

533. Phlomis, Fackelblume.

- 1. Ph. fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 126. Strauchartige Fackelblume. In Sicilien u. Span. Jul. Aug. K. H. h.
- 2. Ph. salviaefolia. Pers. l. c. Salveyblättrige Fackelblume. . May , Jun. Ch. 5.
- 3. Ph. tuberosa. Pers. l. c. 2. p. 127. Knollige Fackelblume. In Sibirier. Jun. Aug. Im F. 24.
- 4. Ph. nepetifolia. Pers. 1. c. Katzenmünzblättrige Fackelblume. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. O.
- 5. Ph. Leonurus. Pers. 1. c. Goldfarbige Faekelblume. Am Cap. Oct. Nov. Ch. t.

534. Moluccella, Trichterkelch.

- 1. M. spinesa. Pers. l. c. Stachliger Trichterkelch. Auf den Mollucken. Jun, Jul. Im F. O.
- 2. M. laevis. Pers. l. c. 2. p. 128. Glatter Trichterkelch. In Syrien. Jun. Jul. Im F. O.

535. Origanum, Dosten.

1. O. Dictamnus. Pers. l. c. Diptam-Disten. Auf dem Berge Ida in Candien. Sept. Oct. K.H. b.

- 2. O. heracleoticum. Pers. l. c. 2. p. 129. Griechischer Doston. Steyerm. bey Grätzu. Südeur besonders in Griechenl. May Jul. Im F. 4.
- 3. O. vulgare. Pers l. c. Gemeiner Dosten. In Eur. u. Canada. May — Jul. Im F. 24.
- 4. O. Majorana. Pers. l. c. Majoran Dosten. In Portug. u. Palästina. Jun. Jul. Im F. 🕤.

536. Westeringia, Westeringie.

1. W. rosmariniformis. Smith in act. kolm. 1797. p. 175. t. 8. Rosmarinartige Westeringie. In Neuholl. May, — Aug. Ch. t. W. rosmarinacea. Persel. c. Cunila fruticosa. Donn. catal. horti cantabr. p. 5.

537. Thymus, Thymian.

- 1. Th. Serpyllum. Pers. l. c. 2. p. 130. Feld-Thymian. In Eur. May Aug. Im F. h.
- 2. Th. vulgaris. Pers. 1. c. Gemeiner Thymian. In Südeur. May Jul. Im F. 1.
- 3. Th. Calamintha. Willd, enum. 2. p. 624. Calmunzen-Thymian. In Oesterr. d. Schweiz. Ital. Span. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24. Melisa Calamintha. Pers. I. c. 2. p. 132.
- 4. Th. Acinos. Lin. sp. pl. p. 826. Acker-Thymian. In Eur. Jun. Jul. Im F. O. Acynos vulgaris. Pers l. c. 2. p. 131.
- 5. Th. alpinus. Lin. l. c. Alpen Thymian. Auf Bergen in Oesterr. Salzb. d. Schweiz u. zu Montpellier. May, Jun. Im F. 24. Acynos alpinus. 1 ers. l. c. 2. p. 131.

6. Th. montanus. Pers. l. c. 2. p. 130. Berg-Thymian. In Ungara. Jun. Jul. Im F. 4.

538. Melissa, Melisse.

1. M. officinalis. Pers. l. c. 2. p. 132. Citronen-Melisse. Auf Bergen in Ungarn d. Schweiz u. Ital. Jun. — Aug. Im F. 24.

539. Horminum, Horminum.

1. H. pyrenaicum. Pers. l. c. Pyrenäisches Horminum. Auf den Pyrenäen, den Tyroler u. Krainer Alpen, Jun. Jul. Im F. 24.
Melissa pyrenaica. Jacq. hort. vind. 2. p. 86.
t. 183.

540. Melittis, Bienenblume.

1. M. Melissophyllum. Pers. l. c. Melissenblättrige Bienenblume. Auf Bergen in Oesterr. d. Schweiz, Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. 21.

541. Dracocephalum, Drachenkopf.

- 1. D. virginianum. Pers. l. c. s. p. 133. Virginischer Drachenkopf. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 21.
- 2. D. canariense. Pers. 1. c. Canarischer Drachenkopf. Auf den Canarischen Inseln. Jul. K. H. b.
- 3. D. austriacum. Pers. 1. c. Oesterreichischer Drachenkopf. Auf dem Geisberge in Oesterr. dann auf Bergen in Ungarn, Sie Benburgen u. Portugall. Jun. Jul. Im F. 24.

- 4. D. Ruyschiana. Pers. 1. c. Schwedischer Drachenkopf. In Schweden, Dännemark, Sibirien u. d. Schweiz. Jun. Aug. Im F. 24.
- 5. D. Sibiricum. Pers. 1. c. Sibirischer Drachenkopf. In Sibir. May — Aug. Im F. 24.
- 6. D. Moldavica. Pers. l. c. Türkischer Drachenkopf, In der Moldau u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

542. Ocymum, Basilicum,

- 1. O. monachorum. Pers. l. c. 2. p. 134. Zimmtduftendes Basilicum. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. O.
- 2. O. gratissimum. Pers. l. c. Angenehmes Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.
- 3. O. suave. Willd. enum. 2. p. 629. Liehlichdustendes Basilicum. May Oct. W. H. b.
- 4. O. Basilicum. Pers. 1. c. Gemeines Basilicum. In Ostind, u. Persien. May Aug. W. H. O.
 - B. simbriatum. Mit verbrämten Blättern.
 - 7. bullatum. blasigen -
- 5. O. minimum. Pers. l. c. Kleinstes Basilicum. Auf Ceylon. May Aug. W. H. O.
- 6. O. polystachyon. Pers. l. c. Vielähriges Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.

543. Plectranthus, Hahnensporn.

1. P. fruticosus. Pers. l. c. 2. p. 135. Strauchartiger Hahnensporn. Am Cap. Jun. — Nov. Ch. 5. 2. P. parviflorus. Willd. hort. berol. 1. p. 65. Kleinblüthiger Hahnensporn. In Peru? May
— Aug. Ch. th.

544. Scutellaria, Helmkraut.

- 1. Sc. alpina. Pers. l. c. 2. p. 136. Alpen-Helmkraut. Auf Alpen in d. Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.
- 2. Sc. galericulata. Pers. l. e. Gemeines Helmkraut. An Wässern in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

545 Prunella, Prunelle.

- 1. P. grandiflora. Pers. l. c. 2. p. 137. Großblüthige Prunelle. In Eur. May — Jul. Im F. 4.
- 2. P. laciniata. Pers. 1. c. Schlitzblättrige Prunelle. In Europ. Waldungen. May — Jul. Im F. 24.

546. Prasium, Niccoline.

1. P. majas. Pers. l. c. Große Niccoline. In Dalmatien, Sicil. zu Rom. u. bey Tanger. Jun. Jul. K. H. t.

AN GIOSPERMA.

547. Verbena, Eisenhart.

1. V. Aubletia, Pers. l. c. 2. p. 138. Schönblühender Eisenhart, In Carol. u. Georg. Jun. Jul. Im F. O.

- 2. V. bonariensis. Pers. 1. c. Südamericanischer Eisenhart. Zu Buenos Ayres. Jun. Jul. Ch. 4.
- 3. V. hastata. Pers. l. c. Spiessblättriger Eisenhart. In Nordamer. Jun. - Im F. VV.
- 4. V. triphylla, l'Herit. styrp. 1. p. 21. t. 11. Dreyblättriger Eisenhart. Zu Buenos Ayres u. Chili, Jul. Jul. Ch. th. Aloisia citriodora, Pers. 1. c. 2. p. 139.

548. Priva, Prive.

1. P. mexicana. Pers. l. c. Mexicanische Prive. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. 21. Verbena mexicana. Mill. dict. n. 16.

449. Lantana, Lantane.

- 1. L. mista, Pers. l. c. 2. p. 140. Bunte Lantans. Im wärmer, Amer. Jun. Jul. W. H. h.
- 2. L. trifolia. Pers. l. c. Dreyblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. h.
 - 3. L. Cammara. Pers. 1. c. Veränderliche Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept. VV. H. h.
 - 4. L. crocea, Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 37t. 47. Safranfarbige Lantane, In Jamaica. Apr. May. VV. H. h.
 - 5. L. involucrata. Pers. 1. c. Andornblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. h.
- 6. L. recta. Pers. l. c. Kleinblättrige Lantane. In Jamaica. Jun. Aug. W. H. 5.

- 7. L. lavandulacea. Pers. 1. c. Lavendelblättrige Lantane. — Jun. — Aug. W. H. 5.
- 8. L. salvifolia. Pers. 1. c. Salveyblättrige Lantane. Am Cap. Jun. — Aug. W. H. h.
- 9. L. melissaefolia. Pers. l. c. Melissenblättrige Lantane. In Westindien. Jun. — Aug. VV. H. h.
- 10. L. scabrida. Pers. 1. c. Scharfblättrige Lantane. In Westind. Jun. — Aug. W. H. b.
- 11. L. nivea. Pers. l. c. Weissblühende Lantane. In Ostind. Jun. Aug. W. H. b.
- 12. L. aculeata, Pers. l. c. Stachlige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Aug. W. H. 5.

550. Duranta, Durante.

- 1. D. Plumieri. Pers. 1. c. Plumierische Durante. In Südamer. — W. H. b.
- 2. D. Ellisia. Pers. 1, c. Ellisische Durante. In Jamaica. —. W. H. b.
- 3. D? Frutex an novi generis? Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 51. t. 500. Ist in Patagonien 21 Hause.

551. Citharexylum, Geigenholz.

- 1. C. cynereum. Pers. l. c. 2. p. 142. Graues Geigenholz. In Jamaica. VV. H. b.
- 2. C. caudatum. Pers. 1. c. Ausgerandetes Geigenholz. In Jamaica. — W. H. 5.
- 3. C. villosum. Pers. 1. c. Haariges Geigenholz. In St. Domingo. Aug. Oct. W. H. 5.

- 4. C. molle. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. g. t. 417. Weiches Geigenholz. . Apr. Jul. W. H. h.
 - 5. C. quadrangulare. Pers. l. c. Vierkantieges Geigenholz. Zu Martinique. Jun. Aug. W. H. b.
 - 6. Eine noch unbeschriebene Art, dem C. cinereo sehr ähnlich, dessen Vaterland mir unbekannt ist.

552. Cornutia, Cornutie.

1. C. punctata. Willd. sp.pl. 3. p. 322. Punktirte Cornutie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. h. Hostana coerulea. Pers. l. c. 2. p. 143. Hosta coerulea. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 60. t. 114.

553. Vitex, Müllen.

- 1. V. Ağnus eastus. Pers. l. c. Gemeine Müllen. In Sümpfen v. Neapel. u. Sicilien. Jul. Aug. K. H. t.
- 2. V. incisa. Pers. 1. c. Eingeschnittene Müllen. In Chipa. Aug. Sept. Ch. 3.

554. Volkameria, Volkamerie.

- 1. V. aculeata. Pers. l. c. 2. p. 144. Stachlige Volkameries In Jamaica u. Barbados. VV. H. h.
- 2. V. ligustrina. Pers. 1. c. Ligusterartige Volkamerie. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. h.

- 3. V. inermis. Pers. l. c. Wehrlose Volkamerie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.
- 4. V. buxifolia. Willd. enum. 2. p. 658. Buchsblättrige Volkamerie. . W. H. t.

555, Clerodendrum, Loosbaum.

- 1. C. viscosum. Pers. l. c. 2. p. 145. Klebriger Loosbaum, In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.
- 2. C. purpureum. Hort. parisiens. Purpurrother Loosbaum. —. W. H. 5.
- 3. C. fortunatum. Pers. l. c. Glücklicher Loosbaum. In Ostind. . W. H. h.
- 4. C. fragrans. Willd. enum. 2. p. 659. Wohlriechender Loosbaum. In Japan. Jun. — Aug. W. H. 5. Volkameria fragrans. Pers. 1. c. Volkamania japonica. Jacq. hort. schoenbr, 3. p. 48. t. 338.

556. Selago, Selago.

r. S. corymbosa. Pers. 1. e. Doldentranbige Selago. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. h.

557. Hebenstreitia, Hebenstreitie.

1. H. dentata. Pers. l. c. 2, p. 140. Gezähnte Hubenstreitie. Am Cap. Jun. Ful. Ch. A.

558. Manulea, Handblume,

1. M. alternifolia. Pers. 1. c. 2. p. 148. Wechselblättrige Handblume. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. p.

- 2. M. viscosa. Willd. enum. 2. p. 653. Klebrige Handblume. Am Cap. Jun. Sept. Ch. b. Buchnera viscosa. Pers. l. c. 2. p. 149.
- 3. M. oppositifolia. Pers. l. c. 2. p. 148. Gegenüberstehendblättrige Handblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.

559. Bartsia, Bartsie.

1. B. alpina. Pers. l. c. 2. p. 150. Alpen-Bartsie. Auf Alpen in Oesterr. d. Schweiz, Savoyen u. Lappland. Jul. Aug. Im F. 24.

560. Linaria, Leinkraut.

- 1. L. Cymbalaria. Willd. enum. 2. p. 639. Eckiges Leinkraut. Auf Felsen in Eur. May Aug. Im F. 24. Antirrhinum Cymbalaria. Pers. 1. c. 2. p. 155.
- 2. L. latifolia. Willd. 1. c. Breitblättriges Leinkraut. In Nordafrica. Jun. Jul. Im F. O. Antirrhin, latif. Pers. 1. c.
 - 3. L. purpurea. Willd. l. c. Purpurfarbiges. Leinkraut. Am Vesuv. Jun. Jul. K. H. 24. Antirrhin. purp. Pers. l. c. 2. p. 156.
- 4. L. versicolor. Willd. l. c. 2. p. 640. Buntes Leinkrant. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. O. Antirrhin. versic. Pers. l. c.
 - 5. L. repens. Willd. 1. c. Kriechendes Leinkraut. In Engl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4. Antirrhin. rep. Pers. 1. c.
 - 6. L. bipartita. Willd, l. c. Zweytheiliges. Leinkraut. Zu Mogador. Jun. Jul. Im F. O. Antirrhin, bipartit. Pers. l. c. 2, p. 155.

- 7. L. alpina. Willd. 1. c. 2. p. 641. Alpen-Leinkraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. d. Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 2. Antirrhin. alp. Pers. 1. c. 2. p. 157.
- 8. L. genistifolia. Willd. l. c. Ginsterblättriges Leinkraut. Auf trockenen Hügeln in Oesterr. d. Schweiz u. Sibirien. May Jul. Im F. 24. Antirrhin. genistif. Pers. l. c. 2, p. 158.
- 9. L. vulgaris. Willd. l. c. Gemeines Leinkraut. In trockenen Hainen u. auf Wiesen in Eur. May Jul. Im F. 4.
 Antirrhin. Linaria. Pers. l. c.
 - B. Peloria. Mit monströser Blüthe.

561. Antirrbinum.

- 1. A. majus. Lin. sp. pl. p. 859. Gerten-Löwenmaul. In Südtyrol, u. den noch südlicheren Eur. May — Jul. Im F. h. Orontium majus. Pers. l. c.
- 2. A. siculum. Ucria, apud Roem. arch 1. p. 69. Sicilianisches Löwenmaul. In Sicilien. Jun. Jul. K. H. 4. Oront. sicul. Pers. 1. c.

562. Nemesia, Nemesie.

1. N. foetens. Pers. 1. c. 2. p. 159. Stinkende Nemesie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

563. Maurandia, Maurandie.

- 1. M. semperflorens. Jacq. hort. schoenbr.
 3. p. 20. t. 288. Immerblühende Maurandie. In
 N. xico. Jun. Sept. W. H. 4.
 M. scandens. Pers. l. c. 2. p. 160.
- 2. M. antirrhinissora. Humboldt et Bompland. Löwenmaulblättrige Maurandie. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

564. Scrophularia, Braunwurz.

- 1. So. aquatica. Pers. P. c. Wasser-Braunwurz. An feuchten Stellen in Eur. May. — Jul. Im F. S.
- 2. Sc. betonicaefolia. Pers. I. c. Betonienblättrige Braunwurz. In Portugall. Jun. Jul. K. H. 4.
- 3. Sc. orientalis. Pers. 1. c. Orientalische Braunwurz. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.
- 4. Sc. altaica. Pers. I. c. Altaische Braunwurz. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Jul.; Im F. 24.
- 5. Sc. vernalis. Pers. l. c. Frühlings-Braunwurz. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. der Schweizu. Ital. May, Jun. Im F. J.
- 6 Sc. sambucifolia. Pers. 1. c. 2. p. 161. Hollunderblättrige Braunwurz. In Span. Portug. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.
- 7. Sc. canina. Pers. l. c. Hunds-Braunwurz. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. O.,

- 8. Sc. lucida. Pers. l. c. Glänzende Braunwurz. In Ital. Candien u. im Orient. Jul. Aug. K. H. 24.
- 9. Sc. peregrina. Pers. h.c. Fremde Braunwurz. In Italien, Jun. Jul. Im F. O.

565. Celsia, Celsie.

- 1. C. orientalis. Pers. l. c. Orientalische Celsie. In Dalmatien, Cappadocien u. Armenien. Sept. Oct. Im F. O.
- 2. C. Arcturus. Pers. l. c. Gestielte Celsie. In Candien. Jun. — Oct. K. H. o.
- g. C. cretica. Pers. l. c. Candische Celsie. In Candien u. Nordair. Jun. - Aug. K. H. J.

566. Hemimeris, Halbblume.

- 1. H. urticifolia. Pers. l. c. 2. p. 162. Nesselblättrige Halbblume. In Südamer. Jul. Oct. Ch. †
- 2. H. coccinea. Willd. sp. pl. 3. p. 283. Scharlachfarbige Halbblume. In Südamer. Jul, Oct. Ch. 5.

 Hemimeris linearis. Pers. l. c.
 Celsia Jacq. ic. rar. 3. t. 497. Collect. 2. p. 270.

567. Digitalis, Fingerhut.

1. D. purpurea. Pers. l. c. Rother Fingerhat. Anf Bergen in Deutschl, der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. J.

- 2. D. ambigua. Lin. suppl. 280. Blassgelber Fingerhut. In Wäldern v. Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4. D. ochroleuca. Pers. l. c.
- 3. D. lutea. Pers. l. c. Gelber Fingerhut. In Frankr. u. Ital. Jun. Jnl. Im F. 21.
- 4. D. ferruginea. Pers. l. c. Rostfarbiger Fingerhut. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. D. lanata, Pers. l. c. 2, p. 163. Wolliger Fingerhut, Auf sonnigen Hügeln in Ungarn u-Griechenland, Jun. Jul. Im F. 4.
- 6. D. Lacvigata. Pers. l. c. Glatter Fingerhut. Auf Kalkfelsen in Croatien. Jun. Jul. Im F. 2.
- 7. D. obscure. Pers. 1. c. Dunkler Fingerhut. In Spanien: Jun. Jul. Im F. 24.

568. Mimulus, Gauklerblume.

- 1. M. slutinosus. Pers. I. c. Klebrige Gauklerblume. — . Jun. Jul. Ch. 5.
- n. M. luteus. Pers. I. c. Gelbe Gauklerblume. In Peru. Jun. Jul. Ch. O.
 - 569. Halleria, Hallerie.
- 1. H. lucida. Pers. l. c. Glänzende Hallerie. In Wäldern am Cap. Jun. Jul. Ch. t.

570. Trevirana, Trevirane.

1. Tr. coccines. Willd. caum. 2. p. 638. Scharlachrothe Trevirane. Auf Bergen in Jamaica. Aug. Sept. W. H. 24. Achimenes cocc. Pers. l. c. 2. p. 165. Cyrilla pulchella. L'Heritier stirp. nov. 1. p. 147. 1. 71.

571. Besleria, Beslerie.

1. B. serrulata. Pers. l. c. Gezähnelte Besterie. In Westind. May, Jan. W. H. h.

572. Capraria, Herzblume.

- 1. C. lucida. Ait. hort. kew. 2. p. 353. Glänzenda Herzbinme. Am Cap. — Ch. J. Teedia lucida. Pers. l. o. 2, p. 166.
- g. C. undulata. Pers. l. c. Wellenblättrige Herzblume. Auf Hügeln am Cap. — Ch. t.

573. Browallia, Browallie.

- 1. Br. demissa. Pers. 1. c. Niedrige Browwallie. In Sudamer. Jun. W. H. O.
- 2. Br. elata. Pers. l. c. Hohe Browallie. In Peru. Aug. W. H. O.

574. Bontia, Bontie.

1. B. daphnoides. Pers. l. c. 2. p. 168. Seidelbastartige Bentie. Auf den Antillen. Jun. VV. H. h.

575. Brunsfelsia, Brunsfelsie.

1. Br. americana. Pers. l. c. Americanische Brunsfelsie. Im wärmer. Amer. - . VV. H. b.

576. Crescentia, Kürbisbaum.

- 1. Cr. Cujete. Pers. l. c. Großfrüchtiger Kürbisbaum. Auf den Caraibischen Ins. Jun. Jul. W. H.; b.
- 2. Cr. pinnata. Jacq. collect. 3. p. 203. t. 18. (flos). Fragm. bot. p. 30. t. 33. f. 4. (folium et fructus). Geliederter Kurbisbaum. Zu Mozambique. —. VV. H. b.

577. Chelone, Schildblume.

- 1. Ch. obliqua. Pers. l. c. 2. p. 169. Schiefe Schildblume. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. In F. 21.
- 2. Ch. barbuta. Pers. l. c. Bartige Schildblume. In Mexico. May Aug. Im F. 4.

578. Pentstemon, Bartfaden.

1. P. campanulata, Willd. sp. pl. 3. p. 228. Glockenformiger Bartfaden. In Mexico. Jul. Avg. Ch. 24. Chelone campanul. Pers. 1. c.

579. Bignonia, Trompetenblume,

1. B. Catalpa, Pers. l. c. 2. p. 170. Gemeine Trompetenblume, In Carol. u. Florida, Jul. Aug. Im F. h.

- 2. B. longissima. Pers. 1. c. Langfrüchtige Trompetenblume. In Westind, Jul. Aug. W. H. b.
- Trompetenblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. VV. H. h.,
- 4. B. rigescens. Pers. l. c. 2. p. 171. Steifblättrige Trompetenblume. Zu Caraeas. Jul. W. H. 5.
- 5. B. paniculata. Pers. I. c. Rispenblithige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. Jul. W. H. h.
- 6. B. grandifolia. Pers. I. c. Großblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. b.
- 7. B. capreolata. Pers. 1. c. Rankende Trompetenblume. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.
- 8. B. echinata. Pers. 1. c. Weichstachlige Trompetenblume. In Carthagena. — W. H. b.
- 9. B. chrysantha. Pers. 1. c. Goldfarbige Trompetenblume. Zu Caracas. May. W. H. b.
- 10. B. Leucoxylon. Pers. l.c. Weisholzige Trompetenblume. In Jamaica an den Ufern der Flüsse. Jul. Aug. W. H. 3.
- 11. B. radicans. Pers. l. c. Wurzelnde Trompetenblume. In Pensylvan, n. Florida. Jun. Jul. Im F. h.
- 12. B. grandiflora. Pers. l. c. Grossblumige Trompetenblume. In China u. Japan. —. Ch. b.
- 13. B. stans. Pers. l. c. Eschenhlättrige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. — . W.H. b.
- 14. B. pandorana. Pers. l. c. Geigenblättrige Trompetenblume. In Neuholl. Apr. May. Ck. b.

15. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes v. Paris.

580. Xenopoma, Fremdlingstrank.

1. X. obovatum. Willd. enum suppl. p. 43.

Gewürzhafter Fremdlingstrank. In China. Jul. —
Sept. Ch. h.

Frutex innominatus. Jacq. hort. schoenbr. 4.
p. 50. t. 498.

581. Gloxinia, Gloxinie.

1. Gl. maculata. Pers. l. c. 2. p. 174. Ge-fleckte Gloxinie. Zu Carthagena in Amer. Jul. Aug. W. H. 4.

582. Gesneria, Gesnerie.

1. G. tomentosa. Pers. l. c. 2. p. 175. Filzige Gefsnerie: An Flüssen in Südamer. Jul. Aug. W. H. b.

583. Ruellia, Ruellie.

- 1. R. patula. Pers. l. c. s. p. 176. Ausgebreitete Ruellie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. O.
- 2. R. lactea. Pers. 1. c. Milchfarbige Ruellie. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. 4.
- 3. R. clandestina. Pers. 1. c. Heimliche Ruellie. Auf den Ins. Barbados u. St. Crux. Jun. Jul. W. H. 4.
- 4. R. varians. Pers. l. c. Veränderliche Ruellie. Zu Coromandel. Nov. März. W. H. h. Eranthemum pulchellum. Andrews bot, repos. p. et. t. 80.

6. I. linifolia. Pers. l. c. Leinblättriger Bauernsenf. In Spanien, Portugall, u. Montpellier. Jun. Jul. K. H. J.

590. Alyssum, Steinkraut.

- 1. A. saxatile. Pers. l. c. 2. p. 191. Gebirgs-Steinkraut. In Oesterr. u. Candien auf Felsen. Jun. Aug. Im F. 5.
- 2. A. montanum. Pers. l. c. 2. p. 192. Berg-Steinkraut. In Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.

591. Peltaria, Scheibenkraut.

1. P. alliacea. Pers. l. c. 2. p. 193. Knoblauchduftendes Scheibenkraut. Bey Stixenstein in Oesterr. dann auf Alpen in Istrien u. Croatien. Jun. Jul. Im F. 24.

592. Biscutella, Brillenschote.

- i. B. apula. Pers. l. c. Apulische Brillenschete. In Ital. Jun. Jul. Im F. O.
- schote. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

...593. Isatis, Waid.

1. I. tinctoria. Pers. l. c. Färber - Waid. In Oesterr. u. an den Meeresküsten v. Südeur. Jun-Jul. Im F. J.

594. Lunaria, Mondviole.

- 1. L. rediviva. Pers. l. c. 2. p. 194. Spitz-früchtige Mondviole. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. h.
- Mondviole. In schattigen Wäldern Deutschlands u. Schwedens. Jun. Jul. Im F. J.

SILIQUOSA E.

595. Dentaria, Zahnwurz.

- 1. D. enneaphylla. Pers. 1. c. Neunblättrige Zahnwurz. Auf waldigen Bergen in Oesterr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. D. bulbifera. Pers. I. c. Zwiebeltragende Zahnwurz. Auf waldigen Bergen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

596. Cheiranthus, Levkoy.

- 1. Ch. Cheiri. Pers. 1. c. 2. p. 200. Lack-Lev-koy. In Dalmatien, der Schweiz, Frankr. Span. u. Engl. auf Mauern. Jun. Jul. K. H. J.
- 2. Ch. maritimus. Lin. sp. pl. p. 924. Meerstrands-Levkoy. An den mittelländischen Meeresküsten. May Aug. I m F. O. Hesperis maritima. Pers. l. c. 2. p. 203.
- 3. Ch. incanus Pers. l. c. 2. p. 201. Winter-Lev-koy. Am Meerstrande in Span. Febr. März. K. H. b.
 - 4. Ch. fenestralis. Pers. 1. c. Zwerg-Lev-koy. Jun. Jul. K. H. J.

- 5. Ch. ansuus. Pers. l. c. Sommer-Levkoy. Am Meeresstrande in Südeur. Jun. Jul. Im F. O.
 - 597. Hesperis, Nachtviole.
- 1. H. tristis. Pers. l. c. 2. p. 202. Eigentliche Nachtviole. In Oesterr. u. Ungarn auf trockenen Haiden. Jun. Jul. Im F. J.
- 2. H. matronalis. Pers. 1. c. Rothe Nachtviole. In Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. J.
 - β. hortensis, flore pleno albo. Mit weißgefüllter Blüthe.
- 3. H. inodora. Pers. l. c. Fleischfarbige Nachtviole, Bey Wien u. Montpellier, Jun. Jul. Im F. J.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

- 598. Tamarindus, Tamarinden.
- 1. T. indica. Pers. 1. c. 2. p. 211. Indische Tamarinden. In Ind. Aegypt. Arab. n. Amer. May, Jun. W. H. h.
 - 599. Sisyrinchium, Schweinsrüssel.
- 1. S. racemosum. Pers. I. c. 1. p. 49. Tranbentragender Schweinsrüssel. In Brasilies. May, Jun. VV. H. 21.
 - S. palmifolium. Lin. mant. 122.
- Moraea palmifolia. Thunb. disser. de Moraea p. s. n. 6.

- 2. S. stristum. Pers. l.c. 1. p. 50. Gestreister Schweinsrüssel In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24. Moraea sertata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 6. t. 11.
- 3. S. Bermudiana. Pers. 1. c. Bermudischer Schweinsrüssel. Auf den Bermudischen Ins. Jun. Jul. Ch. 24.
- 4. S. tanuifolium. Humboldt et Bompland. Zartblättriger Schweinsrüssel. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 4.

600. Ferraria, Ferrarie.

- 1. F. Pavonia. Cavan. diss. 6. p. 342. t. 189. t. 1. Pfauenartige Ferrarie. In Mexico u. Peru. Jul. Aug. W. H. A. Tigridia Pavonia. Pers. l. c. 1. p. 50.
- 2. F. undulata. Lin. sp. pl. p. 1353. Wellenförmige Ferrarie. Am Cap. May, Jun. Ch. 4. Ferraria punctata. Pers. l. c.
- 3. F. minor. Pers. 1. c. Punktirte Ferrarie.

 Am Cap. May Jul. Ch. 4.

 Ferraria Ferrariola. Willd. sp. pl. 3. p. 581.

 Moraea Jacq. collect. 4. p. 141.

PENTANDRIA.

601, Lobelia, Lobelie,

- 1. L. longiflora. Pers. l. c. 2. p. 213. Langblüthige Lobelie. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 4.
- 2. L. cardinalis. Pers. 1. c. Cardinals-Lobelie. In Virgin. u. Carol. Jan. — Aug. K. H. 24

- 3. L. fulgans. Willd. hort. berol. 2. p. 85. Glänzende Lobelie. In Mexico. Jun. Aug. Ch. 4.
- 4. L. splendens. Willd. l. c. p. et t. 86. Schimmernde Lobelie, In Mexico. Jun. Aug. Ch. 24.
- 5. L. siphilitica. Pers. 1. c. Gemeine Lobelie. In Wäldern v. Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.
- 6. L. surinamensis. Pere. 1. c. Surinamische Lobelie. Zu Surinam. Sept. Oct. W. H. h.
- 7. L. Erinus. Pers. l. c. 2. p. 214. Langgestielte Lobelie. Am Cap. May Oct. Ch. O.
- 8. L. pubescens. Pers. 1. c. Weichhaarige Lobelie. Am Cap. May — Aug. Ch. 24.
- 9. L. coronopifolia. Pers. l. c. Schlitzblättrige Lobelie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.

602. Hermannia, Hermannie.

- 1. H. althasifolia. Pers. l. c. 2. p. 216. Eibischblättrige Hermannie. Am Cap, wie alle folgende. Apr. — Jul. Ch. h. H. aurea. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 46. t. 214.
 - 2. H. plicata. Pers. 1. c. Gefaltene Hermannie. Apr. Jul. Ch. 5. H. althaeifolia. Jacq. 1. c. 2. p. 46. t. 213.
- 3. H. candicans. Pers. l. c. Weiseblättrige Hermannie. May, Jun. Ch. 5.
- 4. H. disticha. Pers. I. c. Zweyzeilige Hermannie. Apr. Jun. Ch. t. H. rotundifolia. Jacq. 1. c. 1. p. 63. t. 118.

- 5. H. micans. Pers. l. c. Glänzende Hermannie. Apr. Aug. Ch. h. H. latifolia. Jacq. l. c. 1. p. 64. t. 119.
- 6: H. scordifolia. Pers. l. c. Gamanderblättrige Hermannie. Apr. Jun. Ch. h.
- 7. H. denudata. Pers. 1. c. Glatte Hermannie. Apr. — Aug. Ch. b.
- 8. H. disermaefolia. Pers. l. c. Wellenblättrige Hermannie. May Aug. Ch. h.
- 9. H. alnifolia. Pers. 1. c. 2. p. 217. Erlenblättrige Hermannie. May Jul. Ch. 5.
- 10. H. cunsifolia. Pers. l. c. Keilblättrige Hermannie. Apr. May. Ch., h.
- 11. H. kolosericea. Pers. l. c. Sammetblättrige Hermannie. Nov. Dec. u. May — Jul. Ch. b.
- 12. H. hirsuta. Pers. 1. c. Behaarte Hermannie. May, Jun. Ch. t.
- 13. H. scabra. Pers. 1. c. Scharfblättrige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. 5.
- 14. H. multiflora. Pers. l. c. Vielblüthige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. p.
- 15. H. flammea. Pers. 1. c. Feuerfarbige Hermannie. May — Jul. Ch. t.
- 16. H. hyssopifolia. Pers. l. c. Isopblättrige Hermanie. May — Aug. Ch. †;
- 17. H. lavandulaefolia. Pers. l. c. Lavandel. blättrige Hermannie. May Jul. Ch. h.
- 18. H. procumbens. Pers. l. c. Liegende Hermannie. . Ch. h.

19.) Noch unbeschriebene Arten.

603. Mahernia, Mahernie.

- 1. M. pinnata. Pers. l. c. 2. p. 218. Gesiederte Mahernie. Am Cap. May — Aug. Ch. b.
 - 2. M. diffuza. Pers. l. c. Ausgebreitete Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
 - 3. M. incisa. Pers. l. c. Eingeschnittene Mabernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
 - 4. M. odorata, Pers. l. c. Wohlriechende Mahernie. Am Cap. May — Jul. Ch. 5.

604. Melochia, Melochie.

- 1. M. pyramidata. Pers. 1. c. Pyramiden. Melochie. In Brasilien u. auf den Caraibisch. Ins. —. W. H. b.
- 2. M. caracatana. Pers, l. c. 2. p. 219. Caracassche Melochie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. b.

605. Passiflora, Passionsblume.

- 1. P. serratifolia. Pers. l. c. Sägeblättrige Passionsblume. Zu Surinam, Jun. Jul. VV. H. b.
- 2. P. cupres. Pers. 1. c. Knpferfarbige Pass siensblume. Auf Providenze. Jul. Aug. VV. H. h.
- 3. P. maliformis. Pers. l. c. Aepfeltrageude Passionsblume. Auf St. Domingo, Martinique, Jamaica u. Cajenne. Jun. VV. H, \$.

- 4. P. quadrangularis. Pers. 1. c. Viereckige Passionsblume. In Wäldern v. Jamaica, Dec. Jän. u. Jun. Jul. W. H. b.
- 5. P. alata. Pers. l. e. 2. p. 220. Geflügelte Passionsblume. In Westind. Jänn. März. Jul. Ang. W. H. h.
- 6. P. perfoliata. Pers. 1. c. Durchstochene Passionsblume. In Südjamaica am Meeresstrande. Jun. — Aug. W. H. 5.
- 7. P. rubra. Pers. I. c. Rothe Passions blume. In Jamaica, St. Domingo, Martinique u. Cajenne. Jun. Jul. VV. H. b.
- 8. P. lunata. Pers. 1. c. Mondförmige Passion:blume. In Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. VV. H. h.
- 9. P. tuberosa. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 49. t. 496. In Westind. Oct. Nov. W. H. 5.
- 10. P. Vespertilio? Pers. 1. c. Fledermans-artige Passionsblume In Amer. Jun. Jul. W. H. b.
- 11. P. punctata. Pers. l. c. 2.p. 221. Punktirte Passionsblume. In Peru. —. W. H. h.
- 12. P. lutea. Pers. l. c. Gelbe Passionsblume. In Virgin. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. 24.
- 13. P. angustifolia. Pers. l. c., Schmalblättrige Passionsbiume. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. J. P. heterophylla. Ait. hort. kew. 3. p. 309.
- 14. P. minima. Pers. l. c. Kleinste Passionsblume. Zu Curassao. Jun. Jul. W. H. 5.
- 15. P. suberosa. Pers. l. c. Korkstämmige Passionsblume. Auf St. Domingo u. den Antillens Jul. Aug. W. H. h.

- 16. P. peltata. Pers. l. c. Schildblättrige Passionsblume. Auf den Antillen. Jul. Aug. W. H. b.
- 17. P. glauca, Pers. l. c. Grangrüne Passionsblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. W.H. ..
- 18. P. caracasana. Willd. enum. 2. p. 697. Caracassche Passionsblume, ZuCaracas. -. W.H. h.
- 19. P. holosericea. Pers. 1. c. Sammetartige Passionsblume. Auf Veracrux. Jun. Jul. W. H. h.
- 20. P. foetida. Pers. l. c. 2. p. 222. Stinkende Passionsblume. Zu St. Domingo, Martinique u. Curassao. Jul Aug. W. H. O.
- 21. P. ciliata. Pers. l. c. Gefranzte Passionsblume. Zu Jamaica. — W. H. 5.
- 22. P. incarnata. Pers. l. c. Fleischfarbige Passionsblume. In Virgin. Brasilien u. Peru. Jun. — Aug. K. H. 5.
- 23. P. coerulea. Pers. I. c. Gemeine Passionsblume. In Brasilien. Jun. Aug. K. H. b.

 ß. angustifolia. Mit schmäleren Blatteinschnitten.
- P. pedata. Hortulan.
- 24. P. Adiantum, Willd. enum. 2. p. 698. Krullfarn-Passionsblume. —. Jul. WV. H. 5.

606. Erodium, Reiherschnabel.

- 1. E. ciconium. Pers. l. c. 2. p. 224. Langer Reiherschnabel. In Span. Ital. Montpellier wim VValliserland. Jun. Jul. Im F. O.
 - 2. E. moschatum. Pers. 1. c. Bisamduftender Reiherschnabel. In Südeur. Sibir. der Barbarey, Brasilien, Peru u. am Cap. Jun. — Oct. Im F. O.

- 3. E. hirtum. Pers. 1. c. Rauher Reiherschnabel In Aegypt. Jun. Jul. Im F. O.
- 4. E. gruinum. Pers. 1. c. Candischer Reiberschnabel. In Candien, Nordafr. Ital. u. Span. Jun. Aug. Im F. O.
- 5. E. hymenodes. Pers. k. c. 2. p. 225. Dreytheiliger Reiherschnabel. In Felsenritzen des Berges Atlas. Jun. Aug. K. H. 24. E. trilobatum. Jacq. ic. rar. 3. t. 508. Collect. 4. p. 200.
- 6. E. malucoides. Pers. 1. c. Malvenartiger Reiherschnabel. In Südeur. u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Im F. O.
- 7. E. chamaedryoides. Pers. I. c. Niedriger Reiherschnabel. Auf Minorca u. zu Corsica am St. Michaelsberge. Jun. — Sept. K. H. h. Geranium Reichardi. Murr. n. comment. goett. 1780. p. 11. t. 3.

HEPTANDRIA.

607. Pelargonium, Kranichschnabel.

- 1. P. astragalifolium. Pers. l. c. 2. p. 227. Traganthblättriger Kranichschnabel. Ist sammt den meisten folgenden am Cap zu Hause. Jul. Aug. Ch. 24.
 P. pinnatum. Ait. hort. kew. 2. p. 417.
- 2. P. barbatum. Pers. 1. c. Bartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 4.
- 3. P. melananthon. Pers. l. c. Schwarzblüthiger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 4.
- 4. P. rapaceum. Pers. l. c. 2.p. 228. Rübensartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

- 5. P. lobatum. Pers. l. c. Lappiger Kranich-schnabel. Jun. Aug. Ch. 4.
- 6. P. apiifolium. Jacq. eclog. fasc. 2. p. 45t. 27. Epichblättriger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. — Aug. Ch. 5.
- 7. P. triste. Pers. l. c. Trauernder Kranich-schnabel. Jun. Jul. Ch. 24.
- 8. P. sanguineum. Wendl: collect. pl. 2. p. 43. t. 53. Blutiger Kranichschnabel. Am Cap? Iun. Ch. b.
- 9. P. flavum. Pers. I. c. Gelber Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.
 - B. daucoides. Mit möhrenartigen Blättern.
- 10. P. blattarium. Pers. I. c. Königskerzenartiger Kranichschnabel. Iun. Aug. Ch. 24.
- 11. P. tabulare. Pers. I. c. 2. p. 229. Tafelbergs-Kranichachnabel. Jun. Oct. Ch. 24.
- 12. P. alchemilloides. Pers. l. c. Löwenfußblättriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 4.
- 13. P. odoratissimum. Pers. I. c. Wohlriechender Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 4.
- 14. P. fragrans. Willd. hort. berol. 2. p. 77t. 77. Duftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 15. P. grossularioides. Pers. 1. c. Stachel. beerblättriger Kranichschnebel. Jun. Aug. Ch. 2.
- 16. P. ancept. Pers. 1. c. Zweykantiger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 24.
- 17. P. columbinum. Pers. l. c. Tauben-Kranichschnabel. Jun. — Aug. Im F. O.

- 13. P. tricolor. Curt. not. mag. 240. Drey-farbiger Kranichschnahel. Jun. Jul. Ch. 24. Pelarg, violarium. Pers. I. c.
- 19. P. lacerum. Pers. l. c. 2. p. 230. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24. B. longicaule. Mit höherem Wuchse.
- 20. P. coriandrifolium. Pers. l.c. Coriander blättriger Kranichschnäbel. Jun. - Ang. Ch. 4.
- 21. P. glaucum. Pers. l. c. Lanzetblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5
- 22. P. diversifolium. Pers. 1. c. Verschiedenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
- 23. P. betulinum. Pers. 1. c. Birkenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 3.
- 24. P. acetosum. Pers. l. c. Saurer Kranich-achnabel. Jun. Aug. Ch. b.
- 25. P. pumilum. Willd. enum. 2. p. 704. Niedriger Kranichschnabel. May Aug. Ch. 5.
- 26. P. stenopetalum. Pers. l. c. Schmalblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.
- 27. P. hybridum. Pers. l. c. Bastardartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. t).
- 28. P. malvaefolium. Jacp. eclog. ined. Malvenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
- 8. lateritium. Mit ziegelrothen Blüthen. Polarg, lateritium. Wilid. enum. suppl. p. 47.
 - 29. P. zonale. Pers. 1. c. 2. p. 231. Schwarzhemahlter Kranichschnabel. Jun. — Sept. Ch. 5
 - B. marginatum. Mit bemahltem Blattrande.
 - y. floribus albis. Mit weißen Blüthen.

- 30. P. inquinans. Pers. l. c. Beschmutzender Kranichschnabel. Jul. Sept. Ch. b.
- 31. P. heterogamum. Pers. l. c. Rother Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. b.
- 32. P. monstrum. Pers. l. c. Ungestalteter Kranichschnabel. — Jun. — Aug. Ch. b.
- 33. P. peltatum. Pers. 1. c. Schildblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
 - B. foliis aldo marginatis. Mit weißgeränderten Rlättern.
 - 34. P. lateripes. Pers. 1. c. Seitenstieliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.
 - 35. P. tetragonum. Pers. l. c. Vierkantiger Kranickschnabel. Jun. — Aug. Ch. 3.
 - 36. P. cordatum. Pers. l. c. Herzblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.
 - 37. P penicillatum. Willd. hort. berol. 1.p. et 1.37. Büschliger Kranichschnabel. .—. Ch. f.
 - 38. P. conduplicatum. Willd. enum. 2. p. 705. Doppeligezähnter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.
 P. cordifolium. Hortulan.
 - 39. P. cucullatum. Pers. l. c. Kappenförmiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. b.
 - 40. P. Barringtonii. Willd. enum. 2. p. 706. Barrington'scher Kranichschnabel Jul. Aug. Ch. 5.
 - 41. P. angulosum. Pers. 1. c. Eckiger Kitz-nichschnabel. Jun. Jul. Ch. ti

- 42. P. sidaefolium. Willd. 1. c. Sidablättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. h.
- 43. P. speciosum. Willd l. c. Schöner Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. t.
- 44 P. acerifolium. Pers. 1. c. Ahornblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.
- 45. P. beaufortianum. Pers. 1, c. Beaufortischer Kranichschnabel. Jun. —, Aug. Cb. 5.
- 46. P. papilionaceum. Pers. 1. c. Schmetterlingartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.
- 47. P. grandiflorum. Pers. 1 c. Großblüthiger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. h.
- 48. P. Cotyledonis. Pers. l. c. Nabell rautartiger Kranichschnabel. Auf der Ins. St. Helena u. am Cap. Jun. Jul. Ch. h.
- 49. P. cuspidatum. Willd. enum. suppl. p. 47. Zugespitzter Kranichschnahel. Jul. Aug. Ch. b.
- 50. P. amplissimum. Willd. l. c. p. 48. Ansehnlieher Kranichschnabel. Jul.Aug. Ch. b.
- 51. P. sororium. Willd. l. c. Verschwisterter Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. h.
- 52. P. echinatum. Pers. 1. c. e. p. 232. Stachliger Kranichschnabel. Apr. May. Ch. h. Pelarg. hamatum. Aacq. hort. schoenhr. c. p. 7. t. 138.
- 53. P. australe. Pers. l. c. Südlicher Kranichschnabel. In Neuholl. Jun. Aug. -Ch. b.
- 54. P. vitifolium. Pers. 1. c. Weinblättriger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. b.

- 55. P. capitatum. Pers. i. c. Kopfformiger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 3.
- 56. P. glatinosum. Pers. 1. c. Klebriger Kranichschnabel. Jun. Oct. Ch. h.
- 57. P. hispidum. Pers. l. c. Rispenblüthiger Kranichschnabel Jul. Aug. Ch. 5.
- 58. P. tomentosum. Pers. l. c. Filziger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. h.
- 59. P. ribifolium. Pers. l. c. Johannisbeerblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 15.
- 60. P. quercifolium. Pers. l. c. Eichenblättriger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. t.
- 61. P. balsameum. Pers. l. c. Balsamischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. h.
- 62. P. delphinifolium. Willd. enum. 2. p. 708. Ritterspotablättriger Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. †.
- 63. P. Radula. Pers. 1. c. Raspelblättriger Kranichschnabet. Jun. — Aug. Ch. 5.
 - 8. roseum Hortulan. Mit rosendustenden. Blättern.
- 64. P. denticulatum. Pers. l. c. Gezähnelter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 5.
- 65. P. bicolor. Pers. l. c. Zweyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. t.
- 66. P. quinquevulnerum. Pers. 1. c. Füsffleckigen Kranichschnabel: Jun. — Aug. Ch. b.

- 67. P. canariense. Pers. l. c. Canarischer Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 5.
- 68. F. tricuspidatum. Pers. l. c. a. p. 233. Dreyspitziger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. b.
- 79. P. scabrum. Pers. l. c. Scharfblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. te.
- 70. P. rigidum. Pers. l. c. Steifblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. p.
- 71. P. crispum. Pers. I. c. Krauser Kranich-schnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
- 72. P. hermannifolium. Pers. l. c. Hermannienblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. b.
- 73. P. gratum. VVilld. enum. 2. p. 710. Citronendustender Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. 5.
 P. citriodorum. Hortulan.
- 74. P. adulterinum. Pers. l. c. Verschwägerter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 3.
- 75. P. semitrilobum. Pers. 1. c. Halbdrey-Jappiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
- 76. P. tripartitum. Pers. l. c. Dreytheiliger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 方. P. trifidum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 5. t. 133.
- 77. P. fulgidum. Pers. l. c. Schimmender Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 5.
- 78. P. gibbosum. Pers. 1. c. Höckeriger Kranichschnabel. Sept. Oct. Ch. 5.
- 79. P. axstipulatum. Pers. 1. c. Nacktwinkliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. †.

- 80. P. ternatum. Pers. h c. Godreyter Kranichschnabel. Jun. Aug. Ch. b.
- 81. P. incisum. Pers. l. c. Eingeschnittener Kranichschnabel. Jun. --- Aug. Ch. t.
- 82. P. carnosum. Pers. l. c. Fleischiger Kranichschnabel. Jan. Aug. Ch. 5.
- 83. P. crithmifolium. Pers. l. c. 2. p. 234. Bacillenblättriger Kranichschnabel. Febr. Märs. Ch. b.
- P. paniculatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 6. t. 137.
- 84. P. hirtum. Pers. l. c. Behaarter Kranichschnabel. März, Apr. Ch. h. Nebst mehreren andern noch unbeschriebenen Arten.

DECANDRIA.

608. Geranium, Storchschnabel.

- 1. G. sibiricum. Pers. l. c. Sibirischer Storchschnabel. In Sibirien u. China. Jan. Jul. K. H. 4.
- 2. G. sanguineum. Pers. I. c. Bluthrother Storchschnabel. In Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. G. anemonefolium. Pers. l. c. Anemonenblättriger Storchschnabel. Auf Madera. Jun. — Aug. K. H. b.
- 4. G. macrorrhizum, Pers. 1. c. 2. p. 235. Langwurzliger Storchschnabel. In Ital. u. Kärnthen. May, Jun. Im F. 24.
- 5. G. phacum. Pers. l. c. Rothbrauner Storchschnabel. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

- 6. G. lividum. Pers. 1. c. Bläuficher Storchschnabel. In Oesterr. der Schweiz. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.
- 7. G. reflexum. Pers. h e. Zurückgehogener Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.
- 8. G. striatum. Pers. l. c. Gestreifter Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 21.
- 9. G. sylvaticum. Pers. 1. c. Wald Storch-schnabel. Auf Niederalpen an Quellen im nördlicher. Eur. Jun. Aug. Im F. 24.
- 10. G. pratense. Pers. l, c. Wiesen Storchschnabel. Auf Bergwiesen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.
- 11. G. canescens. Pers. I. c. Grauer Storch-schnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
- 12. G. invanum. Pers. l. c. Bestäubter Storck-schnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 21.
- 13. G. pyrenaicum. Pers. I. c. 2. p. 236. Pyrenaischer Storchschnabel. Auf Wiesen in Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 21.
- 14. G. umbrosum. Pers. l. c. Schattenliebender Storchschnabel: In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.
- 19. G. divaricatum. Pers. I. c. Ausgebreiteter Storchschnabel. In Ungarn, Böhmen u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. O.
- 16. G. lucidum, Pers. l. c. Glänzender Storchschnabel. An schattigen Oertern in Eur. Jun. Jul. Im F. Q.

609. Brownea, Brownea.

1. Br. leucantha, Jacq. fragm. bot. p. 26. n. 88. t. 20. et 21. Weisblüthige Brownea. Zu Caracas? —. W. H. b.

DODECANDRIA.

610. Guazuma, Guazuma.

1. G. ulmifolia. Pers. 1. c. 2. p. 238. Rüsterblättrige Guazuma: Auf Südamericanischen Feldern. — W. H. 5. Bubroma Guazuma. Willd. sp. pl. 3. p. 1423. Theobroma Guazuma. Lin. sp. pl. p. 1100.

611. Abroma, Abroma.

1. A. augusta. Pers. l. c. Prächtige Ahroma. In Ostind. Aug. Sept. W. H. t.

612. Monsonia, Monsonie.

1. M. lobata. Pers. 1. c. Gelappte Monsonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

613. Helicteris, Schraubenbaum.

- 1. H. jamaicensis. Pers. l. c. Westindischer Schraubenbaum. Am Meeresstrande zu Jamaica-Jun. Jul. W. H. h.
- 2. H. baruensis. Pers. l. c. 2. p. 230. Baruensischer Schraubenhaum. Auf der Insel Baru u. zu Panama. W. H. h.

614. Sterculia, Stinkbaum.

1. St. Balanghas. Pers. 1. c. Eyförmiger Stinkbaum. In Ostind. — W. H. .. 2. St. platanifolia. Pers. l. c. 2. p. 240. Platanenblättriger Stinkbaum. In Japan u. China. —. Ch. h.

615. Dombeya, Dombeye.

- 1. D. ferruginea. Pers. l. c. Braune Dombeye. Auf der St. Moritzinsel. - . VV. H. b.
- v. D. nivea, Cat. hort. carlsruhan. p. 95. Weisse Dombeye. In Ostind. Jul. Aug. W. H. h.

616. Pentapetes, Pentapetes.

1. P. phoenicea. Pers. l. c. 2. p. 241. Scharlachrother Pentapetes, In Ostind. Jul. Aug. VV. H. O.

POLYANDRIA.

617. Carolinea, Carolinea.

1. C. insignis. Pers. l. c. Ansehnliche Carolinea. In Südamer. zu Veracrux, u. den Inseln Tabago u. Martinique. — W. H. .

618. Bombax, Wollbaum.

- 1. B. pentandrum. Pers. l. c. Funffüdiger Wollbaum. In beyden Ind. —. W. H. t.
- 2. B. Ceiba. Pers. l. c. 2. p. 242. Statker Wollbaum. In Amer, —. W. H. 5.

619. Sida, Side.

- 1. S. carpinifolia. Pers. l. c. Hainbuchenblättrige Side. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jun, — Aug. Ch. t.
- 2. S. rhomb ifolia. Pers. l. c. 2. p. 243. Rautenförmige Side. In Ostind. n. Jamaica. Jun Jul. VV. H. b.
- 3. S. mauritiana. Pers. l. c. 2. p. 245. Flachsblüthige Side. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. b.
- 4. S. Abutilon. Pers. l. c.. Gemeine Side. In beyd. Ind. der Schweiz u. Sibirien, Jun. Jul. Im F. O.,
- 5. S. molissima. Pers. l. c. Weichste Side. In Peruvianischen Wäldern. Jun. Jul. W. H. 5.
- 6. S. cordifolia. Pers. 1. c. 2. p. 246. Herzblättrige Side. In Ostind. ul am Cap. Jun. Jul. VV. H. O.
- 7. S. umbellata. Pers. l. c. Doldenblüthige Side. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. t.
- 8. S. vesicaria. Pers. 1. c. 2. p. 247. Aufgeblasene Side. In Mexico. Apr. Aug. VV. H. 5.
- 9. S. gigantea. Pers. l. c. Riesenartige Side. Zu Caracas Jun. Jul. VV. H. 5.
- 10. S. hastata. Pers. l. c. Spontonblättrige Side. An feuchten Stellen zu Lima u. Mexico. May — Aug. Im F. O.
- 11. S. parviflora. Pers. l. c. Kleinblüthige Side. In Mexico. Jun. — Aug. VV. H. O.
- 12. S. triloba. Pers. l. c. Dreylappige Side. Am Cap. Jun. Ang. Ch. 5.

13. S. Napaca. Cavan, diss. 5. p. 277. t. 132. f. 1. Virginische Side. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24. Napaea laevis. Pers. l. c. 2. p. 242.

620. Malachra, Malachre.

1. M. alceaefolia. Pers. l. c. 2.p. 248. Stockmalvenblättrige Malachre. Zu Caracas. Aug. VV. H. ⊙.

621. Althaea, Eibisch.

- 1. A. officinalis. Pers. I. c. Gemeiner Eibisch. In Ungarn, Holland, Engl. Frankr. Sibirien. Jun-- Aug. Im F. 24.
- 2. A. cannabina. Pers. I. c. 2. p. 249. Hanfblättriger Einisch. An Waldrandern in Oesterr. Ungarn, Languedoc. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. A. rosea. Pers. l. c. Stockrosen Eihisch. Im Orient. Jun. - Aug. Im F. 4. Alcea rosea. Lin. sp. pl. p. 966.
- 4. A. pallida. Pers. I. c. Blassblüthiger Eibisch. In Ungarn. Jul. Aug. Im F. J. Alcea pallida, Waldst, et Kitaib. 1. p. 46, t. 47.

622. Malva, Malve.

- 1. M. scabra. Pers. I. c. 2. p. 250. Scharfastige Malve. In Peru. Jun. Jul. Ch. b.
- 2. M. peruviana. Pers. 1. c. Peruvianische Malve. In Peru. Jun. Im F. O.
- 3. M. umbellata. Pers.l.c. Dolden blüthige Malve. In Mexico. - W. H. b.
- 4. M. abestiloides. Pers. I. c. Sidenartige Mal. ve. Auf den Bahamainseln. Jun. Jul. VV. H. b.

- 5. M. lactes. Pers. l. c. Milchweiße Malve. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 5.
- 6. M. fragrans. Pers. l. c. Wohlriechende Malve. Am Cap. Jul. Oct. Ch. \$.
- 7. M. capensis. Pers. l. c. Capische Malve. Am Cap. Jul. Oct. Ch. t.
- 8. M. virgata. Pers. 1. c. Ruthenformige Malve. Am Cap. Jul. Oct. Ch. 5.
- 9. M. miniata. Pers. 1. c. 2. p. 251. Mennigrothe Malve. In Mexico? Jun. Aug. Ch. t.
- p. 7. t. 139: Rauhe Malve. Am Cap. Jun. Aug. Ch. t.
- 11. M. nicasensis. Pers. l. c. Nicaensische Malve. In Ital. Jun. Jul. Im F. O.
- 12. M. mauritians. Pers. l. c. Mauritanische Malve. In Ital. Portug. u. Span. Jun. Jul. Im F. O.
- 13. M. crispa. Pers. l. c. Krausblättrige Malve. In Syrien. Jun. Jul. Im F. .
- 14. M. Alcea. Pers. l. c. 2. p. 252. Schlitzblättrige Malve. In Ungarn, Deutschl. Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

623. Lavatera, Lavatere.

- 1. L. arborea. Pers. l. c. Baumartige Lavatere. In Ital. Engl. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H.
 - 2. L. micans. Pers. 1. c. Schimmernde Lavatere. In Span. u. Portug. Jun. Jul. K. H. h.

- 3. L. Olbia. Pers. l. c. Olbische Lavatere. Auf der Insel Olbia. Jun. Jul. K. H. tj.
- 4. L. unguiculata. Pers. l. c. Langnägelige Lavatere. — Jul. Aug. K. H. 5.
- 5. L. hispida. Pers. l. c. Büschelhaarige Lavatere. In Nordafr. Jun. Aug. K. H. h.
- 6. L. maritima. Pers. 1. c. Meerstrands-Lavatere. Am Meerstrande in Span. u. Frankr. Jun. Jul. K. H. 5.
- '7. L. thuringiaca. Pers. l. c. Thüringische Lavatere. In Oesterr. Ungarn, Thüringen u. Schweden. Jul. Aug. Im F. 24.
- 8. L. cretica. Pers. l. c. Candische Lavatere. In Candien. Jun. Jul. Im F. O.
 - 9. L. trimestris. Pers. l. c. 2. p. 253. Garten Lavatere. In Syrien, Span. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. O.

624. Ruizia, Ruizie.

1. R. variabilis. Pers. 1. c. Veränderliche Ruizie. Auf der Insel, Bourbon, Jun. Jul. W. H. b.

625. Kitaibelia, Kitaibelie.

1. K. vitifolia. Pers. 1. c. Weinblättrige Kitaibelie. In der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien. Apr. — Jun. Im F. 24.

626. Urena, Urene.

1. U. lobata. Pers. l. c. Lappige Urene. In China. Jul. Aug. Ch. b.

627. Gossypium, Baumwolle.

- 1. G. herbaceum. Pers. 1. c. 2. p. 254. Krantartige Baumwolle. In Ostind. Syrien u. Africa. Jan. Jul. VV H. O.
- 2. G. religiosum. Pers. l. c. Gelbe Baumwolle. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.
- 3. G. barbadense. Pers. l. c. Westindische Baumwolle. In Barbados. Jun. Jul. W. H. b.

628. Hibiscus, Hibiscus.

- 1. H. Moscheutos. Pers. 1. c. Blattstielblüthiger Hibiscus. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.
- 2. H. heterophyllus. Pers. l. c. Neuholländischer Hibiscus, In Neuholl. Apr. May. Ch. b.
- 3. H. palustris. Pers. l. c. Sumpf-Hibiscus. In Virgin. u. Canada. May — Jul. Im F. 2.
- 4. H. papulneus. Pers. 1. c. 2. p. 255. Pappelblättriger Hibiscus. In Ostind. u. den Freundschaftsinseln. Jun. Jul. W. H. 5.
- 5. H. tiliaceus. Pers. 1. c. Lindenblättriger Hibiscus. An Bächen in Ostind. — . VV. H. b.
- '6. H. abutiloides. Willd. enum. 2. p. 736. Grossblättriger Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. h.
 - 7. H. Lampus. Pers. 1. c. Philippinischer Hibiscus. Auf den Philippinischen Inseln. Jul. Aug. VV. H. t.

- 8. H. Rosa-sinensis. Pers. l. c. Rosanartiger Hibiscus. In Ostund May — Sept. W. H. b.
 - 6. floribus plenis rabris. Mit rothgefüllten Blüthen.
 - 7. floribus plenis rubro flavescentibus. Mit rothgelbgefüllten Blüthen.
- 9. H. phoeniceus. Pers. 1. c. Schönrother Hibiscus. In Ostind. Jul. W. H. h.
- 10. H. mutabilis. Pers. l. c. 2. p. 256. Veranderlicher Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. b.
- 11. H. syriacus. Pers. 1. c. Syrischer Hibiscus. In Südeur. u. Syrien. Aug. Sept. Im F. t.
 - 8. floribus albis plenis. Mit weißgefüllten Blüthen.
- 12. H. acerifolius? Hoocker in parad. londin. n. 33. Ahornblättriger Hibiscus. Das Vaterland ist unbekannt, cultivirt findet man ihn in China. Jun. Jul. VV. H. 5.
- 13. H. Sabdariffa. Pers. l. c. Dreytheiliger Hibīscus. In beyden Indien. Jul. Aug. W. H. O.
- 14. H. diversifalius. Pers. l. c. Verschiedenblättriger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. b. H. ficulneus. Cavan. diss. 3. p. 148. t. 51. f. 2.
- 15. H. speciosus. Pers. l. c. Ansehnlicher Hibiscus. In Südearolina. Jun. Jul. VV. H. 4.
- 16. H. cannabinus. Pers. 1. c. Hanfartiger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. Q.
- 17. H. Manihot. Pers. I. c. 2. p. 257. Schwefelfarbiger Hibiscus. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. 5.

- 18. H. Abelmoschus. Pers. l. c. Bisam Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. VV. H. t.
- 19. H. esculentus. Pers. I. c. Essbarer Hibiscus. In beyden Indien. Jun. Jul. W. H. O.
- 20. H. vesicarius. Pers. l. c. 2. p. 258. Aufgeblasener Hibiscus. In Africa. Jun. Jul. Im F. O.
- 21. H. Trionum. Pers. l. c. Stunden-Hibiscus. In Krain, Ital. u. Africa. Jun. Jul. 1m F. O.

629. Pavonia, Pavonie.

- 1. P. praemorsa. Willd. sp. pl. 3. p. 833. Abgebissene Pavonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5. P. cuneifolia. Pers. 1. c.
- 2. P. spinifex. Pers. l. c. Vielstachlige Pavonie. In Sudamer. May, Jun. W. H. h.
- 3. P. Columella. Pers. l. c. 2. p. 259. Fünfeckige Pavonie. Auf der Insel Bourbon. Jul. Aug. W. H. b.

630. Achania, Tuttenmalve.

- 1. A. Malvaviscus. Pers. 1. c. Baumartige Tuttenmalve. Auf Kalkfelsen in Jamaica u. Mezico. Jun. Jul. VV. H. h.
- e. A. mollis. Pers. 1. c. Weiche Tuttenmalve. In Amer. Jul. Sept. W. H. h.

631. Lagunea, Lagunea.

Lagunez. Auf der Insel Nordfolk. Jul. Aug. Ch. t. Hibiscus Patersonius. Andrews bot repos. t. 286.

632. Camellia, Camellie.

- 1. C. japonica. Pers. l. v. 2. p. 260. Japanische Camellie. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. b.
 - 8. floribus rubris plenis. Mit rothgefüllten Blüthen.
 - 7. floribus, albis Mit weißgefüllten Blüthen
 - 3. floribus variegatis. Mit bunten Blathen.

633. Inga, Inge.

- 1. I. dulcis. Willd. sp. pl. 4. p. 1005. Süsse Inge. Auf den Philippinischen Inseln u. zu Coromandel. —. W. H. b. Mimosa dulcis. Pers. l. c. 2. p. 262.
- 2. I. Unguis cati. VVilld. l. c. 4. p. 1006. Katzenklauen Inge. In Jamaica u. den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. VV. H. t. M. Unguis Cati. Pers. l. c.
- 3. I. foetida, Willd. L. c. 4. p. 1008. Stinkende Inge. In Westind. Jun. Jul. W. H. h. M. foetida. Pers. l. c.
- 4. I. alba. Willd. l. c. 4. p. 1013. Weisse Inge. Zu Cajenne. Jun. Sept. W. H. b. M. alba. Pers. l. c. 2. p. 261.
 - 5. I. latifolia. Willd. l. c. 4. p. 1020. Breitblättrige Inge. In Westind. —. W. H. th.
 M. latifolia. Pers. l, c. 2. p. 262.
- 6. I. Saman. Willd. l. c. 4. p. 1024. Saman-Inge. Zu Caracas. —. W. H. h.
 M. Saman Jacq. fragm. bot. p. 5. t. 6.

634. Mimosa, Sinnpflanze.

- 1. M. sensitiva. Pers. l. c. 2. p. 262. Empfindliche Simpflanze. In Brasilien. Jul. Sept. W. H. h.
- .. 2. M. pudica. Pers. l. c. Gemeine Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. Aug. W. H. O.

635. Desmanthus, Buschelzopf.

- 1. D. plenus. Willd. sp. pl. 4. p. 1045. Gefüllter Büschelzopf. Auf Veracrux. Jal. Aug. W. H. O. Mimosa plena. Pers. l. c. 2. p. 263.
- 2. D. virgatus. Willd. l. c. 4. p. 1047. Ruthenförmiger Büschelzopf. In Ostind. Jun. Aug. W. H. h.
 M. virgata. Pers. l. c.

636. Acacia, Acacie.

- 1. A. verticillata. Willd. sp. pl. 4. p. 1049. Wirtelblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. März. Ch. h. Mimosa verticillata. Pers. l. c. 2. p. 261.
- 2. A. juniperina. Willd. l. c. Wachholder blättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. b. M. juniperina. Pers. l. c.
- 3. A. suaveolens. Willd. I. c. 4. p. 1050. Wohlriechende Acacie. In Neuholl. . Ch. b. M. suaveolens. Smith act. societ. lin. lond. 1. p.253.
- 4. A. floribunda. Willd. 1. c. 4. p. 1051. Vielblumige Acacie. In Neuholl. März, Apr. Ch. b. M. floribunda. Pers. 1. c.

- 5. A. dodonacifolia: Decand. cat. hort. bot. monspel. p. 1. Klebrige Acacie. In Neuholl. . Ch. 5.

 M. Dodonacifol. Pers. l. c.
- 6. A. stricta. Willd. l. c. 4. p. 1052. Steile Acacie. In Neuholl. —. Ch. t. . M. stricta. Pers. l. c.
- 7. A. longifolia. Willd. l. c. Langblättrige Acacie. In Neuholl. März May. Ch. t. M. longif. Pers. l. c.
- 8. A. fulcata. Willd. l. c. 4. p. 1053. Sichel-blättrige Acacie. In Neuholl. —. Ch. b. M. ogliqua? Pers. l. c.
- 9. A. paradoxa. Decand. cat. hort. bot. monsp. p. 1. Wunderbare Acacie. In Neuholl.—. Ch. h.
 Mimosa parad. Hortulan.
- 10. A. heterophylla. Willd. I. c. 4. p. 1034. Verschiedenblättrige Acacie. Auf der St. Moritzinsel. —. Ch. t. M. heteroph. Pers. l. c.
- 11. A. diptera. Humboldt et Bonpland. Willd. enum. 2. p. 1051. Zweygetheilte Acacie. In Südamer. W. H. 5
- 12. A. Julibrissin. Willd. sp. pl. 4. p. 1065. Orientalische Acacie. Im Orient. — . W. H. b. M. Julibrissin. Pers. l. c. 2. p. 264. M. arborea. Hortulan.
- 13. A. speciosa. Willd. l. c. 4. p. 1066. Ansehnliche Acacie: In Ostind, Jul. Aug. W. H. 5. M. speciosa. Pers. l. c.

- 14. A. caracasana. VVilld. l. c. 4. p. 1068. Caracasanische Acacie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. b.
 M. caracas. Pers. l. c.
- 15. A. portoricensis. Willd. l. c. 4. p. 1669.
 Portorico'sche Acacie. Auf der Insel Portorico.

 —/. W. H. 5.
 M. portoric. Pers. l. c.
- 16. A. divaricata. Willd. l. c. 4. p. 1070. Ausgebreitete Acacie. In Westind. . W. H. b. M. divaric. Pers. l. c.
- 17. A. lophantha, Willd. l. c. Büschelblüchige Acacie. In Neuholl. März. Apr. Ch. t. M. lophantha. Pers. l. c.
- 18. A. filicina. Willd. l. c. 4. p. 1672. Farrenkrautartige Acacie. In Mexico. —. W. H. h. A. filicoides. Pers. l. c. 2. p. 264.
- 19. A. grandiflora. Willd. l. c. 4. p. 1074. Großblumige Acacie. In Ostindien. —. W. H. t. M. grandiflora. Pers. l. c. 2. p. 263.
- 20. A. glauca. Willd. l. c. 4. p. 1075. Eisengraue Acacie. Im wärmer. Amer. Jun. Sept. W. H. h.
 M. glauca. Pers. l. c. 2. p. 265.
- 21. A. cornigera. Willd. l. c. 4. p. 1080. Hörnertragende Acacie. In Mexico u. Cuba. —. W. H. b. M. cornig. Pers. l. c.
- 22. A. eburnea. Willd. l. c. 4. p. 1081. Elfenbeinerne Acacie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. t. M. eburnea. Pers. l. c.

- 23. A. horrida. Willd. 1. c. 4. p. 1082. Stark-dornige Acacie. In Africa. Jun. Aug. W. H. b. M. hotrida. Pers. 1. c. M. leucacantha: Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 75. t. 393.
- 24. A. tortuosa. Willd. 1. c. 4. p. 1083. Gedrehte Acacie. Auf Sandfeldern in Jamaica. Jun. Sept. W. H. h.
 M. tortuosa. Pers. 1. c.
- 25. A. farnesiana. Willd. 1. c. Farnesische Acacie. In St. Domingo. Jun. Sept. W. H. b. M. farnesiana. Pers. 1. c.
- 26. A. vera. Willd. I. c. 4. p. 1085. Aechte Acacie. In Aegypten. —. W. H. 5. M. nilotica. Pers. 1. c.
- 27. A. acanthocarpa. Willd. enum. 2. p. 1057. Stachelfrüchtige Acacie. . W. H. b.. M. aculeaticarpa. Pers. I. c. 2. p. 266.
- 28. A. pennata. Willd, sp. pl. 4, p. 1090. Federformige Acacie. Auf Ceylon. . W. H. b. M. pennata. Pers. l. c.
- 29. A. tamarindifolia. Willd. l. c. 4 p. 1092. Tamarindenhlättrige Acacie. Zu Martinique u. Caracas. Jul. Aug. W. H. H. M. tamarindifolia. Pers. l. c. 2. p. 267.
- 30. A? quadrangularis, Cujus? Aus dema jardin des plantes von Paris.
- 31. A? undulata. Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.
- 32. A? Aus dem Fürstlich Esterhazyschen Garten von Eisenstadt.

CLASSIS XVII.

J. DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

637. Corydalis, Helmblume.

- 1. C. nobilis. Pers. 1. c. 2. p. 269. Schöne Helmblume. In Sibirien. Jun! Jul. Im F. 2. Fumaria nobilis. Lin. syst. veg. p. 529.
- 9. C. bulbasa, Pers. l. c. Knollige Helmblume. In Eur. Sibirien u. Kamtschatka. May Jul. Im F. 24.
 Fumaria bulbasa. Lin., mat. med. 168.
- 3. C. Capnoides. Pers. l. c. 2. p. 270. Weiße Helmblume. In der Schweiz, Frankr. Ital. u. Kraiu. May, Jun. Im F. 2. Fumaria Capnoides. Lin. sp. pl. p. 984.

OCTANDRIA.

638. Polygala, Polygale,

- 1. P. myrtifolid. Pers. l. c. 2. p. 273. Myr. tenblättrige Polygdle: Am Cap. Jun. Aug. Ch. 5.
- 2. P. spinosa. Pers. i. c. Stachlige Polygale. Am Cap. Jun. Ch. 5.
- 3. P. Chamaebuxus. Pers. 1. c. Oesterreichische Polygale. Auf Bergeh in Oesterr. Deutschl. n. der Schweiz. Apr. May! Im F. 5.

DECANDRIA.

639. Nissolia, Nissolie.

1. N. fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 276. Strauchartige Nissolie. In Wäldern zu Carthagena in Amer. Jul. W. H. b.

640. Erythrina, Corallenbaum.

- 1. E. herbacea. Pers. l. c. 2. p. 279. Krautartiger Corallenhaum. In Carolina u. Florida. Jun-Ch. 24.
- 2. E. Corallodendrum. Pers. l. c. Gemeiner Corallenbaum. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. h.
- 3. E. velutina, Pers. 1. c. Sammartiger Corallenbaum. Zu Terrafirma, -. W. H. h..
- 4. E. mitis. Pers. l. c. Wehrloser Coralienbaum. Zu Caracas. May. W. H. h.
- 5. Eine noch unbeschriebene Att aus dem jardin des plantes von Paris.

- 641. Rafnia, Rafnie.

1. R. retusa. Pers. l. c. 2. p. 280. Zurückgebogene Rafnie. In Neuholl. —. Ch. 5.

642. Crotalaria, Klapperschote.

1. Cr. verrucosa. Pers. l. c. 2. p. 284. Vierkantige Klapperschoter Zu Malabar, Zeylon, Java u. den Philippinischen Inseln. Jun. Jul. W. H. O.

- 2. Cr. incanescens. Ait.hort. kew.3.p. 20. Grauästige Klapperschote. Am Cap, auf der St. Moritzu. Bourboninsel. Jun. — Oct. Ch. b. . C. arborescens. Pers. 1. c. 2. p. 285.
- 3. Cr. purpurascens. Pers. 1. c. Purpurtothe Klapperschote. Auf den Inseln Madagascar u. St. Moritz. Jun. Aug. W. H. h.

643. Spartium, Pfriemen.

- 1. Sp. junceum. Pers. I. c. 2. p. 286. Binsenattige Pfriemen. In Südeur. May, Jun. Im F. t.
- 2. Sp. sphaerocarpon. Pers. 1. c. Rundfrüchtige Pfriemen In Südeur. Jun. Jul. K. H. h.
- 3. Sp. cinereum. Pers. 1. c. Graue Phiemen. Zu Dauphine. May — Jul. Im F. 5.
- 1. Sp. Scorpius. Pers. l. c. Dornige Pfriemen. In Spanien u. Languedoc. May Jul. K. H. b.
- 5. Sp. linifolium. Pers. 1. c. 2. p. 287. Flacksblättrige Pfriemen. In Südfrankr. Spanien, der Barbarey u. dem Orient. May — Jul. K. H. t. Genista linifolia. Lin. sp. pl. p-405.
- 6. Sp. scoparium. Pers. 1. c. Gemeine Pfriemen. In Deutschl. der Schweizu. in Frankr. Jun. Jul. Im F. b.
- 7. Sp. radiatum. Pers. l. c. Gestrahlte Pfriemen. In Krain, Ital. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. 5.
- 8. Sp. ferox. Pers. 1. c. Wilde Pfriemen. In der Barbarey. März, Apr. K. H. h.
- . 9. Sp. spinosum. Pers. I. c. Starkdornige Pfriemen. In Span. Ital. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. 5.

644. Genista, Ginster.

- 1. G. candicans. Pers. l. c. Weisslicher Ginster. In Ital. u. Montpellier. Jul. Aug. K. H. 5.
- 2. G. sagittalis. Pers. l. c. Gefingelter Ginster. In dürren Waldgegenden v. Oesterr. Deutschl. u. Frankreich. Jun. Im F. b.
- 3. G. tinctoria. Pers. l. c. Farbender Ginster. ... In Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. h.
- 4. G. sibirioa. Pers. l. c. 2. p. 288. Sibirion scher Ginster. In Sibirion Jun. Jul. Im F. h.
- 5. G. florida. Pers. 1. c. Vielblühender Ginster. In Spanien. Inn. Aug. K. H. h.
- 6. G. pilosa. Pers., l. c. Haariger Ginster. In Deutschl. u. Languedoc auf sonnigen Bergen. May. Jun. Im F. h.
- 7. G. anglica. Pers. l. c. Englischer Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. 3.
- 8. G. germanica. Pers. l. c. Deutscher Ginster. In Wäldern v. Deutschl, u. Frankr. Jun. Jul. Im F. h.

645. Ulex, Hecksame.

1. U. europaeus, Pers. l. c. 2. p. 289. Europäischer Hecksame. In Deutschl. England, Frankr. Dännemark u. Brabant. May, Jun. K. H. h.

646. Quonis, Hauhechel.

1. O. fruticosa. Pers. l.c. 2 p. 292. Strauchartige Hauhechel. In der Dauphine. Jun. Jul. K. H. 1.

·647. Anthyllis, Wollblume.

- Wollblume. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. Im F.O.
- 2. A. Vulneraria. Pers. 1. c. Gemeine Wollblume. Auf Wiesen im Mitteleur. May, Jun. Im F. 21.
 - 3. A. montana. Pers, l.c. Berg Wollblume. In Oesterr. Krain, der Schweiz, Languedoc uder Provence. Jun. Jul. Im F. 24
 - 4. A. Barba Jovis. Pers. 1. c. 2. p. 293. Silberblättrige Wollblume. In Italien, Span. u. im Orient. Jun. Ang. K.-H. 5.
 - 5. A. Hermanniae. Pers. l. c. Flachsblättrige Wollblume. In Griechenland, Candien u. Palästina Jun. Jul. K. H. h.

648. Lupinus, Feighohne.

- 1. L. varius. Pers. l. c. 2. p. 294. Bunte Feigbohne. Zu Montpellier. Jun. - Aug. Im F. O.
- 2. L. h.rsutus. Pers. l. c. Rauhe Feigbohne. In der Barbarey, dem Archipelagischen Inseln u. Spanien. Jun. Jul. Im F. Q.
- 3. L. luteus. Pers. l. c. Gelbe Feigbohne. In Sicilien. May - Jul. Im F. 3:
- J. L. arboreus. Pers. L. c. Baumartige Feigbohne, Jun. Jul. Ch. b.

649. Amorpha, Unform.

form. In Carolina. Jul. Im F. h.

2. A. pubescens: Pers. l.c. Haarige Unform. In Carolina. Jul. Im F. 24.

650. Abrus, Paternostererbse.

1. A. precatorius. Pers. 1. c. 2. p. 295. Gemeine Paternostererbse. In Ostind, Jun. Jul. W. H. h.

651. Dolichos, Faseln.

- 1. D. Lablab. Pers. 1. c. 2. p. 296. Aegyptische Faseln. In Aegypten u. Ostind. Jul. Aug. Im F. O.
- 2. D. sinensis. Pers. 1. c. Chinesische Faseln. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. O.
- 31 D. lignosus. Persi l. c. 2. p. 298. Holziga Faselui. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5. 11

652. Glycine, Glycine.

- 1. Gl. clandestina. Pers. 1. c. 2. p. 299. Heimlichblühende Glycine. In Neuholl, Jul. Aug. Ch. p.
- Paternosterartige Glycine. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.
 Gl. tomentosa. Hortulan.
- bische Glycine. Auf den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. W. H. h.
- 4. Gl. rubicunda, Curt. bot. mag. 268. Dunkelrothe Gly ine. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. ty. Sennedia rubicunda. Pers. 1. c. 2. p. 302.

- 5. Gl. coccinea. Curt. bot.msg. 270. Scharlachrothe Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. b. Kennedia coccinea. Pers. l. c.
- 6. Gl. Apios. Pers. 1. c. 2. p. 301. Knollige Glycine. In Virgin. Aug. Im F. 4.
- 7. Gl. frutescens. Pets. l. c. Strauchartige Glycine. In Carolina. Aug. Im F. t.
- 8. Gl. bimaculata. Curt. bot. mag. 263. Zwey-fleckige Glycine. In Neuholl. Jun. Aug. Ch. b. Kennedia monophylla. Pers. l. c. 2. p. 302.

653. Orobus, Walderbse.

- 1. O. lathyroides. Pers. l. c. 2. p. 303. Sibirische Walderbse. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. O. vernus. Pers. l. c. Frühlings- Walderbse. In Hainen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F.2.
- 3. O. albus. Pers. 1. c. Weisse Walderbse. In Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jun. Aug. Im F. 24.

654. Lathyrus, Platterbse.

- 1. L. odoratus. Pers. l. c. 2. p. 304. Wohlriechende Platterbse. In Sicilien u. Ceyton. Jun-Jul. Im F. O.
 - 2. L. tingitanus. Pers. l. c. Africanische Platterbse. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Im F.O.
- 3. L. tuberosus. Pers. 1. c. 2. p. 305. Knollige Platterbse. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.
- 4. L. latifolius. Pers. 1. c. Breitblättrige Platterbse. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. L. heterophyllus. Pers. 1. c. Verschiedenblättrige Platterbse. Am Fusse der Berge in Eur-Jun. — Aug. Im F. 24.

655. Cytisus, Bohnenbaum.

- 1. C. Labarnum, Pers. 1. c. 2. p. 309. Germeiner Bohnenbaum. In der Schweiz, Savoyen u. Frankr. May, Jun. Im F. h.
- 2. C. alpinus. Willd. enum. 2. p. 767. Alpen-Bohnenbaum. In Schottland, Savoyen u. Ungarn, Jun. Jul. Im F. h.
 Cytis, Laburnum & Iatifolium, Pers. I. c.
- 3. C. nigricans. Pers. 1. c. Schwärzlicher Bohnenbaum. In Oesterr. Ungarn, Böhmen u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. b.
- 4. C. sessilifolius. Pers. I. c. 2. p. 310. Italienischer Bohnenbaum. In Italien n. der Provence. Jun. Jul. Im F. 5.
- 5. C. wolgaricus. Pers. I. c. Wolgarischer Bohnenbaum. Auf trockenen Hügeln an der Wolga, Jun. Jul. Im F. ty.
- 6. C. Cajan. Pers. I. c. Indischer Bohnenbaum. In Ostind. Jun. - Aug. W. H. h.
- 7. C. capitalus. Pers. 1. c. Kopfförmiger Bohnenbaum. In Oesterr. Sicil. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. h.
- 8. C. austriacus. Pers. l. c. Oesterreichischer Bohnenbuum. In Oesterr. Ital. u. Sibirien. Jun-Jul. Im F. p.
- 9. C. purpureus. Pers. I. c. Parpurrother Bohnenbaum. In Krain. Krontien.u. Frianlauf sonnigen Höhen, Jan. Jul. Im F. b.

- 10. C. elongatus. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. p. 200. t. 183. Banatischer Bohnenbaum. In Wäldern der Beregher Gespannschaft u. im Banat. Apr. May. Im F. 5.
- 11. C. supinus. Pers. I. c. Niedriger Bohnenbaum. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Iul. Im F. 3.
- 12. C. biflorus. Pers. 1 c. Zweyblumiger Boknenbaum. In Ungarn. Apr. May. Im F. 5.

656, Robinia, Robinie.

- 1. R. Pseudacacia, Pers. I.c.2.p. 311. Gemeine Robinie. (Acacie). In Nordamer. May, Jun. Im F. 1.
 - 8. inermis. Mit stachellosen Aesten.
- 2. R. umbraculifera. Dumont Cours. le botcultiv. 6. p. 140. Schattenbringende Robinie. —. —. Im F. b.
- 3. R. viscosa. Pers. l. c. Klebrige Robinie. Auf den höchsten Bergen in Südcarolina. Jun. Im F. 5.
- 4. R. hispida. Pers. l. c. Borstige Robinic. In Carolina, Florida, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. h.
- 5. R. Caragana. Pers. l. c. 2. p. 312. Sibirische Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. 5.
- 6. R. Altagana. Pers. 1. c. Sand Robinie. Auf sandigem Boden in Davurien. —. Im F. t.
- 7. R. jubata. Pers. l. c. Mähnenartige Robinie. In Sibirien am See Baical. —. Im F. h.
- 8. R. spinosa. Pers. l. c. Dornige Robinie. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. b.

- 9. R. Halodendron, Pers. l. c. Graue Robinie. In Sibirien. May. Im F. b.
- 10. R. Chamlagu. Pers. I. c. Glänzende Robinie. In China. -. Ch. b.
- 11. R. frutescens. Pers. l. c. Strauchartige Robinie. In Sibirien u. der Tartarey. May, Jun. lm F. h.
- 12. R. pygmaea. Pers. l. c. Niedrige Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. 5.
- 13. R. sophorifolia. Cujus? Stammt aus Französischen Baumschulen.

657. Colutea, Blasenstrauch.

- 1. C. arborescens. Pers. l. c. Baumartiger Blasenstrauch. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.
- 2. C. sruenta. Ait. hort. kew. 3. p. 55. Rother Blasenstrauch. In Suddeutschl, Ital. Taurien u. im Orient. Jun. Im F. 5.
 C. orientalis. Pers. l. c.
- 3. C. Pocockii. Pers. l. c. Aleppischer Blasenstrauch. Im Orient. Jun. Jul. Im F. b. C. halepica. Lam. encycl. 1. p. 349.
- 4. C. frutescens. Pers. l. c. Grauer Blasenstrauch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ty.
- 5. C. herbacea. Pers. 1. c. 2. p. 313. Krautartiger Blasenstrauch. Am Cap. Jun. Aug. Im F. O.

658. Glycyrrhiza, Süfsholz.

A. Gl. echinata. Pers. L.c. Stachliges Süßsholz. In Ungarn an der Theils, Apulien auf dem Berge Gargano u. der Tartarey. Jul. Im F. 24.

- 2. Gl. fostida. Pers. 1. c. Stinkendes Süssholz. Auf dem Bergo Atlas u. den Heiden bey Mayenne. in Frankr. Jul. Im F. 4.
- 3. Gl. glabra, Lin. sp. pl. p. 1046. Gemeines Süßholz. In Frankr. Ital. u. Spanien. Jul. Im F. 4. Liquiritia officinalis, Pers. 1. c.

659. Coronilla, Peltschen.

1. C. aculeata. Willd. sp. pl. 3. p. 1147. Stachlige Peltschen. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. W. H. O.

Sesbania aculeata. Pers. 1. c. 2. p. 316. Aeschinomene bispinosa. Jacy. ic. rar. 3. t. 564.

- 2. C. Emerus. Pers. l. c. 2. p. 315. Scorpions. Peltschen. In Oesterr. Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. b.
- 3. C. valentina. Pers. I. c. 2. p. 316. Valentinische Peltschen. In Spanien u. Italien. Jun. Aug. K. H. h.
- 4. C. cretica. Pers. l. c. Candische Peltschen. In-Candien. Jun. Jul. Im F. O.
- 5. C. securidaca. Pers. l.c. Beilkrautartige Peltschen. In Dalmat. Ital. y. Spanien. Jun. Jul. Im F. O.

660. Hippocrepis, Pferdehufschote.

- 1. H. balearica. Pers. 1. c. 2, p. 315. Strauchartige Pierdehusschote. Zu Minorca. Jul. Aug. K. H. h.
 - 661. Aeschynomene, Schampflanze.
- 1. A. aristata. Pers. 1. c. 2. p. 310. Gegrannte Schampflanze. Auf den Inseln St. Domingo u. St. Crux. Jän. — März u. Aug. Sept. W. H. h.

662. Hedysarum, Hahnenkopf,

- 1. H. triquetrum? Pers. 1. c. 2. p. 319. Drey-kantiger Hahnenkopf. In Ostind. W. H. t.
- 2. H. Vespertilionis. Pers. 1. c. Zweylappiger Hahnenkopf. In Cochinchina, Jun. Jul. W.H. ..
- 3. H. gyrans. Pers. l. c. 2. p. 321. Beweglicher Hahnenkopf. In Bengalen am Ganges, Jul. W. H. 5.
- 4. H. frutescens. Lin. sp. pl. p. 1055. Strauchertiger Hahnenkopf. In Virgin. u. Carolina. K. n. h.
 Leopedeza fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 318-
- 5. H. uncinatum. Pers. 1. c. 2. p. 323. Hackenförmiger Hahnenkopf. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. b.
- 6. H. coronarium. Pers. l. c. Italienischer Hahnenkopf. Auf Wiesen in Italien. Jan. Jul. Im F. 24.
- 7. H. Onobrychis. Pers. l. c. 2. p. 324. Futter-Hahnenkopf. (Esparsette). Auf Hügeln in Deutschl. Böhmen, England u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

663. Indigofera, Indigo.

- 1. 1. pseraloides. Pers. l. c. 2. p. 326. Psoralienariger Indigo. Am Cap. Jun. Aug. Ch. 5.
- 2. I. cytisoides. Pers. l. c. s. p. 327. Bohnenbaumartiger Indigo. Am Cap. Jun. Jul. Ch. t.
- 3. I. Anil. Pers. l. c. 22p. 328. Sichelfrüchtiger Indigo. In Ostind. Jun. Jul. W. H. h.

4. I. tinctoria. Pers. 1. c. Färber-Indigo. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. h.

664. Galega, Geisraute.

- 1. G. efficinalis. Pers. L. c. 2. p. 330. Gemeine Geisraute. In Deutschl. der Schweiz, Italien, Spanien u. Nordafrica. Jun. — Aug. Im F. h.
- 2. G. orientalis. Pers. l. c. Orientalische Geisraute. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. G. caribaca. Pers. l. c. Westindische Geisraute. Auf den Caraibischen Inseln. Jul. Aug. W. H. h.

665. Astragalus, Traganth.

- 1. A. Onobrychis, Pers. l. c. 2. p. 336. Langfahniger Traganth. In Oesterreich, Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Sept. Im F. 24.
- 2. A. glycyphyllos. Pers. l. c. 2. p. 338. Süßblättriger Traganth, In Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.
- 3. A. Cicor. Pers. l. c. Kichernartiger Traganth. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Italien u. Russland. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. A. galegiformis. Pers. 1. c. Geisrauterartiger Traganth. In Sibirien u. im Orient. Jun. Im F. 24.
- 5. A. virescens. Ait.hort. kew. 3. p. 73. Grünlicher Traganth. In Sibirien, Armen. u. Nordafr. May, Jun. Im F. 24.
 A. falcatus & virescens. Pers. l. c. 2. p. 339.

- 6. A. alopecuroides. Pers. 1. c. s. p. 340. Fuchsschwanzartiger Traganth. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 7. A. Tragacantha. Pers. 1. c. 2. p. 341. Gemeiner Traganth. In Istrien, Dalmatien, Arragonien, Südfrankr. Sicilien u. der Barbarey. Aug. Oct. K. H. 24.

666. Psoralea, Psoralea.

- 1. Ps. pinnata. Pers. l. c. 2. p. 346. Gesiederte Psoralea. An Bächen am Cap. Jul. Aug. Ch. b.
- 2. Ps. odoratissima. Pers. l. c. Wohlriechen. de Psoralea. Am Cap. May, Jun. Ch. t.
- 3. Ps. verrucosa. Pers. 1: c. Warzige Psoralea. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. 5. Ps. angustifolia. Jacq. hort. schoenbr. 2.p. 53.t. 226.
- 4. Ps. bracteata. Pers. l. c. Punktirte Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 5. Ps. aphylla. Pers. l. c. Blattlose Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
- 6. Ps. hirta. Pers. l. c., Rauhe Psoralea. Am Cap. Jnn. Jul. Ch. t.
- 7. Ps. bituminosa. Pers. l. c. 2. p. 347, Harzige Psoralea. Auf Hügeln am Meere in Ital. Sicilien u. Languedoc. Jun. Jul. K. H. b.
- 8. Ps. glandulosa. Pers. l. c. Drüsige Psoralea. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 9. Ps. palaestina. Pers. I. c. Palästinische Psoralea. In Palästina. Jul. Ang. Ch. 5.

10. Ps. americana. Pers. l. c. Maderische Psoralea. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. p.

667. Lotus, Schotenklee.

- 1. L. tetragonolobus, Pers. l. c. 2. p. 355. Spargel - Schotenklee. Auf Hügeln in Sicilien. Jun. — Aug. Im F. O.
- 2. L. edulis. Pers. l. c. Geniessbarer Schotenklee. In Ital. Sicilien, Span. u. Candien. Jun.

 Aug. Im F. O.
- 3. L. jacobaeus. Pers. l. c. Schwarzer Schotenklee. Auf der St. Jacobsinsel. Jul. Aug. Ch. 24.
- 4. L. hirsutus. Pers. 1. c. 2. p. 354. Zottiger Schotenklee. In Ital. Languedoc. u. im Orient. Jan. Jul. K. H. h.

668. Medicago, Schneckenklee.

1. M. arborea. Pers. l. c. 2. p. 356. Baumartiger Schneckenklee. Zu Rhodes u. Neapel. Jun. — Sept. K. H. h.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

AEQUALIS.

669. Arnopogon, Schafsbart.

1. A. Dalechampii.Pers. 1. c. 2. p. 360. Dalechampischer Schafsbart. In Dalmatien, Italien. a. Span. May, Jun. K. H. 4.

670. Sonchus, Gänsedistel.

- 1. S. fruticosus. Pers. l. c. 2. p. 369. Strauchartige Gänsedistel. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. Jul. K. H. h.
- 2. S. hispanicus. Pers. 1. c. Spanische Gänsedistel. In Spanien bey Malaga. Jun. Jul. Im F.O.
- 3. S. tingitanus. Lam. encycl. 3. p. 383. Tunetanische Gänsedistel. Auf Felsen am Meere in der Barbarey. Jun. Jul. Im F. O. Pieridium tingitanum. Pers. 1. c. 2. p. 362.
 - 4. S. macrophyllus. Willd. sp. pl: 3, p.1510. Grofsblättrige Gänsedistel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4. S. canadensis. Pers. l. c. 2. p. 363.
 - 5. S. alpinus. Pers. l. c. Alpen Gänsedistel. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Krain, Italien, Frankr. England, Schweden, Norwegen u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

671. Prenanthes, Hasenlattich.

1. Pr. purpurea. Pers. l. c. 2. p. 365. Purpurrother Hasenlattich. Auf Berghainen in Deutschlder Schweiz u. Italien. Jun. Jul. Im F. 4.

672. Hieracium, Habichtskraut.

1. H. alpinum. Pers. l. c. 2. p. 370. Alpen-Habichtskraut. Auf Alpen in Oesterr. Lappland, England, der Schweiz u. auf dem Berge Brocken. Jun. — Aug. Im F. 4.

- 2. H. eurantiacum. Pers. l. c. 2. p. 371. Pomeranzeniarbiges Habichtskraut. In Oesterr. Steyerm. Schlesien, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. H. fruticosum. Pers. l. c. 2. p. 375. Stranchartiges Habichtskraut. Zu Madera? Jun. Jul. Ch. b.

673. Crepis, Pippau.

1. Cr. rubra. Pers. 1. c. Rother Pippau. In Dalmatien u. Apulien. Jul. Im F. O.

674. Andryala, Wolldistel.

1. A. lanata. Lin. sp. pl. p. 1137. Weishaarige Wolldistel. In Südeur. Jun. Jul.K. H. 24. Hieracium verbascifolium. Pers. l. c. 2. p. 374.

675. Catananche, Zwangkraut.

2. C. coerulea. Pers. l. c. 2. p. 379. Blaues Zwangkraut. Zu Languedoc u. Nordafrica. Jun. Jul Im F. O.

676. Scolymus, Golddistel.

1. Sc. maculatus. Pers. 1. c. 2. p. 380. Gefleckte Golddistel. In Ital. zu Languedoc u. in Nordafrica. Jun. Jul. Im F. O.

677. Carthamus, Saflor.

1. C. tinctorius. Pers. 1. c. Gemeiner Saftor. In Aegypten u. Ostind. Jun. Jul. Im F. O.

2. C. lanatus. Pers. l. c. Wolliger Saslor. In Oesterr. Ungarn, Krain, der Schweiz, Ital. Frankr. u. Candien auf Heiden. Jun. Jul. Im F. O.

678. Carlovizia, Carlovizie.

1. C. salicifolia. Moench. method. pl. suppl. p. 225. Weidenblättrige Carlowizie. Zu Madera-Jul. Aug. Ch. 5.
Cartham? salicifol. Pers. l. c. 2. p. 381.

679. Carduus, Distel.

- 1. C. marianus. Pers. l. c. 2. p. 386. Marin on -Distel. In Eur. Jul. Aug. Im F. O.
- 2. C. mollis. Pers. l. c. Weiche Distel. Auf Bergen in Oesterr. u. bey Montpellier. May, Jun. Im F. 24.

680. Cnicus, Kratzkraut.

- 1. Ca. rivularis. Willd. sp.pl.3.p. 1676. Back-Kratzkraut. Auf feuchten Wiesen in Oesterr. u. Ungarn. Jun. Im F. 24. Carduus rivul. Pers. 1. c. 2. p. 388.
- 2. Cn. afer. Willd. l. c. 3. p. 1682. Africanisches Kratzkraut. In Nordafrica u. Syrien. Jun. Jul. K. H. J. Carduus diacanthus. Pers. l. c. 2. p. 389-

681. Serratula, Scharte.

- 1. S. tinctoria. Pers. l. c. 2. p. 390. Färber-Scharte, Im nördlicher, Eur. Jun. Jul. Im F. 21.
- 2. S. alata. Willd. enum. suppl p. 56. Ge-flügelte Scharte. —. Jul. Aug. Im F. 4,

682. Staehelina, Stäheline.

1. St. Chamaspeuce. Pers. l. c. 2. p. 391. Fichtenblättrige Stäheline. In Candien. Sept. Oct. K. H. 5.

683. Spilanthus, Fleckblume.

- 1. Sp. Acmella. Pers. l. c. 2. p. 393. Wahre Fleckblume. In Ceylon. Jun. Jal. W. H. O.
- 2. Sp. oleraceus. Pers. l. c. Krautartige Fleckblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O.

684. Bidens, Zweyzahn.

- 1. B. heterophylla. Pers. l. c. 2. p. 394. Verschiedenblättriger Zweyzahn. In Mexico. Jan. Jul. Ch. h.
- 2. B. luxurians. Willd. enum. 2. p. 847. Wuchernder Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.

685. Cacalia, Pestwurz,

- 1. C. papillaris. Pers. l. c. 2. p. 395. Warzige Pestwutz. Am Cap. —. Ch. b.
- 2. C. Anteuphorbium, Pors. 1. c. Wolfs-milchartige Pestwurz. Am Cap. -. Ch. t.
- 3. C. Kleinia. Pers. 1. c. Canarische Pestwurz. Auf den Canarischen Inseln. Sept. Oct. Ch. h.
- 4. C. Ficoides. Pers. l. c. Zaserblumenartige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.

- 5. C. repens. Pers. 1. c. Kriechende Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 5.
- 6. C. canescens. Donn. catalog. cantabrig. p. 351. Graublättrige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. b.
- 7. C. carnosa Pers. I. c. Fleischige Pestwurz. Am Cap. . Ch. b.
- 8. C. articulata. Pers. l. c. Dreyblättrige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. t. C. laciniata. Jacq. ic. rar. 1. t. 168. Coll. 1. p. 77.
- g. C. cylindrica. Pers. 1. c. Cylindrische Pestwurz. In Africa. —. Ch. 5.
- 10. C. sagittata. Pers. I. c. Pfeilblättrige Pestwurz. Zu Java, Jun. Jul, Im F. O.
- 11. C. suaveolens. Pers. 1. c. Wohlriechende Pestwurz. In Virgin. u. Canada. Jun. Aug. Im F. 4.
- 12. C. alpina. Pers. l. c. 2. p. 397. Alpen-Pestwurz. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, Schlesien, der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. Aug. Im F. 24.
 - 13. Eine noch unbeschriebene Art vom Cap.

686. Humea, Humea.

1. H. elegans. Smith exot. hot. 1. p. 1. t. s. Schöne Humea. In Australien. Jul. Aug. Ch. J. Calomeria amaranthoides. Pers. 1. c. 2. p. 406.

687. Piqueria, Piquerie.

1. P. trinervia. Pers. l. c. 2. p. 307. Dreynervige Piquerie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

688. Mikania, Mikanie.

1. M. scandens. Pers. 1. c. z. p. 398. Kletternde Mikanie. In Wässern v. Virginien. Jul. Aug. K. H. h.

689. Eupatorium, Wasserdost.

- 1. E. Dalez. Pers. l. c. 2. p. 399. Weidenblättriger Wasserdost. In Jamaica, Jun. Jul. W. H. h.
- 2. E. cannabinum. Pers. l. c. 2. p. 400. Hanfartiger Wasserdost. In Wässern v. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.
- 3. E. purpureum. Pers. l. c. Purpurfarbiger Wasserdost. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.
- 4. E. perfoliatum. Pers. 1. c. Durchwachsener Wasserdost. In Virginien u. Pensylvanien am Wasser. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 5. E. ageratoides. Pers. l. c. 2. p. 401. Ageratumartiger VVasserdost. In Canada u. Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 6. E. deltoideum. Pers. 1. c. Deltablättriger Wasserdost. . Jul. Aug. Im F. 24.

690. Ageratum, Ageratum.

1. A. conyzoides. Pers. l. c. 2. p.: 402. Dürrwurzelartiges Ageratum. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. O.

691. Stevia, Stevie.

- 1. St. Eupatoria. VVilld. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. 1807. p. 138. VVasserdostartige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 4. St. purpursa. Pers. l. c.
- 2. St. purpurea. Willd. enum. 2. p. 855. Purpurfarbige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. St. purpurea. Pers. l. c.
- 3. St. serrata. Pers. 1. c. 2. p. 403. Gesägte Stevie. In Mexico. Jul. Avg. Ch. 24. Ageratum punctatum. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 26. t. 300.

692. Vernonia, Vernonie.

- 1. V. noveboracensis. Pers. l. c. 2. p. 404. Neujorkische Vernonie. Zu Neujork, Virginien, Carolina u. Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24. Serratula noveborac. Lin. sp. pl. p. 146.
- 2. V. praealta. Pers. 1. c. Hohe Vernonie. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. 4. Serratula praealta. Lin. 1. c.
- 3. V. anthelmintica. Pers. l. c. Wurmtreibende Vernonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. O. Cenyza anthelm. Lin. sp. pl. p. 1207.

693. Chrysocoma, Goldhaar.

- 1. Ch. Coma aurea. Pers. l. c. Gemeines-Gold-haar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. t.
- 2. Ch. cernua. Pers. l. c. Hängendes Goldhaar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 3. Ch. denticulata. Pers. l. c. 2. p. 405. Gezähneltes Goldhaar. Jul. Aug. Ch. h.

4. Ch. Linosyris. Pers. l. c. Deutsches Goldtaar. In Mitteleur. Jun. Jul. Im F. 24.

694. Tarchonanthus, Pelzsame.

1. T. camphoratus. Pers. l. c. Kampferarti. ger Pelzsame. Am Cap. Oct. — Dec. Ch. t.

695. Santolina, Heiligenpflanze.

- 1. S. Chamaecyparissus. Pers. l. c. 2. p. 406. Cypressenartige Heiligenpflanze. In Südeur. Jul. Aug. K. H. ‡.
- 2. S. rosmarinifolia. Pers. l. c. Rosmarinartige Heiligenpilanze. In Spanien Jun. — Aug. K. H. t.
- 3. S. viridis. Pers. l. c. Grüne Heiligenpflanze. In Span. u. Südfrankr. Jus. Aug. K. H. 5.
- 4. S. alpina. Lin. sp. pl. p. 1180. Berg-Heiligenpflanze. In Italien. Jun. Jul. K. H. 2. S. erecta. Pers. l. c. 2. p. 407.

696. Athanasia, Athanasie.

- 1. A. virgata. Pers. I. c. 2. p. 407. Ruthenförmige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
- 2. A. annua. Pers. l. c. Jährige Athanasis. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. O.
- 3. A. crithmifolia. Pers. l. c. Bacillenhlättrige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. t.
- 4. A. parviflora. Pers. l. c. Kleinblumige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

697. Balsamita, Frauenmunze.

1. B. vulgaris. Willd. sp. pl. 3. p. 1802. Gemeine Frauenmünze. In Toscana, Languedoc. u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 2. Balsam. suaveolens. Pers. l. c. 2. p. 408. Tanacetum Balsamita. Lin. sp. pl. p. 1184.

698. Pentzia, Pentzie.

1. P. flabelliformis. Willd. sp. pl. 3. p. 1808. Fächerförmige Pentzie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5. Balsamita flabelliform. Pers. l. c.

SUPERFLUA.

699. Tanacetum, Wurmkraut.

- 1. T. vulgare. Pers. 1. c. 2. p. 409. Gemeines Wurmkraut. (Rainfarrn)- Auf Bergen in Eur. Jun. Oct. Im F. 24.
 - 8. foliis crispis. Mit krausen Blättern.

700. Artemisia, Beyfuss.

- 1. A. Abrotanum. Pers. l. c. Stabwarz-Beyfuss. Im Orient. u. Südfrankr. Jun. — Aug. Im F. 5.
- 2. A. afra. Pers. l. c. Africanischer Beyfuß. Am Cap? Jul. — Oct. Ch. b.
- 3. A. arborescens. Pers. l. c. Baumartiger Beyfuss. In Ital. im Orient. u. in der Barbarey. Jul. -Aug. K. H. h.

- 4. A. argentea. Pers. I. c. Silberfarbiger Beyfuss. Zu Madera. Sept. Oct. K. H. t.
- 5. A. scoparia. Pers. l. c. 2. p. 410. Besen-Beyfus. In Ungarn, Taurien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. O.
- 6. A. crithmifolia. Pers. l. c. 2. p. 411. Bacillenblättriger Beyfus. In Portugall u. Frankr. am Meeresstrande. — . K. H. 24.
- 7. A. maritima. Pers. 1. c. Meerstrands-Beyfus. Am Meeresstrande in Norvegen, Schweden, Pommern, Niederland u. England. Jun. Jul. Im F. 21.
- 8. A. austriaca. Pers. 1. c. 2. p. 412. Oesterreichischer Beyfus. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 9. A. pontica. Pers. l. c. Römischer Reyfufs. Auf trockenen Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Ital. Jul. Aug. Im F. 24.
 - 10. A. Absinthium. Pers. l. c. 2, p. 413. Bitterer Beyfass. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 11. A. vulgaris. Pers. 1. c. Gemeiner Beyfuls. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
 - 12. A. Dracunculus. Pers. 1. c. Drachen-Beyfuss. (Bertram). In Südens. Sibirien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 4.

701. Xeranthemum, Papierblume.

- 1. X. annuum. Pers. l. c. Gemeine Papierblume. In Oesterr Ital. Frankr. Jul. Aug. Im F. O.
- 2. X. inapertum. Pers. l. c. Geschlossene Papierblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. O.

702. Elichrysum, Strohblume.

1. E. bracteatum. Willd. enum. 2. p. 869. Goldfarbige Strohblume. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. 3. Helichrysum chrysanthum. Pers. l. c. 2. p. 414. Xeranthemum bracteatum. Vent.hort. malmais.2.t.2.

703. Gnaphalium, Ruhrkraut.

- 1: Gn. ericoides. Pers. l. c. 2. p. 417. Heidenartiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
- e. Gn. Stocchas. Pers. l. c. Buschiges Ruhrkraut. In Ungarn, Frankr. Span. dem Öesterreichischen Littorale n. im Orient. Jul. Aug. K.H. b.
- g. Gn. angustifolium. Pers. 1. c. Schmalblättriges Ruhrkraut. In Span. u. in Ital. bey Neapel Jul. Ang. K. H. 5.
- 4. Gn. foetidum. Pers. l. c. 2. p. 418. Stinkendes Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 7.
- 5. Gn. orientale. Pers. l. c. Levantisches Ruhrkraut. In Africa. Jun. Aug. K. H. b.
- 6. Gn. helianthemifolium. Pers. 1. c. 2. p. 419. Graublättriges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. b.
- 7. Gn. squarrosum. Pers. l. c. Sparrkelchiges Ruhrkraut. Am' Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
- 8. Gn. divaricatum. Thunb. prod. 151. Weitästiges Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. t. Gn. auriculatum. Pers. l. c. 2. p. 420.

9. Gn. margaritaceum. Pers. l. c. 2. p. 420. Perlenartiges Ruhrkraut. In Krain, Südtyrol, der Schweiz, in Schlesien, Sibirien, Nordamer u. Kamtschatka auf Bergen. Jul. — Sept. Im F. 4.

704. Baccharis, Baccharis.

- 1. B. ivaefolia. Pers. l. c. 2. p. 423. Ivablättrige Baccharis. In Virgin. u. Peru. Jul. Aug. K. H. 5.
- 2. B. nereifolia. Pers. l. c. Oleanderblättrige Baccharis. Am Cap. —. Ch. h.
- 3. B. halimifolia, Pers. I. c. Meldenblättrige Baccharis. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. K. H. h.
- 4. B. adnata. Willd. enum. 2. p. 870. Angewachsene Baccharis. In Südamer. Jun. W. H. b.
- 5. B. Dioscoridis. Pers. l. c. 2. p. 424. Levantische Baccharis. In Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. Ch. h.
- 6. B. parviflora. Pers. 1. c. 2. p. 425. Rieinblüthige Baccharis. An Flüssen in Peru. —. Ch. b.

705. Conyza, Dürrwurz.

- 1. C. saxatilis. Pers. l. c. 2. p. 428. Stein-Dürrwurz, In Südeur. Palästina u. der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. h.
- 2. C. candida. Pers. l. c. 2. p. 429. VVeisso Dürrwurz. In Dalmatien u. Candien. Jun. Jul. K. H. b.
- 3. C. incisa. Pers. l. c. Eingeschnittene Dürrwurz. Am Cap. Jul. Aug. Ch. h.

4. C. thapsoides Pers. 1. c. Königskerzenartige Dürrwurz. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. K. H. 4.

706. Psiadia, Tropfenpflanze.

1. Ps. glutinosa. Pers. l. c. Klebrige Tropfenpflanze. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Ch. b.

707. Madia, Madie.

v. M. viscosa. Pers. l. c. 2. p. 430. Klebrisge Madie. In Chili. Aug. Sept. W. H. O. M. mellosa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 29. t.302.

708. Erigeron, Berufungskraut.

1. E. alpinum. Pers. l. c. p. 2. 431. Alpen-Berufungskraut. Auf Alpen in Oesterr. Steverm. Krain u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 4.

709. Senecio, Kreuzkraut.

- 1. S. purpureus. Pers. 1. c. 2. p. 432. Purpurfarbiges Krenzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4. Cacalia villosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 580. Collect. 2. p. 347.
- 2. S. haematophyllus. Willd. enum. 2. p. 875. Blutblättriges Kreuzkrant. — . W. H. b.
- nes Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Sept. Im F. t. B. floribus. plenis. Mit gefüllten Blüthen.
- p. normus. pienis. Mit getuiten Diamon.
- 4. S. rosmarinifolius. Pers. l. c. 2. p. 436. Rosmarinblättriges Krenzkraut. Am Cap. Jul. Ch. b.

- 5. S. nemorensis. Pers. l. c. 2. p. 437. Hain-Kreuzhraut. In Deutschl. Jul. Im F. 4.
- 6. S. saracenicus. Pers. 1. c. Heidnisches Kreuzkraut. In Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Engl. Jul. Im F. 4.
- 7. S. coriaceus. Pers. I. c. Lederblättriges Kreuzkraut. Im Orient. Jul. Im F. 24.
- 8. S. Doria. Pers. l. c. Hohes Kreuzkraut. In Oesterr, Deutschl. u. dem Orient, Jul. Im F. 2.
- 9. S. rigidus, Pers. 1. c. 2. p. 438. Steifes Kreuzkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. h.
- 10. S. solidaginoides. Pers. l. c. Goldruthenartiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. b.

710. Cineraria, Aschenpflanze.

- 1. C. geifolia. Pers. l. c. 2. p. 439. Steinbrechblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. Aug. Ch. h.
- e. C. aurita. Pers. 1. c. Geöhrte Aschenpflanze. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. t.
- 3. C. hybrida. Willd. enum. 2. p. 893. Bastard-Aschenpflanze. . Apr. Jul. Ch. †
- 4. C. cruenta. Pers. l. c. Rothblättrige Aschenpflanze. Auf den Canarisch. Inseln. März — Jul. Ch. 24.
- 5. C. cordifolia. Pers. l. c. 2. p. 440. Herzblättrige Aschenpflanze. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, der Schweiz u. Frankr. Jul. Aug. Im. F. 21.

- 6. C. alpina. Pers. I. c. Alpen-Aschenpflanze. Auf Europ. Alpen. Jul. Aug. Im F. 24.
- 7. C. maritima. Pers. l. c. Meerstrands-Aschenpflanze. Am Meeresstrande in Südeur. Jal. Aug. K. H. 24.
- 8. C. bicolor. Pers. l. c. Zweyfarbige Aschenpflanze. — . Jul. Aug. K. H. 5.
- 9. C. linifolia. Pers. I. c. Leinblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. Jul. Ch. † .
- 10. C. lanata. Pers. l. c. Wollige Aschenpflanze. Auf den Canarischen Inseln. Jun. - Aug. Ch. b.
- 11. C. amelloides. Pers. l. c. s. p. 441. Blaue Aachenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. b.

711. Aster, Sternblume.

- 2. A. argaphyllus. Pers. 1. c. Silberblättrige Sternblume. In Neuholl. . Ch. t.
- 3. A. Cymbalariae. Pers. l. c. Fünfzähnige Sternblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. b.
- 4. A. angustifolius. Pers. l. c. Schmalblättrige Sternblume. Am Cap. Jun. Oct. Ch. t.
- 5. A. fruticulosus. Pers. 1, c. Strauchartige Sternblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 3.
- 6. A. alpinus. Pers. l. c. 2. p. 442. Alpen-Sternblume. Auf Europäischen Alpen. Jul, Aug. Im F. 4.

- me. Am Cap. Jul. Aug. Ch. O.
- 8. A. nemoralis. Pers. 1. c. Wald-Sternblame, In Nordamer. Sept. Oct. In F. 24.
- 9. A. hyssopifolius. Pers. l. c. Ysopblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 10. A. punctatus. Pers. l. c. Punktirte Sternblume. In Ungarn. Aug. Sept. Im F. 24.
- 11. A. acris. Pers. l. c. Scharfe Sternblume. In Ungarn, zu Montpellier u. auf den Pyrenäen. Jul. — Sept. Im F. 4.
- 12. A. canus. Pers. l. c. Grane Sternblume. Im Banat. Aug. Sept. 1m F. 4.
- 13. A. linif ilius. Pers. l. c. 2- p. 443. Leinblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 14. A. linariifolius. Pers. l. c. Frauenflachsblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 2.
- 15. A. tenuifolius. Pers. I. c. Dünnblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F.2.
- 16. A. dumosus. Pers. I. c. Buschige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 2.
- 17. A. multiflorus. Pers. I. c. Vielblumige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 2.
- 18. A. umbellatus. Ait. hort. kew. 3. p 106. Doldenblüthige Sternblume. In Pensylvanien. Aug. Sept. Im F. 24.
- 19. A. vernus. Pers. l. c. Frühlings-Sternblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 4.

- eo. A. salicifolius. Pers l. c. e. p. 444. VVeidenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 21. A. Amellus. Pers. l. c. Virgils-Sternblume. Auf Hügeln im südlicher. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.
- 22. A. Novae Angliae. Pers. l. c. Neuenglische Sternblume. In Neuengland. Aug. Sept. Im F. 4.
- 23. A. undulatus. Pers. l. c. Wellenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 24. A. sagittifolius. Pers. l. c. Pfeilblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 21.
- 25. A. paniculatus. Pers. 1. c. 2. p. 445. Rispenästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 26. A. corymbosus. Pers. l. c. Doldentraubige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 27. A. cordifolius. Pers. l. c. Herzblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 28. A. macrophyllus. Pers. l. c. Grossblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 21.
 - 29. A. chinensis. Pers. l. c. Chinesische Sternblume. In Ostind. China u. Japan. Jul. Aug. Im F. .
 - 30. A. Tripolium. Pers. 1. c. Meerstranda-Sternblume. Am Meeresstrande in Südeur. u. auf salzigem Boden in Deutschl. u. Sibirien. Aug. Sept. Im F. 24.

- 31. A. puniceus, Pers. I. c. Blaustielige Sternblume, In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 32. A. annuus. Ait hort kew. 3. p. 209. Jährige Sternblume. In Deutschl. Dännemark. u. Canada. Jul. Aug. Im F. O. Erigeron heterophyllum. Pers. l. c. 2. p. 431.
- 33. A. sibiricus. Pers. l. c. Sibirische Sternblume. In Sibirien. Jul. Im F. 24.
- 34. A lacvie. Pers. l. c. 2, p. 446. Glatte Sternblume. Im Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 35. A. mutabilis. Pers. l. c. Veränderliche Sternblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.
- 36. A. longifolius. Pers 1. c. Langlättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 37. A. vimineus. Pers. I. c. Ruthenförmige Sternblume. In Canada. Aug. Sept. Im F. 24.
- 38. A. Tradescanti. Pers. 1. c. Tradescantische Sternblume. In Virginien. Aug. Sept. Im F. 4.
- 39. A. recurvatus. Pers. I. c. Zurückgeboge. ne Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 40. A. floribundus. Pers. l. c. Blumenreiche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 41. A. Novi Belgii. Pers. l. c. Pensylvanische Sternblume. In Pensylv. u. Virgin. Aug. Sept. Im F. 24.
- 42. A. serotinus. Pers. 1. c. 2. p. 447. Späte Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.
- 43. A. tardiflorus. Pers. l. c. Herbst-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.

- 44. A. junceus. Pers. l. c. Binsenartige Sternblume: In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 45. A. fragilis. Pers. l. c. Zerbrechliche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 46. A. miser. Pers. l. c. Kurzstrahlige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 47. A. pendulus. Pers. l.c. Hängende Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
- 48. A. diffusus. Pers. 1. c. Weitästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24. Nebst einigen noch nicht bestimmten Arten.

712. Solidago, Goldruthe.

- 1. S. qanadensis. Pers. l. c. 2. p. 448. Canadische Goldruthe. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.
- 2. S. altissima. Pers. l. c. Höchste Geldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.
- 3. S. elliptica. Pers. 1. c. Elliptische Goldruthe. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.
- 4. S. sempervirens. Pers. l. c. Immergrüne Goldruthe. In Neujork u. Canada. Oct. Dec. Im F. 4.
- 5. S. odora. Pers. l. c. r. p. 440. Wohlrie. chende Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F.24.
- 6. S. lanceolata. Pers. l. c. Schmalblättrige. Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.
- 7. S. caesta. Pers. 1, c. Blaustielige Goldmthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

- 9. S. mexicans. Pers. 1. c. Mexicanische Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 2.
- 9. S. flexicaulis Pers. l. c. Gebogene Goldruthe. In Canada. Jul. Aug. Im F. 24.
 - 8. latifolia. Mit breiteren Blättern.
- 10. S. alpestris. Pers. l. c. Alpen-Goldruthe. Auf Alpen in Oesterr. Böhmen u. den Carpathen. Aug. Sept. Im F. 4.
- 11. S. Virga aurea. Pers. l. c. Gemeine Goldruthe. In Eur. auf trockenen Trieften. Aug. Sept. Im F. 24.
- 12. S. rigida. Pers. l. c. 2. p. 450. Steife Goldruthe. In Pensylvanium Jun. Jul. Im F. 2.

713. Inula, Alant.

- 1. I. Helenium. Pers. l. c. Wahres Alant. In England, Niederl. Deutschl. u. Ungarn. Jun. — Aug. lm F. 24.
- 2. 1. Oculus Christi. Pers. 1. c. Weissblättriger Alant. In Oesterr. u. um Tübingen. Jun. Aug. Im F. 4.
- 3. I. britannica. Pers. l. c. Wiesen Alant. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jul. Aug. Im F. 2.
- 4. I. dysenterica. Pers. 1. c. Ruhr-Alant. In Eur. an Gräben. Jul. Aug. Im F. 24.
- 5. I. squarrosa. Pers. l. c. 2. p. 451. Sparriger Alant, In Italien u. zu Montpellier. Jul. Aug. Im F. 21.
- 6. I. salicina, Pers. l. c. Weidenblättriger Alant. In Eur. Jun. - Aug. Im F. 2.

- 7. 1. Bubonium. Pers. 1. c. Knorpliger Alant. Im Oesterreichischen Littorale, Krain, in der Krim n. am Flusse Donec. Jun. Jul. Im F. 24.
- 8. 1. hirta. Pers. l.c. Steifhaariger Alant. In Deutschl. Frankr. u. Sibirien. Jun Jul. Im F. 24.
- 9. I. germanica. Pers. 1. c. Deutscher Alant. In De 'schl. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- to. I. ensifolia. Pers. I. c. Nervigter Alant. In Oesterr. auf Steingerölle u. am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

714. Arnica, Wohlverley.

- 1. A. montana. Pers. l. c. Wahrer Wohlverley. (Engelstrank). Auf Bergwiesen im kälteren Eur. Jun. Jul. Im F. 21.
- 2. A. Doronicum. Pers. I. c. Alpen Wohlverley. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Ital. u. zu Dauphine. Jun. Jul. Im F. 21.

715. Doronicum, Gemswurzel.

- 1. D. Pardalianches. Pers. 1. c. 2. p. 454. Gemeine Gemswurzel. Auf waldigen Bergen in Oesterr, der Schweiz, Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Im F. 24.
- 2. D. orientale. Willd. enum. 2. p. 898. Caucasische Gemswurzel. Am Caucasus. März, Apr. Im F. 24.
 D. caucasicum. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2.p.321.

716. Tussilago, Huflattig.

- 1. T. alpina. Pers. l. c. 2. p. 455. Alpen-Hullattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Schlesien, Böhmen u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. T. discolor. Pers. l. c. Zweyfarbiger Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. Krain. Jun, Jul. Im F. 24.
- 3. T. fragrans. Pers. l. c. Wohlriechender Huflattig. In Ital. bey Neapel. Nov. Dec. u. Apr. Im F. 21.
- 4. T. Petasites. Pers. 1. c. Gressblättriger Huflattig: In Eur. an Flüssen u. Bächen. May, Jun. Im F. 4.

717. Georgina, Georgine.

G. variabilis. Willd, hort, berol. 2. p. et t.
 Veränderliche Georgine. In Mexico. Jun. Jul.
 H. 21.

Dahlia pinnata. Pers. l. c. 2. p. 458.

Georgina purpurea. Willd. sp. pl. 3. p. 2124.

B. lilacina. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 94. Mit lilafarbiger Blüthe.

Dahlia rosea. Pers. l. c.

Georgina rosea. Willd. sp. pl. l. c.

pallida. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 95.
 Mit blafsrother Blüthe.

Sammt mehreren andern sich durch die Blüthenfarbe unterscheidenden Abarten.

2. G. coccinea. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 96. Scharlachfarbige Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 2.
Dahlia coccinea. Pers. 1. c.

- 6. crocea. Willd. enum. 2. p. 900. Mit safranfarbiger Blüthe.
- 7. flava. Willd. l. c. 2. p. 909. Mit gelber Bläthe.

718. Zinnia, Zinnie.

- 1. Z. multiflora. Pers. l. c. Vielblühende Zinnie. In Luisiana. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. Z. vertioillata. Pers. 1. c. Wirtelblättrige Zinnie. In Mexico. Jun. Jul. Im F. O.
- 3. Z. elegans. Jacq. ic. rar. 3. t. 589. Collect. 5. p. 152. Schöne Zinnie. In Mexico. Jun.

 Aug. Im F. O.
 Z. violacea. Pers. l. c.
- 4. Z. tenuiflora. Jacq. ic. rar. 3. t. 590. Collect. 5. p. 153. Schmalblüthige Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. O. Z. revoluta. Pers. l. c.

719, Tagetes, Todtenblume.

- 1. T. lucida. Pers. l. c. Ganzblättrige Todtenblume. In Mexico. Jun. Aug. Im F. 24.
- 2. T. patula. Pers. 1. c. Gemeine Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. O.
- 3. T. erecta. Pers. l. c. Großblumige Tedtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. .
- 4. T. tenuifolia. Pers. l. c. 2. p. 459. Feinblättrige Todtenblume. In Peru. Jun. Aug. lm F. O.

720. Bellis, Massliebe.

- 1. B. perennis & hortensis fl. pleno albo. Pers. l. c. 2. p. 459. Garten-Massliebe mit weissgefüllter Blume. Kömmt in Gärten vor. May — Aug. Im F. 24.
 - hortensis fl. pl. rubro. Mit rothgefüllter Blüthe.

721. Chrysanthemum, Wucherblume.

- 1. Ch. carinatum. Pers. l. c. 2. p. 462. Dreyfarbige VVucnerblume. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. Ch. coronarium. Pers. 1. c. 2. p. 463. Garten Wucherblume. In Candien, Sicilien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. O.

722. Pyrethrum, Bertramwurz.

- 1. P. frutescens. Willd. sp. pl. 2. p. 2150. Strauchartige Bertramwurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Aug. Ch. b. Chrysanthem. frutesc. Pers. l. c. 2. p. 461.
- 2. P. serotinum. Willd. 1. c. 3. p. 2151. Späte Bertramwurz. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4. Chrysanthem. serot. Pers. 1. c. 2. p. 460.
- 3. P. uliginosum. Willd. 1. c. 3. p. 2152. Schlamm-Bertramwurz. In Ungarn's u. Spanien's Sümpfen. Jul. Aug. In F. 24. Chrysanthem. uliginos. Pers. 1. c.

- 4. P. alpinum, Willd. l. c. 3. p. 2153. Alpen-Bertramwurz. Auf den höchsten Alpen im südlicher. Europa. Jul. Aug. Im F. 24. Chrysanthem. alpin. Pers. l. c. 2. p. 461.
- 5. P. pinnatifidum. Willd. l. c. 3. p. 2154. Schlitzblättrige Bertramwurz. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. Aug. K. H. 24. Chrysanthem. pinnatif. Pers. l. c.
- 6. P. macrophyllum. Willd. l. c. Grofsblättrige Bertramwurz. In Wäldern v. Croatien, auf Bergen in Sclavon. dann im Banat v. an den Gränzen der Walachey. Jul. Im F. 24. Chrysanth. macroph. Pers. l. c.
- 7. P. corymbosum. Willd. 1. c. 3. p. 2155. Doldentraubige Bertramwurz. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. May Jul. Im F. 24. Chrysanthem. corymb. Pers. 1. c.
- 8. P. Parthenium. Willd. I. c. Mutterkraut-Bertramwurz. In Eur. an bebauten Stellen. Jun.
 Aug. Im F. 24.
 Chrysanthem. Parthen. Pers. 1. c. 2. p. 462.
 Matricaria Parthen. Lin. sp. pl. p. 1255.

723. Matricaria, Mutterkraut.

1. M. Chamomilla. Pers. l. c. 2. p. 463. Chamillen-Mutterkraut. In Eur, an bebauten Stellen Jun. — Aug. Im F. O.

724. Lidbeckia, Lidbeckie.

1. L. pectinata. Thunb. prod. 161. Eingeschnittene Lidbeckie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5. Lancisia pectinata. Pers. 1. c. Cotula stricta. Lin. mant. 287.

725. Boltonia, Boltonie.

1. B. glastifolia. Pers. 1. c. 2. p. 464. Gran-blättrige Boktonie. In Pensylvan. u. Virgin. Sept. Oct. Im F. 24.

726. Anthemis, Chamille.

- 1. A. Cota. Pers. L. c. 2. p. 465. Stechende Chamille. In Ital. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. A. nobilis. Pers. l. c. 2. p. 466. Römische Chamille. Im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 2.
- 3. A. austriaca. Pers. l. c. Oesterreichische Chamille. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. Italien. Jun. Jul. lm F. O.
- 4. A. artemistaefolia. Willd. nov. act. soc. nat. scrut. berol. 3.p. 431. Beyfusblättrige Chamille. In China. Sept. Decemb. K. H. 5. Chrysanthem. indicum. Pers. 1. c. 2. p. 461.

s. floribus luteis. Mit gelben Blüthen.

- 5. A. trilobata. Orteg. 6. p. 72. Dreylappige Chamille. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 5.
- 6. A. tinctoria. Pers. l. c. 2. p. 466. Färher-Chamille. In Deutschl. u. Schweden auf trockenen, sonnigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 4.

727. Achillea, Schafgarbe.

1. A. grandiflora. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 335. Großblüthige Schafgarbe. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24. Chrysanth. ptarmicaefol. Pers. l. c. 2. p. 460.

- 2. A. Ptarmica. Pers. 1. c. Sumpf-Schafgarbe. An feuchten Stellen in Nordasien u. America. Jul. Aug. Im F. 2.
- 3. A. Ageratum. Pers. 1. c. 1. p. 467. Gewürzhafte Schafgarbe. In Ital. Frankr. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. A. alpîna. Pers. I. c. Alpen-Schafgarbe. Auf Alpen in der Schweiz, Savoyen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.
- 5. A. Clavennae. Pers. l. c. Bittere Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzh. Krain, Kärnthen u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 21.
- 6. A. atrata. Pers. 1. c. 2. p. 468. Schwarz-kelchige Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, der Schweiz u. Italien. Jun. Aug. Im F. 24.
- 7. A. aegyptiaca. Pers. l. c. Aegyptische Schafgarbe, In Aegypten, im Orient u. bey Astrachan. Jun. Jul. K. H. 24.
- 8. A. Eupatorium. Pers. l. c. Caspische Schafgarbe. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im 平, 24.
- 9. A. magna. Pers. l. c. 2. p. 469. Großs. Schafgarbe. In Südeur, Jun. Jul. Im F. 4.
- 10. A. Millefolium & store purpureo. Pers. 1. c. Gemeine Schafgarbe mit purpurrother Blüthe. In Eur. Asien u. Nordamer. May Aug. Im F. 4.
- 11. A. ligustica. Pers. I, c. Ligurische Schafgarbe. Auf Hügeln in Italien. Jun. Jul. Im F. 4.

728. Verbesina, Verbesine.

- 1. V. alata. Pers. l. c. 2. p. 471. Geflügelte Verbesine. Zu Curassao u. Surinam. Jun. — Aug. VV. H. 21.
- 2. V. gigantea, Pers. l. c. Riesenartige Verbesine. In Westind. Jun. Jul. W. H. h.
- 3. V. pinnatifida. Pers. l. c. 2. p. 472. Schlitz-blätfrige Verbesine. In Mexico. Jul. Sept. W. H. h.
- -4. V. serrata. Pers. l. c. Gesägte Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. VV. H. 24.

729. Pascalia, Pascalie.

1. P. glauca. Pers. 1. c. 2. p. 473. Graugrüne Pascalie. In Chili. — K. H. 5.

730. Ximenesia, Ximenesie.

1. X. encelioides. Pers. 1. c. Geöhrte Ximenesie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.

731. Buphthalmum, Rindsauges

- 1. B. frutescens. Pers. 1. c. Strauchartiges Rindsauge. In Jamaica u. Virginien. Jun. Oct. K. H. t.
- 2. B. sericeum. Pers. l. c. 2. p. 474. Seidenartiges Rindsauge. Auf Teneriffa. Jun. Aug. Ch. h.
- 3. B. spinosum. Pers. 1. c. Stachelkelchiges Rindsauge. In Ital. Span. Languedoo u. im Orient. Jun. Aug. K. H. J.

- 4. B. maritimum. Pers. 1. c. Meerstrands-Rindsauge. Am Mittelländischen Meere. Jul. — Oct. K. H. 24.
- 5. B. salicifolium. Pers. l. c. Weidenblättriges Rindsauge. Auf Alpen in Oester. Ital. u. zu Montpellier. Jun. Aug. Im F. 4.
- 6. B. grandiflorum. Pers. l. c. Grofsblüthiges Rindsauge. Auf Bergen in Oesterr. Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. 4.
- 7. B. cordifolium. Pers. l. c. Herzblättriges Rindsauge. In Wäldern im Banat u. in Croatien. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 8. B. helianthoides. Lin. sp. pl. p. 1275. Sonnenblumenartiges Rindsauge. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.
 Heliopsis laevis. Pers. l. c. 2. p. 473.
 Helianthus Lin. l. c. p. 1278.
 Rudbeckia oppositifolia. Lin. l. c. p. 1280.
 Silphium solidaginoides. Lin. l. c. p. 1302.

732. Helenium, Helenie.

- 1. H. autumnale. Pers. l. c. Herbst-Helenie. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.
- 2. H. quadridentatum. Pers. l. c. 2. p. 475. Vierzähnige Helenie. In Portugall. Jun. — Aug. K. H. 4. Rudbeckia alata. Jacq. ic. 121. 3. t. 593. Collect. 5. p. 154.

FRUSTRANEA.

733. Helianthus, Sonnenblume-

1. H. annuus. Pers. l. c. Gemeine Sonnenblume. In Peru u. Mexico. Jun. — Aug. Im F.O.

- 2. H. multiflorus. Pers. 1. c. Vielblumige Sonnenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 4.
- 3. H. tuberosus. Pers. 1. c. Knollige Sonnenblume. In Brasilien. Jul. — Oct. Im F. 21.
- 4. H. mollis. Pers. l. c. Weichblättrige Sonnenblume. In Nordamer. Jul. — Sept. Im F. 4.
- 5. H. prostratus. Pers. l. c. Gestreckte Sonnenblume. In Nordamer, Jul. Aug. Im F. 24.
- 6. H. giganteus. Pers. 1. c. Riesen Sonnenblume. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 2.
- 7. H. altissimus. Pers. l. c. 2. p. 476. Höchste Sonnenblume. In Pensylvan. Jul. Aug. Im F. 4.

734. Rudbeckia, Rudbeckie.

- 1. R. laciniata. Pers. Lc. Schlitzblättrige Rudbeckie. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. 1mF.4.
- 2. R. pinnata. Pers. 1. c. Gefiederte Rudbeckie. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 21. R. odorata. Hortulan.
- 3. R. hirta. Pers. l. c. Rauhe Rudbeckie. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. Im F. 24.
- 4. R. purpurea. Pers. l. c. 2. p. 477. Purpurtothe Rudbeckie. In Virgin. Carolina u. Florida auf Bergen. Jul. Aug. Im F. 21.
- 5. R. amplexicaulis. Pers. l. c. Stengelumfassende Rudbeckie. In Luisiana u. Mexico. Jun. Jul. 1m F. O.

735. Cosmea, Cosmea.

1. C. bipinnata. VVilld. sp. pl. 3. p. 2250.

Doppeltgefiederte Cosmea. In Mexico. Jun. —
Aug. Im F. O.

Cosmus bipinnatus. Pers. l. c.

2. C. parviflora. Willd. 1. c. 3. p. 2251. Kleinblumige Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. O. Cosmus parviflor. Pers. 1. c. Coreopsis parviflora. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 65. t. 374.

736. Coreopsis, Wanzenblume.

- 1. C. ferulaefolia. Pers. l. c. Peitschen krautblättrige Wanzenblume. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 4.
- 2. C. verticillata. Pers. 1. c. Wirtelblättrige Wanzenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.
- 3. C. tenuifolia.. Pers. l. c. Feinblättrige VVanzenblume. In Carolina. Jul. Ang. Im F. 4.
- 4. C. tripteris. Pers. 1. c. 2. p. 478. Dreyblättrige Wanzenblume. Auf hohen Bergen in Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. 24.
- 5. C. auriculata. Pers. l. c. Geöhrte Wanzenblume. Auf Bergen in Virginien u. Carolina. Jun. — Aug. Im F. 24.

737. Pallasia, Pallasie,

1. P. grandiflora. Willd. sp. pl. 3. p. 2261. Großblumige Pallasie. In Mexico. Iul. Aug. Ch. th. Encelia halimifolia. Pers. l. c. 2. p. 479.

738. Gorteria, Gorterie.

- 1. G. rigens. Pers. l. c. 2. p. 480. Liegens de Gorterie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 2. G. pectinata. Pers. 1. c. Kammförmige Gorterie. Am Cap. Jul. Ch. 24.

739. Berckheya, Berckheye.

- 1. B. incana. Pers. l. c. Graue Berckheye. In den innern Gegenden am Cap. Jun. - Oct. Ch. t. Gorteria asteroides. Lin. suppl. 381.
- 2. B. grandiflora. Pers. l. c. Grossblumige Berckheye. Auf Bergen am Cap. Aug. - Oct. Ch. 5. Atractylis oppositifolia. Lin. mant. 477.
- 3. B. squarrosa, Pers. l. c. 2. p. 481. Sparrige Berckheye. An den Meeresküsten am Cap. Novemb. Decemb. Ch. t. Gorteria squarrosa. Lin. sp. pl. p. 1284.

740. Centaurea, Flockenblume.

- 1. C. moschata. Pers. 1. c. Bisamduftende Flockenblume. In Griechenland, Jun. Jul. Im F. Q.
- 2. C. suaveolens. Pers. 1. c. Wohlriechende Flockenblume. Im Orient. Jun. Jul. Im F. O.
- 3. C. ruthenica. Pers. l. c. 2. p. 482. Russische Flockenblume. In Sibirien. Jun. Jul. 1m F. 24.
- 4. C. phrygia. Pers. l. c. Phrygische Flockenblume. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Finnland. Jun. Jul. Im F. 24.
- 5. C. axillaris. Wild. sp. pl.3. p. 2290. Seitenblüthige Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Südfrankr. May - Jul. Im F. 24.

C. seusana. Pers. l. c. 2. p. 483.

- 6. C. montana. Pers. 1. c. Berg-Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.
- 7. C. ragusina. Pers. l. c. Ragusische Flockenblume. In Candien u. zu Epidaurus. Jun. Jul. K.H. 4.
- 8. C. Cineraria. Pers. l. c. Aschenfarbige Flockenblume. In Ital. Jun. Jul. K. H. 4.
- 9. C. glastifolia, Pers. 1. c. 2. p. 485. Spreukelchige Flockenblume. Im Orient u. in Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 10. C. sonchifolia. Pers. 1. c. Gänsedistelblättrige Flockenblume. Am Mittelländischen Meeresstrande. Jun. Aug. K. H. 24.
- 11. C. ferox. Pers. l. c Vielstachlige Flockenblume. In der Barbarey. Jun. Aug. K. H. 24.
- 12. C. Calcitrana. Pers. 1. c. 2. p. 486 Calcitrapen Flocken Stume. Im südlicher. Eur. Jun.
 Aug. Im F. O.
- 13. C. napifolia. Pers. l. c. Rübenblättrige Flockenblume. In Candien u. der Barbarey. Jun. Jul. Im F. O.

NECESSARIA.

741. Silphium, Silphium.

- 1. S. therebinthinaceum. Pers. l. c. 2. p. 489. Therebinthenartiges Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.
- 2 S. perfoliatum. Pers, l. c. Durchwachsenes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.
- 3. S. connatum. Pers. 1. c. Verwachsenes Silphium. In Nordamer. Jul. Ang. Im F. 24.

742. Polymnia, Polymnie.

1. P. Uvedalia. Pers. 1, c. 2. p. 491. Caroli. . nische Polymnie. In Virgin. Carolin. u. Mexico. Aug. Sept. K. H. 24.

743. Calendula, Ringelblume.

- 1. C. officinalis. Pers. l. c. 2. p. 492. Gemeine Ringelblume. In Südeur- Jun. Oct. Im F. O.
- 2. C. pluvialis. Pers. 1. c. Regen-Ringelblume. Am Cap. Jun. Aug. Im F.O.
- 3. C. hybrida. Pers. l. c. Bastard Ringel-blume. Am Cap. Jun. Jul. Im F. O.
- 4. C. graminifolia. Pers. 1. c. Grasblättrige Ringelblume. Am Cap. März — Sept. Ch. b.
- 5. C. Tragus & flaccida. Pers. 1. c. Groß blumige Ringelbiume mit schlaffen Blättern. Am Cap. May Aug. Ch. † .
- 6. C. chrysanthemifolia, Pers. 1. c. Wucher-blumenblättrige Ringelblume, März Jun. Ch. b.
- 7. C. fruticosa. Pers. l. c. Strauchartige Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. t.

744. Arctotis, Bährenohr.

- 1. A. acaulis. Pers. l. c. s. p. 493. Stengelloses Bährenohr. Am Cap wie alle folgende. Jun. Jul. Ch. p.
- 2. A. tricolor. Pers. l. c. Dreyfarbiges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. b.

- 3. A. glaucophylla. Pers. l. c. Graublättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 4.
- 4. A. rosea. Pers. l. c. Rosenfarbiges Bären ohr. Jun. Jul. Ch. b.
- 5. A. decumbers. Pers. 1. c. Liegendes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 24.
- 6. A. angustifolia. Pers. 1. c. Schmalblättriges Bärenohr. Apr. Jun. Ch. 5.
- 7. A. flammea. Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 141. t. 47. f. 1. Feuerrothes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. h.
- 8. A. decurrens. Pers. 1. c. Ablaufendes Bärrenohr, März Jun. Ch. 5.
- 9. A. auriculata. Pers. l. c. Geöhrtes Bärrenohr. Jun. Aug. h.
- 10. A. melanocycla, Willd. enum. 2, p. 937. Schwarzzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. †.
- 11. A. chrysocycla. Hort. bot. vindob. Gelbzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 5.
- 12. A. aenea. Jacq. eclog. fasc. 6. p. 77. t. 52. Erzfärbiges Bärenohr. May, Jun. Ch. h.
- 13. A. aspera. Pers. l. c. 2. p. 494. Scharfblättriges Bürenohr. Jun. Jul. Ch. 5.
- 14. A. elatior. Pers. l. c. Hochstieliges Bärrenohr, Jun. Jul. Ch. t.
- 15. A. arborescens. Pers. 1. c. Baumartiges Bärenohr. Jun. Aug. Ch. .
- 16. A. cuprea. Pers. l. c. Kupferfarbiges Bärrenohr. May Jul. Ch. t.

17. A. squarrosa. Pers. l. c. Sparriges Bärenohr. May — Jul. Ch. 5.

· \$. floribus pallidioribus. Mit blässeren Blüthen.

745. Arctotheca, Bärenbüchse.

1. A. repens. Pers. 1. c. 2. p. 495. Kriechende Bärenbüchse. Am Cap. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Ch. 24.
Arctotis repens. Jacy. hort. schoenbr. 3. p. 31. t. 306.

746. Osteospermum, Beinsame.

- i. O. spinosum. Pers. l. c. Dorniger Beinsame. Am Cap. Sept. Oct. Ch. b.
- 2. O. pisiferum. Pers. l. c. Erbsentragender Beinsame. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.
- 3. O. moniliferum, Pers. 1. c. Halsbandförmiger Beinsame. Am Cap. Apr. Jul. Ch. t.
- 4. O. coeruleum. Pers. I. c. Blauer Beinsame. Am Cap. Jun. Aug. Ch. b. O. pinnatifidum. L'Herit. stirp. nov. 11. t. 6.

747. Othonna, Othonne.

- 1. O. crassifolia, Pers. l.c. 2. p. 496. Dickblättrige Othonne. In Africa. Jul. Aug. Ch. b.
- e. O. Lingua. Pers, l. c. Zungenförmige Othonne. Am Cap. Jänn. März. Ch. 4.

748. Hippia, Hippie.

1. H. frutescens. Pers. l. c. 2, p. 497. Stranchartige Hippie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

749. Eriocephalus, Wollenkopf.

1. E. africanus. Pers. l. c. Africanischer Wollenkopf Am Cap. Jul. Aug. Ch. ty.

750. Iva, lve.

1. I. frutescens. Pers. l. c. Strauchartige Ive. In Nordamer. u. Peru. Sept. Oct. Ch. t.

SEGREGATA.

751. Elephantopus, Elephantenfuß.

1. E. scaber. Pers. l. c. 2. p. 498. Rauher Elephantenfus. In Ostindien. Jun. Jul. VV. H. 24.

752. Echinops, Kugeldistel.

- 1. E. sphaerocephalus. Pers. l. c. 2. p. 499. Gemeine Kugeldistel. In Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. E. Ritro, Pers. l. c. Glattblättrige Kugeldistel. Auf Hügeln in Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

753. Cymbidium, Kahnlippe.

- v. C. aloifolium. Pers. l. c. 2. p. 515. Aloeblättrige Kahnlippe. In Malabar. Apr. Aug. W. H. 4. Epidendram aloifolium. Lin. sp. pl. p. 1350.
- 2, C. verecundum. Pers. l. c. 2. p. 516. Faltige Kahnlippe. Auf den Bahamainseln. Jun. Aug. VV. H. 4.
 Limodorum verecundum. Salisb. prod. 9.
 Limodorum altum. Jacq. ic. rar. 3. t. 602.
- 3. C. altum. Pers. 1. c. Hohe Kahnlippe. In VVestind, Jun. — Aug. VV. H. 24. Limodorum altum. Lin. syst. veg. p. 680.
- 4. C. ensifelium. Pers. l. c. 2. p. 517. Schwertblättrige Kahnlippe. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24. Epidendrum ensifolium. Lin. sp. pl. p. 1352.

754. Epidendrum, Baumwurzler.

- r. E. cochleatum. Pers. l. c. 2. p. 518. Schneckenförmiger Baumwurzler. Auf den Bahamainseln. In Jamaica, Martinique u. Gujana. Nov. Decemb. W. H. 24.
- 2. E. celiare. Pers. 1. c. 2. p. 513. Gefranzter Baumwurzler. In Wäldern zu Martinique. Jun-Sept. VV. H. 24.

3. E. elongatum. Pers. 1. c. Verlängerter Baumwurzler. In Caracas. Jun. Jul. VV. H. 24.

755. Vanilla, Vanille.

- 1. V. aromatica. Pers. l. c. 2. p. 520. Gewürzhafte Vanille. Im wärmeren Amer. —. W.H. h. Epidendrum Vanilla. Lin. sp. pl. p. 1347.
 - 2. Eine noch unbeschriebene Art. v. Caracas.

756. Limodorum, Dingel.

1. L. Tankervilliae. Ait. hort. kew 3. p. 302. t. 12. Chinesischer Dingel. In China. Jun. Jul-VV. H. 21. Limodor. Incarvillei. Pers. l. c.

757. Cypripedium, Frauenschuh.

päischer Frauenschuh. In schattigen Wäldern v. Europa, May. Im F. 24.

HEXANDRIA.

.758. Aristolochia, Osterluzey.

- 1. A. trilobata. Pers. l. c. 2. p. 526. Dreylappige Osterluzey. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. b.
- 2. A. panduriformis. Pers. l. c. Geigenblättrige Osterluzey. In Caracas. —. W. H. 5.
- 3. A. Siphe. Pers. I. c. Großblättrige Osterluzey. Auf den Alleghanischen Bergen von Carolina gegen Florida. May. Im F. 5.
- 4. A. glauca. Pers. i. c. 2. p. 527. Graubiättrige Osterluzey. In Portugall u. der Barbarey. Inn. Jul. K. H. t.

- 5. A. oblongata, Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 29. t. 183. Verlängerte Osterluzey. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.
- 6. A. sempervirens. Pers. l. c. Immergrune Osterluzey. In Candien. Jun. Aug. K. H. 5.
- 7. A. Serpentaria. Pers. l. c. Arzeneykräftige Osterluzey. In Virginien. Jul. Sept. K. H. 4.
- 8. A. rotunda. Pers. l. c. Runde Osterluzey. In Ital. Südfrankr. u. Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.
- 9. A. Clematitis. Pers. l. c. Gemeine Osterfuzey. In Oesterr. Frankr. u. der Tartarey. Jul. Im F. 24.

CLASSIS XX.

MONOECIA.

MONAND RIA.

759. Casuarina, Streitkolbenbaum.

1. C. equisetifolia. Pers. l. c. 2. p. 531. Indischer Streitkolbenbaum. In Ostind. u. den Inseln des stillen Meeres. März, Apr. W. H. 5.

TRIANDRIA.

760. Tripsacum, Löchergras.

1. Tr. monostachyon. Pers. I. c. 2. p. 533. Einähriges Löchergras. In Südcarolina. Jun. Jul. VV. H. 24.

761. Coix, Thranengras.

1. C. Lachryma, Pers. l. c. Hiobs - Thränengras. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. 21.

762. Comptonia, Comptonie.

1. C. asplenifolia. Pers. l. c. 2. p. 549. Streifenfarrenblättrige Comptonie. In Virginien u. auf hohen Bergen in Carolina. —. Ch. b. Liquidambar asplenifol. Lin. sp. pl. p. 1418.

763. Tragia, Tragie.

1. Tr. volubilis. Pers. l, c. Windende Tragie. In Westind. auf Kalkboden. Apr. May. u. Aug. Sept. W. H. b.

764. Hernandia, Hernandie.

- n. H. sonora. Pers. I. c. 2. p. 550. Tönende Hernandie In beyden Indien. -. VV. H. b.
- 2. H. ovigera. Pers. l. c. Eyertragende Hernandie. In Ostind. —. W. H. 5.

TETRANDRIA.

765. Aucuba, Aucube.

r. A. japonica, Pers. l. c. Japanische Aucube. In Japan. Apr. — Jun. Ch. t.

766. Alnus, Erle.

- 1. A. glutinosa. Pers. l. c. Gemeine Erle. Am Wasser in den nördlichen Theilen von Eur. Asien, Africa u. America. Apr. Im F. h. Betula Alnus. Lin. sp. pl. p. 1394.
 - B. laciniata. Mit zerschlitzten Blättern.
- 2. A. incana. Pers. I. c. Graue Erle. Auf Bergen in Oesterr, Steyerm. Tyrol, Salzb. der Schweiz u. Nordamer. dann in Sandgegenden Preussens u. Lapplands. März. Im F. h. Betula incana. Lin. suppl. 417.
 - 3. A. serrulata. Pers. 1. c. Hasel-Erle. Von Pensylvan. gegen Carolina zu. Apr. Im F. h. Betula serrulata. Ait. hort kew. 3. p. 338.

767. Cicca, Cicca.

- 1. C. distidin. Pers. l. c. 2. p. 451. Zwey-zeilige Cicca. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. h. Averrhoa acida. Lin. sp. pl. p. 613. Phyllanthus longifolius. Jacq. host. schoenbr. 2. p. 36. t. 194.
 - 2. C.? Von Madagascar.

768. Buxus, Buchsbaum.

- 1. B. sempervirens. Pers. 1. c. Gemeiner Buchsbaum. In Sudeur. May, Jun. Im F. 5.
 - 8. arborescens. Mit baumartigem Wuchse.
 - 7. foliis variegatis. Mit fleckigen-
 - 2. B. balearica. Pers. 1. c. Balearischer Buchebaum. Auf den Balearischen Inseln. Iun. K. H. 5.

769. Pachysandra, Bickfaden.

1. P. procumbens. Pers. l. c. Liegender Dickfaden. Auf den Alleghauischen Bergen in Nordamer. März. Apr. Im F. 24.

770. Diotis, Doppelohr.

1. D. ceratoides. Willd. sp. pl. 4. p. 368.
Orientalisches Doppelohr. In Mähren, der Tartarey, Armenien u. dem glücklichen Arabien. Jul.
Aug. Im F. t.
Ceratospermun papposum. Pers. l. c.
Axyris Ceratoides. Lin. sp. pl. p. 1389.

771. Urtica, Nessel

- ». U. pilulifera. Pers. l. c. 2. p. 552. Romische Nessel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. U. crassifolia. Pers. l. c. Dickblättrige Nessel. Im wärmer. Amer. ? May — Jul. VV, H. 5.
- 3. U. cannabina. Pers. l. c. 2. p. 553. Hanfblättrige Nessel. In Sibisien. Jun. Jul. Im F. 24.
- 4. U. canddensis. Pers. l. c. 2. p. 554. Canadische Nessel. In Canada u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 21.
- 5. U. nivea. Pers. l. c. 2. p. 555. Schnee-weisse Nessel. In China auf Mauern. Jul. Ch. 24.
- 6. U. caracasana, Pers. I. c. Caracasanische. Nessel. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. b.
- 7. U. baccifera, Pers. l. c. Beerentragende Nessel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. 1.

772. Parietaria, Glaskraut.

- 1. P. officinalis. Pers. L. c. Gemeines Glaskraut. In Eur. Jun. Jul. Im F. 21.
- 2. P. cretica. Pers. 1. c. Candisches Glas-Jrant. In Candien u. am Caspischen Meere. Jun. Jul. Im F. O.

773. Boehmeria, Böhmerie.

- t. B. cylindrica. Pers. l. c. 2. p. 556. Walzenährige Böhmerie. In Nordamer. an feuchten Plätzen u. in. Jamaica. Sept. Dec. Ch. 24. Urtica cylindrica. Lin. sp. pl. p. 1396.
- 2. B. ramiflora. Pers. 1. c. Astblüthige Böhmerie. Zu Jamaica u. Martinique. May, Jun. W.H. t. Caturus ramiflorus. Lin. mant. 127.
- 3. B. rubescens. Jacq. fragm. bot. p. 8. n. 30. t. 5. f. 1. Röthliche Böhmerie. Zu Teneriffa auf waldigen feuchten Bergen. Jun. Jul. K. H. h. Boehmeria arborea. Pers. 1. c. Parietaria arborea. Ait. bort. kew. 3. p. 429.

774. Dorstenia, Dorstenie.

1. D. Contrajerva. Pers. l. c. 2. p. 557. Wurmtreibende Dorstenie. In Südamer. Jul. Aug. W. H. 24.

775. Morus, Maulbeere.

In China u. Persien. May, In F. 5.

- 2. M. tartarica. Pers. l. c. Tartarisché Maulbeere. An der Wolgan May. Inf F. b.
- 3. M. nigra. Pers. 1. c. Schwarze Maulbeere. In Südeuropa u. Persien. May 1m F. 5.
- 4. M. rubra. Pers. 1. c. 2. p. 558. Rothe Maulbeere. In Canada u. Florida. May. Im F. 5.
- 5. M. mauritiana. Pers. l. c. Scharfblättrige Maulbeere. Auf der St. Moritginsel. Jun. Jul. W. H. b.

PENTANDRIA.

776. Ambrosia, Ambrosie.

1. A. peruviana. Pers. l. c. 2. p. 559. Peruvianische Ambrosie. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 4.

777. Amaranthus, Amaranth.

- i. A. tricolor. Pers. I. c. Dreyfarbiger Amaranth. In Ostind. China. Jul. Aug. Im F. O.
- 2. A. bicolor. Pers. l. c. Zweyfarbiger Amaranth. In China? Jul. Ang. Im F. O.
- 3. A. tristis. Pers. l. c. 2. p. 560. Trauriger Amaranth. In Ostind. n. China. Jun. — Aug. Im F. O.
- 4. A. lividus. Pers. l. c. Braunblättriger Amaranth. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ⊙.
- 5. A. viridis. Pers. l. c. Grüner Amaranth. In Jamaica u. Brasilien, Jun. — Aug. Im F. O.
- 6. A. sanguineus. Pers. 1. c. Blutiarbiger Amaranth. Auf den Bahamainseln. Jul. Aug. Im F. 🔾 .

7. A. caudatus. Pers. 1. c. Geschwänzter Amaranth: In Peru, Persien u. Rufsland. Jun. Jul. Im F. Q.

POLYANDRIA.

278. Begonia, Begonie.

- 1. B. mitida. Pers. 1. c. 2. p. 564. Glänzende Begonie. Auf Bergen zu Jamaica. Sept. W. H. b.
- 2. B. odorata. Willd. enum. suppl. p. 64. Wohlriechende Begonie. —. Jul. Aug. W. H. b.
- 3. B. dichotoma. Pers. 1. c. Gabelästige Begonie. In sumptigen Wäldern zu Caracas. Apr. — Aug. VV. H. h.
- 4. B. stipulacea. Pers. 1. c. Afterblättrige Begonie. ... Marz, Apr. W. H. b.
- 5. B. acuminata. Pers. l. c. Zugespitzte Begonie. Auf Bergen in Jamaica. Apr. — Aug. VV. H. 5.
- 6. B. hirsuts. Pers. 1. c. Ranhe Begonie. Auf Felsen zu Gujana. März. — Aug. W. H. 2.
- 7. B. discolor. Hort. parisiensis. Zweyfarbige Begonie, -. Jun, - Sept. W. H. 4.

779. Amirola, Amirole.

4. A. nitida. Pers. l. c. 2. p. 565. Glänzende Amirole. In Peru. Jul. Ch., 5.

780. Ailanthus, Götterbaum.

1. A. glundulosa. Pers. l. c. Drüsiger Gőtterbaum. In Chiña, Jul. Im F. h.

781. Juglans, Wallnuss.

- 1. J. regia. Pers. I. c. 2. p. 566. Gemeine Wallnuss. In Persien. Apr. May. Im F. h.
- 2. J. nigra. Pers. 1. c. Schwarze Wallnufs. In Pensylvan. u. Florida. May. Im F. f.
- 3. J. cinerea. Pers. l. c. Graue Wallnuss. Am Meeresstrande in Canada, Pensylvan. u. den Alleghanischen Bergen. May. Im F. h.
- 4. J. alba. Pers. 1. c. Weifse Wallnufs. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May, Im F. b.

782. Quercus, Eiche.

- 1. Q. Phellos. Pers. 1. c. 2. p. 567. Weiden-Eiche. In Nordamer. — Im F. 5.
- 2. Q. maritima. Pers. 1. c. Meeresstrands-Eiche Am Meeresstrande in Carolina. — K. H. h.
- 3. Q. virons. Pers. l. c. Grünende Eiche. In Virgin. am Meeresstrande u. gegen Florida zu. May. Im F. h.
- 4. Q. Hex. Pers. 1. c. 2. p. 568. Stein-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. h.
- 5. Q. Suber, Pers. l. c. Kork-Eiche In Südeur, u. Nordafr. May, K. H. 5.
- 6. Q. oecoifera. Pers. 1. c. Kermes-Eiche. In Sudeur. n. im Orient. - K. H. 5.

- 7. Q. Prinus. Pers. l. c. Castanienblättrige Eiche, In Pensylv. Carol. Virgin. u. Florida. —. Im F. h.
- 8. Q. tinctoria. Pers. l. c. Quercitronen-Eiche. In Pensylvan. u. auf hohen Bergen in Carolina u. Florida. —. Im F. b.
- 9. Q. rubra. Pers. l. c. Rothe Eiche. In Canada u. Carolina. —. Im F. h.
- 10. Q. coccinea. Pers. l. c. Scharlach-Eiche. In Virgin. u. Carol. -. Im F. 5.
- 11. Q. Aegilops. Pers. l. c. 2. p. 570. Knopper Eiche. In Span. u. im Orient. Im F. 5.
- 12. Q. alba. Pers. l. c. Weisse Eiche. In Canada bis gegen Florida. lm F. h.
- 13. Q. Robur. Pers. l. c. Gemeine Eiche. In Eur. May. Im F. b.
- 14. Q. pedunculata. Pers. l. c. Stiel Eiche. In Eur. May, Im F. t.
- 15. Q. pubescens. Pers. l. c. Weichhaarige Eiche. In Oesterr. Ungarn, der Krimm, in Frankr. u. England. May. Im F. p.
- 16. Q. austriaca, Pers. 1. c. Oesterreichische Eiche. (Cerr-Eiche). In Oesterr. Ungarn. u. Krain. May. Im F. b.

783. Corylus, Haselnuss.

- 1. C. Avellana. Pers. l. c. Gemeine Haselnuss. In Eur. u. Asien. März. Im F. t.
- 2. C. tubulosa. Pers. I. c. Lamberts-Haselnuss. In Südeur, März. Im F. h.

- 3. C. rostrata. Pers. l. c. Geöhrte Haselnuss. In Canada u. Florida. März, Apr. Im F. b.
- 4. C. colurna. Pers: I. c. Byzantinische Haselnufs. Bey Constantinopel. März. Im F. 5.

784. Fagus, Buche.

- 1. F. sylvatica. Pers. l. c. Roth-Buche. In Eur. May. Im F. h.
 - β. sanguinea. Mit blutrothen Blättern.
 γ. asplenifolia. Mit Streifenfarrn Blättern.

785. Castanea, Castanie.

1. C. vesca. Pers. l. c. Aechte Castanie. In Südeur. Jun. Im F. b. Fagus Castanea. Lin. sp. pl. 1416.

786. Betula, Birke.

- 1. B. alba. Pers. l. c. 2. p. 572. Weisse Birke. Im nördlicher. Eur. u. Asien. März, Apr. Im. F. h. ß pendula. Mit hängenden Aesten.
- 2. B. populifolia, Pers. l. c. Pappel-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. 3.
- 3. B. davurica. Pers. 1. c. Davurische Birke. In Ostsibirien u. Canada. Apr. Im F. t.
- 4. B. nigra. Pers. 1. c. Schwarze Birke. In Canada u. Virgin. Apr. Im F. 3.
- 5. B. papyracea. Pers. 1. c. Papier-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. 5.
- 6. B. lenta. Pers. 1. c. Zähe Birke. In Nordamer. Apr. Im F. b.

- 7. B. nana. Pers. l. c. Zwerg-Birke. Auf Alpen in Eur. May. Im F. b.
- 8. B. fruticosa. Pers. 1. c. Strauchartige Birke. In Ostsibirier u. auf den Oesterreich u. Bayer'schen Alpen. Apr. May. Im F. h.
- 9. B. pumile. Pers. l. c. Niedrige Birke. In Nordamer. Apr. May. Im F. b.

787. Carpinus, Hainbuche.

- 1. C. Betulus. Pers. l. c. Gemeine Hainbuche. In Hainen v. Eur. May. Im F. t.
- 2. C. orientalis. Pers. l. c. 2 p. 573. Orientalische Hainbuche. In Krain, Sclavon. dem Banat u. in Armenien. May. Im F. h.

788. Ostrya, Hopfenbuche.

- 1. O. vulgaris. Pers. l. c. Gemeine Hopfenhuche. In Südeur. May. Im F. h. Carpinus Ostrya. Lin. sp. pl. p. 1417.
- 2. O. virginica. Pers. l. c. Virginische Hopfenbuche. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May. Im F. t...
 Carpinus virginiana. Ait. hort. kew. 3. p. 363.

789. Platanus, Platanus.

- 1. Pl. orientalis. Pers. 1. c. Morgenländischer Platanus. Im Orient. May, Jun. 1m F. b.
- 2. Pl. acerifolia. Pers. 1. c. Ahornblättriger Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. t.
- 3. Pl. occidentalis. Pers. 1. c. Abendländischer Platanus. In Nordamer. May, Jun. Im F. 5.

4 790. Liquidambar, Amberbaum.

1, L. Styraciflua. Pers. l. c. Fliefsender Amberbaum. In Nordamer. März. Apr. Im F. b.

791. Salisburia, Salisburie.

1. S. adianthifolia. Smith act. soc. lin. lond. 3. p. 330. Krullfarrenblättrige Salisburie. In Japan. — Im F. h. Ginkgo biloba. Pers. l. c.

792. Arum, Aron.

- 1. A. Dracunculus. Pers. 1. c. 2. p. 574. Punctirter Aron, In Südeur. May, Jun. Im F. 24.
- 2. A. Dracontium. Pers. l. c. Vielblättriger Aron. In Nordamer. May, Jun. Im F. b.
- 3. A. Colocasia. Pers. I. c. Aegyptischer Aron. In Candien, Cypern, Syrien u. Aegypten. May, Jun. Ch. 24.
- 4. A. divaricatum. Pers. 1. c. Ausgebreiteter Aron. In Ostind. Apr. — Aug. W. H. 4.
- 5. A. maculatum. Pers. I. c. Gemeiner Aron. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. 4.
- 6. A. Arisarum. Pers. 1. c. Kappenförmiger Aron. In Ital. Portug. Span. u. der Provence. Jun. K. H. 21.
 - 7. A.? pinnatum. Hort. paris.

793. Caladium, Caladium.

1. C. helleborifolium. Pers. l. c. 2. p. 575. Christwurzblättriges Caladium, In Wäldern zu Martinique u. Caracas. Jun. Jul. W. H. 4. Arum helleborifol. Jacq. ic. rar. 3. t. 613. Collect. 3. p. 217.

- 2. C. pinnatifidum. Pers, 1/c. Halbgefieder tes Caladium. In schattigen Wäldern 22 Caracas. März — Aug. VV. H. h. Arum pinnatifid, Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 31.t.187.
- g. C. bicolor. Pers. l. c. Zweyfarhiges Calsdium. in Brasilien. Jun. Jul. W. H. t.. Aram bicolor. Ait. hort. kew. 3. p. 316.
- 4. C. sagittifolium. Pers I. c. Pfeilblättriges Caladium. In Brasilien, Jamaica u. zu Barbados. Jun. Jul. VV. H. 21.
 Arum sagittifol. Lin. sp. pl. p. 1369.
- 5. C. belophyllum. Willd. enum. 2. p. 987. VVurfspieisblättriges Caladium. . . VV. H. h.
- 6. C. segainum. Pers. l. c. Giftiges Caladium. Auf den Caraibischen Inseln an feuchten Stellen. Jun. Jul. VV. H. h.
 Arum seguinum. Lin. sp. pl. p. 1371.
- 7. C. xanthorrhizon. Pers. l. c. Gelbwurzliges Caladium. —. Apr. W. H. h. Arum xanthorrh. Jacq. hort. schoenbr. 2. p.32.1.188.
- 8. C. arborescens. Pers. l. c. Baumartiges Caladium. In Westind. Jun. Jul. W. H. h. Arum arboresc. Lin. sp. pl. p. 1371.
- 9. C. grandifolium. Pers. l. c. Großblättriges Caladium. Zu Caracas. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. t. . Arum grandifol. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 34.1,189.
- 10. C. lacerum. Pers. 1. c. Zerschlitztes Ca-
- ladjum. Zu Caracas u. Jamaica? Jun. Jul. W. H. h. Arum lacerum. Jacq. hort. schoenbr. 4.p. 35.t. 468.
- 11. C. tripartitum. Pers. l. c. Dreytheiliges Caladium. Zu Caracas. May Jul. W. H. h. Arum tripartitum. Jacq. hort. schoenbr. 2.p. 33.1, 190.

dium. In Jamaica, Hispaniola u. Caracas. Aug.

Oct. W. H. b.

Arum auritum. Lin. sp. pl. p. 1371.

794. Caryota, Brennpalme.

1. C. urens. Rors. 1. c. 2. p. 576. Ostindische Brennpalme. In Ostind. - . VV. H. h.

MONADELPHIA.

795. Pinus, Fichte.

- 1. P. sylvestris. Pers. l. c. 2. p. 578. Gemeine Fichte. (Weise-Föhre). Im nördlicher. Eur. May. Im F. h.
- 2: P. Pamillo. Pers. 1, c. Krummholz-Fichte. Auf den Oesterr. Salzh. Krainersch. Schlesischen Alpen u. den Carpathen. May, Jun. Im F. 5.
- 3. P. Laricio. Pers. l. c. Korsische Fichte-In Corsica auf Bergen. — . K. H. 5.
- 4. P. Pinaster. Pers. I. c. Italianische Fichte. (Schwarz-Föhre). In Oesterr. u. Südeur. May, Jun. Im F. 5.
- 5. P. maritima. Pers. l. c. Meerstrands-Fichte. Am Meerstrande in Südeur. May. K. H. 5.
- 6. P. Pinsa. Pers. 1. c. Geniessbare Fichte. (Pignole). In Ital. Südfrankr. u. Span. May. K.H. h.
- 7. P. Taeda. Pers. 1. c. Dreynadlige Fichte In Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. 5.
- 8. P. Cembra. Pers. 1. c. Zirbel-Fichte: Auf Alpen in Südeur. u. Sibir. May. K. fl. 3.

- 9. P. Strobus. Pers. 1. c. 2 p. 579. Weymuths-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. 5.
- 10. P. Cedrus. Pers. l. c. Ceder-Fichte. Auf dem Libanon, Taurus, u. Amanus. May, Jun.K.H. b.
- Fichte. An der Hudsondsbay, May, Jun. Im F. b. P. laricina. Du Roi harble 2. p. 83.
- 12. P. Larix. Pers. l. c. Lerchen Fichte. Auf Alpen im suddicher Eur. May, Jun. Im F. h.
- 13. P. Picca. Pers. 1. c. Tannen Fichte (Gemeine Tanne). Auf Alpen u. Bergen in Eur. May, Jun. Im F. b.
- 14. P. Balsamea. Pers. l. c. Balsam-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. 5.
- . 15. P. alba. Pers. l. c. Weise Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. 5. Pinns canadensis. Du Roi harbk. 2. p. 124.
- 16. P. taxifolia. Pers. l. c. Nootka-Fichte. An den östlichen Meeresküsten v. Nordamer. —. Im F. h.
- 17. P. canadensis. Pers. l. c. Hemlocks-Fichte: In Nordamer. May, Jun. Im F. b. P. americana. Du Roi harbk. 2. p. 107.
- 18. P. Abies. Pers. 1. c. Edel-Fichte. (Weiß-Tanne). Im nördlichen Eur. u. Asien. May, Jan. Im F. t.

796. Thuja, Lebensbaum.

1. Th. occidentalis. Pers. l. c. 2. p. 580. Gemeiner Lebensbaum. In Canada u. Sibirien. Apr. Im F. b.

scher Lebensbaum. In Ching u. Japan. Apr. May. Im F. 5.

797. Cupressus, Cypresse.

- presse. In Candien, Ital. u. Span. Apr. K. H. 5.
 - B. horizontalis. Mit wagerechten Aesten.
- 2. C. distibha. Pers. I. c. Zweyzeyligd Cypresse. In Virgin u. Carol. Im F. b.
- 3. C. thyoides. Pers. 1. c. Weisse Cypresse. In Ganada. Im F. h.

798. Podocarpus, Fussfrucht.

1. P. elongata. Pers. 1. c. Capische Fussfrucht. Am Cap. —. Ch. ty. Taxus elongata. Ait. hort. kew. 3. p. 415.

799. Acalypha, Brennkraut.

- 1. A. caroliniana. Pers. 1. c. Carolinisches Brennkraut. In Wirgin. Florida v. Canada an Flüssen, Jun. Jul. Im F. O.
- 2. A. cuspidata. Pers. l. c. 2. p. 582. Zugespitztes Brennkraut. Zu Caracas. Aug. Oct. W. H. h.
- 3. A. diversifolia. Pers. l. c. Verschiedenblättriges Brennkraut. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.
- 4. A. virgata. Pers. 1. c. Ruthenförmiges Brennkraut. Im westlichen Jamaica. Jun. Jul. W. H. 5.

- 5. A. macrostachya. Pers. l. c. Langähriges Brennkraut. Zu Garacas. Jul. Aug. W. H. h.
- 6. A. polystachya. Pers. 1. c. 2. p. 583. Vielähriges Brennkraut. Aug. Sept. W. H. O.
- 7. A. soubrosa. Pers. l. c. Scharfes Brennkrant. Auf Kalkfelsen zu Jamaica. Jud. Aug. W.H. b.

800. Croton, Croton.

- 2. Cr. pungens. Pers. l. c. 2. p. 585. Stechendes Croton. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. b.
- 2. Cr. pennicillatum. Pers. l. c. Pinseldrüsiges Croton. Auf Cuba. Jul. Oct. W. H. h.
- 3. Cr. tomentosum. Hort. paris. Filziges Croton. —. W. H. h.
- 4. Cr. palmatum. Hort. paris. Handförmiges Croton. —. W. H. 5.

801. Alcurites, Alcurites.

1. A. moluccana. Pers. I. c. 2. p. 587. Moluckische Aleurites. Auf den Moluckischen Inseln u. auf Ceylon. —. VV. H. h. Jatropha moluccana. Lin. sp. pl. p. 1428.

802. Jatropha, Brechnuss.

- 1. J. panduraefolia. Pers. l. c. Geigenblättrige Brechnuss. Auf. Cuba. Apr. Aug. W. H. h.
- 2. J. Curcas. Pers. 1. c. Schwarze Brechnufs. Im wärmer. Amer. — . W. H. 5.
- 3. J. multifida: Pers. L. c. Vieltheilige Brechnuss. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. VV. H. b.

4. J. napaeifolia. Pers. 1. c. Zerschlitztblättrige Brechnuss. Auf den Antillen. Jun. Jul. VV. H. 5.

803. Ricinus, Wunderbaum.

- 1. R. communis. Pers. I. c. Gemeiner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. Q.
- 2. R. viridis. Pers. l. c. Grüner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. O.
- 3. R. africanus. Pers. 1. c. Africanischer Wunderbaum. In Nordafr. Jul. Aug. Ch. t.
- 4. R. inermis. Pers. l. c. 2. p. 588. Glattfrüchtiger Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. h.

804. Hura, Sandbüchsenbaum.

1. H. crepitans. Pers. I. c. Gemeiner Sandbüchsenbaum. In Mexico, Gujana z. Jamaica. Jul. Aug. W. H. 5.

805. Hippomane, Mancinellenbaum.

- 1. H. Mancinella. Pers. l. c. 2. p. 589. Gemeiner Mancinellenbaum. März, Apr. VV. H. b.
- 2. H. biglandulosa. Hort. paris. Zweydrüsiger Mancinellenbaum. . W. H. h.

806. Phyllanthus, Blattblume.

1. Ph. nutans. Pers. l.c. 2. p. 590. Hängende Blattblume. An Flüssen in Südamer. May — Aug. VV. H. h.

- 2. Ph. acuminatus. Pers. l. c. Zugespitzte Blattblume. Zu Cayenne. Apr. May. W. H. b.
 - 3. Ph. Niruri. Pers. l. c. Weisse Blattblume. In Ostind. n. Südamer. Jun. Aug. W. H.O.
 - 4. Ph. falcatus. Pers. l. c. 2. p. 591. Sichelblättrige Blattblume. Auf den Bahamainseln. Jun. — Oct. VV. H. 5. Kylophylla falcata. Swartz prodt, 28.
 - 5. Ph. Arbuscula. Willd. enum. 2. p. 996. Banmartige Blatthlume. In Jamaica. May Aug. W. H. h.
 Phyllanthus speciosus. Pers. I. c.
 - 6. Ph. Epiphyllanthus. Lin. sp.pl. p. no 1392. Schmalblättrige Blattblame. In Jamaica, Apr. Oct. W. H. 5. Phyllanthus angustifolius. Pers. l. c. Xylophylla angustifolia Swartz prodr. 28.

807. Xylophylla, Holzblatt.

- 1. X. elongata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 53. t. 348. Langblättriges Holzblatt. In Westind. Apr. Oct. W. H. 5.
- 2. K. ramiflora. Ait hort, kew. 1.p. 376. Winkelblättriges Holzblatt. In Sibirien May Jul. K. H. 5.
 Phyllanthus ramiflor. Pers. I. c.
- 3. X. obovata. Willd. enum. 2. p. 329. Verkehrteyförmiges Holzblatt. — . — . W. H. h. Phyllanthus obovatus. Pers. 1. c. 2. p. 589-

808. Heritiera, Heritiere.

Auf Ceylon. - . VV. H. 5.

809. Momordica, Balsamapfel.

- 1. M. Balsamina. Pers. 1. c. 2. p. 592. Gemeiner Balsamapfel. In Ostind. Jun. W-H. O.
- 2. M. Charantia. Pers. l. c. Gurkenartiger Balsamapfel, In Ostind. Jun. W. H. O.
- 3. M. cylindrica, Pers. 1. c. 2. p. 593. Walzenförmiger Balsamapfel. Auf Ceylon u. zu China, Jun. W. H. .
- 4. M. Elaterium. Pers. l. c. Esels-Balsamapfel. In Südeur. Jun. Im F. O.

810. Cucurbita, Kürbis.

- 1. C. lagenaria. Pers. 1. c. Flaschen-Kürbis. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. C. Pepo. Pers. l. c. Garten Kürbis. Im Orient. Jun. Jul. Im F. O.
- 3. C. verrueosa. Pers. l. c. Warzen Kurbis.

 Jun. Jul. Im F. O.
- 4. C. Melopepo. Pers. l. c. Turban-Kürbis.

 Jun. Jul. Im F. O.
- 5. C. Citrullus. Pers. l. c. Wassermelonez-Kürbis. In Apulien, Calabrien u. Sicilien. Jun. Jul. Im F. O.

811. Cucumis, Gurke.

- 1. C. prophetarum. Pers. l. c. 2. p. 594. Propheten Kürbis. In Arabien u. Africa. Jun. Jul. Im F. O.
- 2. C. Anguria. Pers. 1. c. Eyformige Gurke. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. Q.
- g. C. Melo, Pers. l. c. Melonen-Gurke. In der Kalmückey. Jun. Jul. VV. H. ②.
- 4. C. Chate. Pers. l. c. Arabische Gurke. In Arabien n. Aegypten. Jun. Jul. W. H. O.
- 5. C. anguinus. Pers. 1. c. Schlangen-Kürbis. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. O.
- 6. C. sativus. Pers. l. c. Gemeine Gurke. In der Tartarey p. Ostind. Jun. Aug. Im F. O.

812. Bryonia, Zaunrübe.

- 1. Br. qlba. Pers. l. c. 2. p. 595. Schwarzbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 2. Br. dioica. Pers. I. c. Rothbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
- 3. Br. dissecta. Pers. l. c. Feinblättrige Zaunrübe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4. Bryonia africana. Lin. sp. pl. p. 1438.

813. Sicyos, Haargurke.

1. S. angulata. Pers. l. c. Eckige Haargurke. In Canada u. Pensylvan. Jul. Im F. O.

CLASSIS XXI.

DIOECIA.

MONANDRIA.

814. Pandanus, Pandanus.

- 1. P. utilis. Bory de St. Vincent itin. 2. p. 3. Nutzbarer Pandanus. Auf den Inseln Bourbon, Madagascar u. St. Moritz. —, W. H. h. P. odoratissima. Jacq. fragm. bot. p. 21. n. 74. t. 13. et 14. f. 1.
- 2. P. humilis. Pers. l. e. 2. p. 597. Kleiner Pandanus. Auf der St. Moritzinsel u. den Molucken. —. W. H. b.

DIANDRIA.

815. Vallisneria, Vallisnerie.

1. V. spinalis. Pers. 1. c. 2. p. 598. Spiralförmige Vallisnerie. In Wassergräben der Schweitz Italiens u. Südfrankreichs. Jul. Aug. K. H. 2.

816. Cecropia, Trompetenbaum.

1. C. politata. Pers. I. c. Schildförmiger Trompetenbaum. In Wäldern des wärmer. Jamaica u. Surinam. —. W. H. b.

817. Frazinus, Esche.

- 1. Fr. excelsior. Pers. 1. c. s. p. 604. Gemeine Esche. In Bur. May. Im F. b.
 - B. pendula. Mit hängenden Aesten.
 - 7. crispa. Mit krausen Blättern.
- 2. Pr. aurea. Willd. enum. 2. p. 1059. Goldfarbige Esche. — . May. Im F. b. . Fr. excelsior aurea. Pers. l. c.
- 3. Fr. simplicifolia. Willd. arb. 121. Einblättrige Esche. —. May. Im F. 5.
 Fr. excelsior simplicifolia. Pers. 1. c.
- 4. Fr. parvifolia. Pers. 1. c. Kleinblättrige Esohe. Im Orient? May, Im F. 1.
- 5. Fr. americana. Pers. l. c. Americanische Esche. May. Im F. b.
- 6. Fr. juglandifolia. Pers. l. c. Wallnusshlättrige Esche. In Nordamer. May, Im F. t.
- 7. Fr. pubescens. Pers. l. c. Weichhaarige Esche. In Pensylvan. May. Im F. 1. Fr. nigra. Du Roi harbk. ed. 2. 6. p. 398.
- 8. Fr. sambucifolia. Pers. l. c. 2. p. 605. Hollunderblättrige Esche. In Canada u. Pensylvaniem May. Im F. h.
- 9. Fr. caroliniana. Pers. 1. c. Carolinische. Esche. In Carolina. May: Im F. 5.
- 10. Fr. rotundifolia. Pers. l. c. Rundblättrige Esche. In Calabrien u. der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien. May. Im F. b.

11. Fr. Ornut. Lin. sp. pl. p. 1510. Blühende Esche. In Südeur. May. Im F. †. Ornus europaea. Pers. l. c. 1. p. 9.

818. Borya, Borya.

1. B. acuminata. Pers. l. c. Zugespitzte Berya. In Carolina u. Georgien. — K. H. h. Adelia acuminata. Mich. amer. 2. p. 225. t. 48.

TRIANDRIA.

819. Empetrum, Rauschbeere.

1. E. nigrum. Pers. l. c. Schwarze Rauschbeere. Auf Bergen in den kältesten Theilen Europa's. —. Im F. h.

820. Osyris, Osyris.

1. O. alba. Pers. l. c. 2. p. 606. Weiße Osyanis. In Sudeur. Jun. Jul. K. H. b.

821. Ficus, Feige.

- 1. F. Carica. Pers. I. c. 2. p. 668. Gemeine Feige. In Südeur. Asien u. Africa. Aug. Oct. K. H. b.
- 2. F. nymphaeifolia. Pers. 1. c. Secrosen-blättrige Feige. Zu Caracas. W. H. h.
- 3. F. populifolia. Pers. 1. c. Pappelblättrige Feige. Im glütklichen Arabien. —. W. H. b.
- 4. F. réligiosa. Pers. l. c. Heilige Feige. In Ostind. März. Apr. W. H. 3.

- g. F. bengalensis. Pers. 1. c. 2. p. 609. Bengalische Feige. In Ostind. Jun. Aug. W. H. b.
- 6. F. venosa. Pers. 1. c. Aderige Feige. In Ostind.? Jul. Sept. W. H. h.
- 7. F. citrifolia. Pers. l. c. Citronenblättrige Feige. In Ostind. —. W. H. h.
- 8. F. martinioensis. Vers. 1. c. Martinikische Feige. In Westind. VV. H. 5.
- 9. F. cordata. Pers. l. c. Herzblättrige Feige. Am Cap. —. Ch. 5. F. capensis. Hortulan.
- 10. F. glandulosa. Hort. carlsruh. Drüsige Feige. Jul. Aug. W. H. B.
- 11. F. australis. Willd. sp. pl. 4. p. 1138. Südliche Feige. In Neuholl. Ch. t. F. rabiginosa. Pers. l. c.
- 12. F. stipulata. Thunh. diss. de Ficub. n. 7. Kletternde Feige. In China u. Japan. Nov. Dec. W. H. t., F. scandens. Pers. 1. c.
- 13. F. glaucophylla. Pers. 1. c. 2. p. 610. Granblättrige Feige. . W. H. t.
- 14. F. benjamins. Pers. 1. c. Benjamin-Feige. In Ostind. . W. H. b.
- 15. F. pertusa. Pers. l. c. Durchlöcherte Feige. In Surinam. - W. H. b.
- 16. F. terebrata. Pers. I. c. Durchbohrte Feige. Auf der St. Moritzinsel. u. in Ostind. — W. H. b.
- 17. F. nitida, Pers. I. c. Glänzende Feige. In Ostind, —. W. H. t.

18. F. racemosa. Pers. l. c. Traubige Feige. In Ostind. — W. H. b.

19. F. mauritians. Pers. l. c. 2. p. 611. Erd-Feige. Auf der St. Moritzinsel n. Bourbon. —. W. H. h...
F. terragena. Bory de St. Vincent itin. 2. p. 143.

20. F. oppositifelia. Roxb. fl. corom. 2. p. 14. t. 124. Paarblättrige Feige. In Ostind. Jun. Aug. W. H. 5. F. scabra. Pers. l. c.

TETRANDRIA.

822. Broussonetia, Broussonetie.

1. Br. papyrifera. Pers. l. c. 2. p. 612. Papiergebende Broussonetie. In Japan u. den Inseln des stillen Meeres. May. Im F. h.
Morus papyrifera. Lin. sp. pl.p. 1399.

823. Anthospermum, Amberstrauch.

1. A. aethiopicum. Pers. l. c. Gewöhnlicher Amberstrauch. Am Cap. - . Ch. t.

824. Viscum, Mistel.

1. V. album. Pers. l. c, 2. p. 613. Weisse Mistel. In Enr. schmarotzend auf Bäumen. März, Apr. Im F. b.

825. Brucea, Brucea.

ne Brucea, In Abyssinien. Febr. März. W.H. b.

826. Hippophae, Sanddorn.

- 1. H. Rhamnoides. Pers. 1. c. Weidenblättriger Sanddorn. Am Meeresstrande in Nord-u. aut Felsen in Südeuropa. May, Jun. Im F. t.
- 2. H. canadensis. Pers. l. c. Canadischer Sanddorn. In Canada. Jun. Im F. 5.

827. Myrica, Gagel.

- 1. M. Gals. Pers. 1. c. Gemeiner Gagel. In Südeur. u. Nordamer. May. Im F. h.
- 2. M. serifera, Pers. l. c. Wachsgebender Gagel. In Pensylvan. n. Carolina. Jul. — Sept. K. H. b.
- 3. M. carolinensis. Pers. 1. c. Carolinischer Gagel Am Meeresstrande in Pensylvan. u. Florida. K. H. 5.
 M. pensylvanica. Duham. arb. 2. p. 190. t. 52.
- 4. M. Faya. Pers. 1. c. Azorischer Gagel. In Portugall, Madera u. den Azorischen Inseln. Jun. — Aug. K. H. t.
- 5. M. segregata. Pers. l. c. Lanzettblättriger Gagel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. Ch. b.
- 6. M. serrata. Pers. 1. c. Gesägter Gagel-Am Cap. — Ch. 5. M. banksiaefolia. Wendl. collect. pl. 1. p. 70. t. 24.
- 7. M. laciniata, Willd. enum. 2. p. 1018. Schlitzblättriger Gagel. Am Cap. — . Ch. b. M. quercifolia. Jacq. fragm. bot. p. 2. n. 7. t. 1. f. 4.
- 8. M. quercifolia. Pers. l. c. Eichenblättriger Gagel. Am Cap. Apr. May. Ch. 5.

9. M. sordifolia. Pers. l. c. Herzblättriger Gagel. Am Cap. - . Ch. h.

PENTANDRIA.

828. Pistacia, Pistacie.

- 1. P. vera. Pers. 1. c. 2. p. 615. Acchte Pistacie. In Persien, Arabien, Syrien u. Indien. Jun. Jul. K. H. b.
 - 2. P. Terebinthus. Pers. l. c. Terpentin Pistacie. In Südeur. u. Nordasien. May, Jun. K.H. b.
 - 3. P. Lentiscus. Pers. l. c. Mastix-Pistacie. In Portugall, Spanien, Ital. u. Persien. May, Jun. K. H. 1).

829. Zanthoxylum, Zahnwehholz.

1. Z. fraxineum. Pers. I. c. Eschenblättriges Zahnwehholz. In Canada, Pensylvan. u. Virgin. May. Im F. tj.

830. Picramnia, Bitterstrauch.

1. P. Antidesma. Pers. l. c. 2. p. 617. Langtraubiger Bitterstrauch. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. b.

831. Antidesma, Giftstiller.

1. A. alexiteria. Pers. 1. c. Glänzender Giftstiller. In Ostind. — W. H. b.

832. Humulus, Hopfen.

1. H. Lupulus. Pers. l. c. 2. p. 618. Gemeiner Hopfen. In Eur. n. Nordamer. May, Im F. 4.

833. Ceratonia, Johannisbrodbaum.

1. C. Sciliqua. Pers. l. c. Gemeiner Johannishrodbaum. In Apulien, Sicilien, Candien, Cypern, Syrien, Palästina u. im ganzen Orient. Jul. Aug. K. H. t.

HEXANDRIA.

834. Smilax, Smilax.

- 1. Sm. aspera. Pers. l. c. Stachelblättriger Smilax. In Ital Span. Palästina u. Virginien. Aug. Sept. K.- H. b.
- 2. Sm. Sarsaparilla. Pers. l. c. 2. p. 619. Sarsaparillen Smilax. In Virgin. K. H. h.
- 3. Sm. rotundifolia. Pers. L. c. Ruadblättriget Smilax. In Canada u. Pensylvan. März, Apr. K.H. h.
- 4. Sm. tamnoides. Pers. 1. c. Schmeerwurzartiger Smilax. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. 5.

835. Dioscorea, Yamswurzel.

- 1. D. bulbifera. Pers. 1. c. 2. p. 621. Knollentragende Yamswurzel. In Ostind. Jun. VV.H. 4.
- 2 D. villesa. Pers. l. c. Feinbeharrte Yams-wurzel. In Virgin. Florida u. Canada. Jul. Aug. K. H. 24.

836. Phoenix, Dattelpalme.

- 1. Ph. dactylifera. Pers. l. c. 2. p. 622. Gemeine Dattelpalme. In der Barbarey, Aegypt. Syrien, Persien v. Ostind. Jul. Aug. W. H. b.
- 2. Ph. reclinata. Pers. 1. c. Schlaffe Dattelpalme. In den inneren Gegenden am Cap. —.W. H. 5.

837. Gleditschia, Gleditschie.

1. Gl. triacanthos. Pers. l. c. 2. p. 623. Dreydornige Gleditschie. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamerica. Jun. Jul. Im F. 5.

B inermis. Mit stachellosem Stamme.

- 2. Gl. monosperma. Pers. l. c. Einsamige Gleditschie. In Carolina, Georgien u. Florida. Jun. Jul. Im F. h.
 - 3. Gl. horrida. Pers. l. c. Langdornige Gleditschie. In China. Jun. Jul. Im F. h.

OCTANDRIA.

838. Populus, Pappel.

- . 1. P. alba. Pers. l. c. Silher-Pappel. In Schweden, England, Frankr. Deutschl. u. Italien. März. Apr. Im F. h.
- 2. P. tremula. Pers. l. c. Zitter Pappel. In Eur. März. Apr. Im F. h.
- 3. P. laevigata. Pers. l. c. Glatte Pappel. In Nordamer. März. Apr. Im F. h.,

- 4. P. graeca. Pers.l.c. Griechische Pappel. Auf den Archipelagischen Inseln. März. Apr. Im F. h.
- 5. P. nigra. Pers. l. c. Schwarze Pappel. In Mitteleur. März, Apr. Im F. b.
- 6. P. dilatata. Ait. hort.kew.3.p.406. Lombardisehe Pappel. In Italien. — Im F. h.' P. fastigiata. Pers. l. c.
- 7. P. monilifera, Pers. l. c. Canadische Pappel. In Canada u. Pensylvan. —. Im F. 5.
 - 8. P. angulata. Pers. l.c. 2. p. 624. Eckige Pappel. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. —. Im F. b.
 - 9. P. balsamifera. Pers. 1. c. Balsam-Pappel. In Nordamer. u. Sibirien. Im F. t. P. Tacamahaca. Mill. dict. n. 6,

839. Diospyros, Dattelpflaume.

- 1. D. Lotus. Pers. l. c. Italienische Dattelpflaume. In Languedoc Ital. u. Mauritanien. May, Jun. K. H. h.
- 2. D. virginiana. Pers. l. c. Virginische Dattelpflaume. In Nordamer. May, Jun. Im C. t.
- 3. D. Ebenum. Pers. 1. c. Ebenholz Dattelpflaume. In Wäldern auf Ceylon. —. W. H. b.
- 4. D. Kaki. Pers. 1. c. Japanische Dattelpflaume. In Japan. —. Ch. b.

ENNEANDRIA.

840. Triplaris, Dreyling.

1. Tr. americana, Pers. 1. c. 2. p. 626. Americanischer Dreyling, In Wäldern zu Carthagena u. Gujana, —, W. H. t.

DODECANDRIA.

841. Carica, Melonenbaum.

- 1. C. Papaya. Pers. l. c. Gemeiner Melonenbaum. In Ostind. May - Aug. W. H. 1.
- 2. C. cauliflora. Pers. I. c. Stammblüthiger Melonenbaum. Zu Caracas. Apr. — Oct. W. H. B.
- 3. C. microcarpa, Pers. 1. c. Kleinfrüchtiger Melonenhaum. Zu Caracas u. Chili. Apr. — Oct. W. H. 5.
- 4. C. citriformis. Jacq. eclog. fasc. 7. p. 101. \
 n. 68. 69. Citronenartiger Melonenbaum. In
 Guinea. Jul. Aug. VV. H. 5.
- 5. C. monoica. Pers. l. c. Einhäusiger Melonenbaum. — Febr. März. VV. H. b.

842. Gymnocladus, Chicot.

1. G. canadensis. Pers. l. c. Canadischer Chicot. In Canada. May, Jun. Im F. b. Guilandina dioica. Lin. sp. pl. p. 546.

843. Kiggellaria, Kigellarie.

1. K. africana. Pers. I. c. Gesägte Kiggellarie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 3.

844. Schinus, Molle.

1. Sch. Molle. Pers. l. c. Hängender Molle. In Brasilien u. Peru. -. Ch. b.

845. Coriaria, Gerberstrauch.

1. C. myrtifolia. Pers. L.c. Myrthenblättriger Gerberstrauch. In Südfrankr. Spanien u. der Barbarey. Jul. Aug. Im F. 24.

DODECANDRIA.

846. Stratiotes, Siggel.

1. St. Aloides, Pers. 1. c. 2. p. 627. Aloeartige Siggel, In reinen stillen Wässern des nördlicheren Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

847. Ruelea, Euclea.

1. E. racemesa. Pers. l. c. Traubenförmige Eucles. Am Cap. Jun. - Ang. Ch. b.

848. Datisca, Strickkraut.

1. D. cannabina. Pers. 1. c. Hanfartiges Strickkraut, In Candien. Jun. Jul. Im F. 24.

849. Menispermum, Mondsame.

- 1. M. canadense. Pers. l. c. Canadischer Mondsame. In Virgid u. Canada. Jun. Jul. Im F. 5.
 - e. M. carolinum. Pers. I. c. Carolinischer Mondsame. In Nordamer. . K. H. .

ICOSANDRIA.

850. Flacourtia, Flacourtie.

1. Fl. Ramontchi. Pers. l. c. 1. p. 628. Geniefsbare Flacourtie. Zu Madagascar. — . VV. H. 5.

POLYANDRIA.

851. Cliffortia, Cliffortie.

1. Cl. ilioifolia. Pers. l. c. 2. p. 629. Hülsenblättrige Cliffortie. Am Cap. May — Aug. Ch. 5.

852. Cycas, Sagopalme.

- 1. C. circinalis. Pers. 1. c. 2. p. 631. Gemeine Sagopalme. In Ostind. . VV. H. h.
- 3. C. revoluta. Pers. l. c. Zurückgerollte Sagopalme. In Japan u. China. — . W. H. t.

853. Zamia, Keulpalme.

1

- 1. Z. media. Pers. l. c. Mittlere Keulpalme. In Westind. Febr. — May. W. H. 5.
- 2. Z. integrifolia. Pers. l. c. Ganzblättrige Keulpalme. In St. Domingo u. Ostflorida. Apr. May. W. H. b.
- 3. Z. longifolia. Pers. 1. c. Langblättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. Jun. Jul. W. H. h.
- 4. Z. lanuginosa. Pers. I.c. Wollige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. —. W. H. t.
- 5. Z. horrida Pers.l.c. Graublättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. —. W.H. b.

MONADELPHIA..

854. Latania, Sammetpalme.

1. L. rubra. Pers. l. c. Rothe Sammetpalme. Auf der St. Moritzinsel. - W. H. t.

2. L. chinensis. Jacq. fragm. bot. 1. p. 16. n. 58. t. 11. f. 1. Chinesische Sammetpalme. In China; cultivirt auf den Inseln Bourbon u. St. Moritz. —. VV. H. 5. L. borbonica. Pers. l. c.

855. Juniperus, Wachholder.

- 1. J. Sabina. Pers. 1. c. 2. p. 632. Stinkender Wachholder. In Portugali, Ital. u. Sibirien. May, Jun. 1m F. 5.
- 2. J. prostrata. Pers. l. c. Niederliegender Wachholder. In Nordamer. — K. H. b.
- 3. J. virginiana. Pers. 1. c. Virginischer Wachholder. In Virgin. u. Carolina. Apr. May. 1m F. 5.
- 4. J. communis. Pers. l. c. Gemeiner Wachholder. In Wäldern des nördlicher. Eur. Apr. Im F. b.
- 5. J. Oxycedrus. Pers. l. c. Spanischer Wachholder. In Span. Languedoc u. Griechenland, May. Im F. 5.
- 6. J. tamariscifolia. Cat. hort. bot. mouachiens. p. 28. Tamariskenblättriger Wachholder. K. H. 5.
- 7. J. phoenicea. Pers. l. c. Dichtnadliger Wachholder. In Südenr. u. im Orient. — K. H. b.

856. Taxus, Taxus.

1. T. baccata, Pers. 1. c. Gemeiner Taxus. In Eur. u. Sibirien. März. Im F. h. B. folüs variegatis, Mit gesteckten Blättern.

857. Ephedra, Meerträubel.

- 1. E. distackya. Pers. l. c. 2. p. 683. Europäischer Meerträubel. In Südfrankr. Span. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. h.
- 2. E. monostachya. Pers. 1. c. Sibirischer Meerträubel. In Sibirien u. Ungarn auf trockenen sonnigen Bergen, Jun. Jul. K. H. h.

858. Cissampelos, Grieswurz.

1. C. smilacina. Pers. 1. c. 2. p. 634. Eckige Grieswarz. In Carolina. —. K. H. b.

859. Adelia, Adelia.

- 1. A. Acidoton, Pers. 1. c. 2, p. 635. Dornige Adelie. In Jamaica. —. W. H. t.:
- 2. A. ovata. Pers. l. c. Eyförmige Adelie. In Nordamer. — K. H. h.
- 3. A. myrtifolia. Catal. hort. carlsruhan. p. 5. Myrthenblättrige Adelie. In Nordamer. . K. H. b.

860. Ruscus, Mäusedorn.

- 1. R. aculeatus. Pers. 1. o. 2. p. 636. Stechender Mäusedorn. In Südeur. Jun. Jul. Im F. h.
- 2. R. Hypophyllum. Pers. 1. c. Breitblättriger Mäusedorn. An den Rändern der Hügel in Italien. Jun. Jul. K. H. 2.
- 3. Hypoglossum. Pers. 1. c. Zungen Mäuse-dorn. Auf Bergen in Ungarn u. dem Genuesi-schen. Jun. Jul. K. H. 24.

4. R. racemosus. Pers. l. c. Tranben-Mäusedorn. Auf den Archipelagischen Inseln. Jun. Jul. K. H. b.

GYNANDRIA.

861. Cluytia, Cluytie.

- 1. Cl. daphnoides. Pers. l. c. Seidelbastblätetrige Cluytie. Am Cap. —. Ch. 5.
- 2. Cl. polifolia. Pers. l. c. Poley blättrige Claytie. Am Cap. März Aug. Ch. 5.
- 3. Cl. pulchella. Pers. l. c. Gemeine Cluytie. Am Cap. Febr. Aug. Ch. 5.

CLASSIS XXII.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

862. Acrostichum, Staubfarrn.

1. A. calomelanos. Lin. sp.pl.p.1529. Schwarzstrunkiger Staubfarrn. Zu Jamaica, Hispaniola u. Gujana. W. H. 4.

863. Hemionitis, Netzfarrn.

1. H. dealbata. Willd. hort. berol. 1. p. 40. t. 40. Weissblättriger Netzfarre. In Südamer. Jamaica, Peru u. Chili. W. H. 24.

864. Polypodium, Engelsüls.

- 1. P. crassifolium. Lin. sp. pl. p. 1543. Dickblättriger Engelsüs. In Jamaica, Hispaniola u. zu Lima, W. H. 4.
- 4. P. phymatodes. Lin. mant. 306. Warziger Engelsüfs. In Ostind. W. H. 24.
- 3. P. aureum. Lin. sp. pl. p. 1546. Goldner Engelsus. In Westind. VV. H. 2.
- 4. P. vulgare. Lin. sp. pl. p. 1544. Gemeiner Engelsüßs. In Eur. u. Nordamer. zwischen Felsenritzen a. auf Bäumen. Im F. 4.

B. cambricum. Mit geschlitzten Lappen.

5. P. Phegopteris. Lin. sp. pl. n. 1550; Buchen - Engelsüfs. In Wäldern v. Eur. Im F. 24.

865. Aspidium, Wurmfarru.

- 1. A. trifoliatum. Swartz synops. filic. 43. Gedreiter Wurmfarrn. In Hispaniola, Jamaica u. Martinique. W. H. 4.. Polypodium tritoliatum. Lin. sp. pl. p. 1547.
- 2. A. Lenchitis. Swartz l. c. Buchtenfarmartiger Wurmfarm. Auf Alpen u. Bergen in Schweden, Norwegen, der Schweiz, Ital England u. Frankr. Im F. 24.
 Polypodium Lonchitis. Lin. sp. pl. p. 1548.
- 3. A. molle. Swartz 1. c. 49. Weicher Wurmfarrn. In Caracas. W. H. 24. Polypodium molle. Jacq. ic. rar. 3. t. 640. Collect. 3. p. 188.

- 4. A. aculeatum. Swartz l. c. 53. Stachliger Wurmfarm. Auf Bergen v. Eur. Nordafru. am Cap. Im F. 21.
 Polypodium aculeat. Lin. sp. pl. p. 1552.
- 5. A. Filix mas. Swartzl. o. 55. Gebräuchliger Wurmfarrn. In Eur. Nordasien u. Nordafr. Im F. 24.

 Polypodium Filix mas. Lin. sp. pl. p. 1551.
- 6. A. bulbiferum. Swartz l. c. 29. Zwiebeltragender Wurmfarrn. In Canada, K. H. 24. Polypodium bulbiferum. Lin. sp. pl. p. 1553.
- 7. A. Filix femina. Swartz l. c. 59. Falscher Wurmfarrn. In Eur. Im F. 24.
 Polypodium Filix femina. Lin. sp. pl. p. 1551.
- ger Wurmfarrn. In Eur. Ki H. 24. Polypodium fragile. Lim. sp. pl. p. 1553.

Nebst einer noch unbestimmten Wurmfarrnart.

866. Struthiopteris, Straussfarrn.

1. St. germanica. Willd. enum. 2. p. 1071. Deutscher Straussfarrn. In Deutschl. Ungarn, der Schweiz, Russland u. der Insel Sceland bey Norwegen. Im F. 4.
Osmunda Struthiopt. Lin. sp. pl. p. 1522.
Onoclea Struthiopt. Swartz synops. filic. 131.

867. Asplenium, Streifenfarrn.

1. A. septentrionale. Swartz l. c. 75. Nördlicher Streifenfarm, In Felsenritzen v. Eur. Im F. 4.

- e. A. marinum. Lin. sp. pl. p. 1540. Meerstrands-Streifenfarrn. Auf Meeresfelsen in England, Spanien, der Barbarey u. den Canarischen Inseln. K. H. 24.
- 3. A. Trichomanes. Lin. l. c. Wiederthon-Streisenfaren. In Felsenritzen v. Eur. u. dem Ozient. Im F. 24.
- 4. A. viride. Swartz 1. c. 80. Grünstrunkiger Streifenfarrn. Auf Felsen in Deutschl. Oesterr. Salzb. der Schweiz, England. u. Frankr. Im F. 2.
- 5. A. praemorsum. Swartz prod. 13. Abgebissener Streifenfarm. Auf waldigen Bergen in Jamaica u. Caracas. W. H. 24.
- 6, A. Ruta muraria. Lin.sp.pl.p.1541. Mauer-Streffenfarrn. Auf Mauern u. Felsen in Eur. Im F. 2.
- 7. A. Adiantum nigrum. Lin. sp. pl. p. 1541. Schwarzer Streifenfarm. In Felsenritzen v. Deutschl. der Schweiz, Ital. Frankr. Engl. z. Spanien. Im F. 4.

868. Scolopendrium, Hirschzunge.

1. Se. officinarum. Swartz synops. filic. 89. Gemeine Hirschzunge. An schattigen Oertern in Eur. Im F. 24.

Asplenium Scolopendrium. Lin. sp. pl. p. 1537.

B. dedaleum. Mit verworrenen Blättern.

869. Pteris, Saumfarrn.

1. Pt. longifolia, Lin. sp. pl. p. 1531. Langblättriger Saumfarrn. In Jamaica u. Hispaniola. VV. H. 24.

- 2. Pt. serrulata. Lin. suppl. 443. Gesägter Saumfarrn. In Japan, China u. Ceylon. W. H. 4.
- 3. Pt. cretica. Lin. mant. 130. Candischer Saumfarrn. In der Schweiz, Ital. Corsica, Candien u. Arabien. K. H. 4.
- 4. Pt. atropurpurea. Lin. sp. pl. p. 1534. Schwarzrother Saumfarrn. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. K. H. 4.
- 5. Pt. aquilina. Lin. sp. pl. p. 1533. Adler-Saumfarrn. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Asien u. America. Jun. Jul. Im F. 24.
- 6. Pt. elegans. Jacq. fragm. bot. p. 74. n. 223. t. 116. Schöner Saumfarrn. Am Cap. Ch. 4.

870. Blechnum, Rippenfarrn.

- 1. Bl. boreale. Swartz synops. silic. 115. Nördlicher Rippenfarm. An feuchten Stellen in Nord-u. auf Alpen im südlicher Eur. ingleichen auf den Canarischen Inseln. Im F. 24. Osmunda Spicant: Lin. sp. pl. 1522.
- 2. Bl. occidentale. Lin. I, c. 1534. Westlicher Rippenfarrn, In Westind. u. andern Gegenden des wärmer. Amer. W.H. 4.

871. Woodwardia, Woodwardie.

1. W. radicars. Swartz synops. filic. 117. Wurzelnde Woodwardie. In Ital. Portugall, 21 Madera u. Teneriffa K. H. 4. Blechnum radicans. Lin. mant. 307.

872. Adiantum, Krullfarrn.

- 1. A. reniforme. Lin. sp. pl.p. 1556. Nierenförmiger Krullfarrn. Zu Madera n. Teneriffa. K. H. 24.
- 2. A. pedatum. Lin. sp. pl. p. 1557. Fulsförmiger Krulifarrn. In Canada, Virgin. u. Pensylvan. K. H. 24.
- 3. A. Capillus veneris. Lin. sp. pl. p. 1558. Frauenhaar Krullfarrn. Auf Felsen in Oesterr. Bayern, der Schweiz, Ital. Engl. Span. Frankr. Teneriffa, Jamaica, Südamer. u. Bourbom K.H. 2.

873. Davallia, Davallie.

1. D. canariensis. Swartz synops. filic. 134. Canarische Davallie. Auf den Canarischen Inseln u. in Portugall. K. H. 24. Trichomanes canariense. Lin. sp. pl. p. 1562.

REGISTER.

Α.			
	Seite		Seite
Abroma	268	Aesculus	133
Abrus	987	Aethusa	89
Acacia	278	Agapanthus	106
Acalypha	351		70
Acanthus	248	Agave	125
Acer	r36	Ageratum	302
Achania	276	Agrimonia	170
Achillea	322	Agrostemma	166
Achimenes sich]	re-	Ailanthus	343
viran a		Albuca	310
Achyranthes .	74	Aletris:	119
Aconitum	214	Aleurites .	352
Acorus	127	Allamanda	76
Acrostiehum `	372	· Allium	108
Actaea	206	Alnus	338
Acynos sieh Thy	nus	`Aloë	122
Adelia	371	Aloisia sieh Vet	bena
Adenanthera	149	Alpinia	3
Adiantum	377	Alstroemeria	126
Adonis ·	222	Althaea	271
Aegiphila	32	Alyssum	250
Aegopodium `	91	Amaranthus .	341
Aeschynomene	292	Amaryllis .	106
i i		Ambrosia -	341

•	- 3	79 - ~ .	
	Seite		Seite
Amirola	342	Arduin a	76
Amomum		Arenaria	160
Amorpha	286	Argemone	207-
Amygdalus	182	Aristolochia	33 5
Amyris	36	Aristotelia	_ 170
Anagallis	46	Armeniaca siel	Pru-
Anagyris	146	nus	
Anchusa	_ 39	Armeria	. 96
	Pogo-	Arnica	317
nia	۱	Arnopogon	296
Andromeda	153	Aronia sieh M	espi-
Andropogon	.28	lus et Pyrus	
Androsace	43	Artemisia	305
Andryala	-98	Arum	347
Anemone	219	Arundo	27
Anethum	90	Asarum	168
Angelica	. 89	Asclepias	78
Anigosanthos	100	Asparagus	*14
Innona	218	Asphodelus	- 113
Anredera	86	Aspidium	373
Anthemis	323	Asplenium	374
Anthericum	113	Aater	311
Antholyza	19	Astragalus	294
Anthospermum	361	Astrantia	87
Anthyllis	286	Athamanta	. 88
Antidesma	363	Athanasia	304
Antierhinum	940	Atractylis sieh	Detck-
Apicra	120	heya	
Lpium	91	Atragene	219
Apocynum	78	Atraphaxis	129
Aponogeton	131	Atriplex	84
Aquilegia Aralia	215	Atropa	.58 ⁻
Arbutus	96	Aucuba Averhoa sieh C	337
Arctotheca	153		iotis
Arctotis	332	Axyris — D Azalea	
Ardisia	330 64	Asime sich Mo	. 54
	04	2x4////# 310M 1/10	n e cree

		٠.	Seite
В.	В.		109
		Bonplandia sieh Cal-	
		dasia	• >
Baccharis	Seite	Bontia	244
	308	Borago	. 41
Bactyrilobium	148	Borya	359
Balsamita	`305	Bosea	86
Bambos sieh Bar	nbu-	Bromelia	101
_ 82	•	Broussonetia	361
Bambusa	129	Browallia	244
Banisteria	161	Brownea	258
Banksia	29	Brucea	361
Barleria	248	Brunia -	69
Bartsia	239	Brunsfelsia	245
Basella	9 5	Bryonia .	356
Bauhinia	146	Bubon	89
Begonia	342	Bubroma sieh	_
Bellis .	320	zuma	
Berberis	127	Buchnera sieh	Ma.
Berckheya	328	nulea	71700-
Besleria	244	Buddleja	-00
Beta .	85	Bulbine	32 113
Betonica	229	Bumelia	66
Betula	345		
Bidens	300	Buphthalmum	. 324
Bignonia	245	Bupleurum	87
Billardiera	70	Butomus	145
Biscutella "	250	Buttneria	· 75
Bistropogon	227	Buxus	33 8
Bixa	208	_	
Blechnum	376	C.	
Blitum	4	;	,
Bocconia	168	Cacalia	309
Boehmeria	340	Cactus	174
Boerhaavia	17	Caesalpinia	148
Boltonia	322	Caladium	347
Bombax	250	Calanchoë	143

	_	- 1	
	- 38	1	•
6.11 . **	Seite	'0.1.	Seite
Caldasia	50	Cedrela	70
Calendula Calla	330	Celastrus	. 68
Callicarpa	133	Celosia	74
Colomoria sish II.	32	Celsía C. leis	242
Calomeria sieh Hi	1- .	Celtis	84
mea Caltha		Centaurea	. 328
	224	Cephalanthus	30
Calycanthus Camellia	205	Ceratonia	364
Campanula	277 50	Ceratospermum si Diotis	
Camphorosma	36	Cerbera	, , , . , , , , , , , , , , , , , , , ,
Canarina	128	Cercis	76 146 •
Canella	168	Ceresia	26
Canna	100	Cerinthe	40
Cantus sieh Vestia	_	Cestrum	62
Capparis	205	Chaerophyllum	90
Capraria	244	Chamaerops	131
Capsicum.	62	Cheiranthus	251
Cardous	299	Chelidonium	206
Carica	367	Chelone	245
Carissa sieh Arduin	a	Chenopodium	85
Carlowizia	299	Chionanthus	7
Carolinea	269	Chironia	82
Carpinus	346	Chloranthus	36
Carthamus	2 98	Chloris	26
Carum	91	Chrysanthemum	320
Caryota	349	Chrysocoma	303
Cassia	147	Chrysophyllum	65
Cassiné	94	Cicca	338
Castanea	345	Cinneraria	31o
Casuarina Catananaha	335	Cissampelos	371
Cathantagan	, 298	Cissus	33
Cathartocarpus sie	h	Cistus	211
Bactyrilobium Caucalis		Citharexylum	236
	87	Citrus	210
Ceanothus	68	Claytonia	78
Cecropia	3 <i>57</i>	Clematis	220

•	Seite		Seite
Cleome	128	Cotula sieh Lidbe	
Clerodendrum	238	Cotyledon	16t
Clethra	154	Crambe	249
Cliffortia	369	Crassula	99
Clusia	209	Crataegus sieh Me	es-
Cluytia	372	pi lus	
Cneorum	1,8	Cremastostemon .	47
Cnicas	299	Crepis	298
Cobaca	49	Crescentia	245
Coccoloba	141	Crinum	105
Coffea	54	Crithmum	88
Coix	337	Crocus	19
Colchicum	131	Crotalaria	283
Collinsonia	15	Croton	352
Colutea	291	Cucubalus	158
Commelina	25	Cucumis	356
Comptonia	337	Cucurbita	355
Condalia	67	Cunila sich West	B-
Conium	87	ringia	
Convallaria	116	Cupressus	351
Convolvulus	47	Curcuma	3
Conyza	308	Cussonia	86
Corchorus	209	Cycas	369
Condia	42	Cyclamen	45
Coreopsis	327	Cydonia	189
Coreopsis Coriaria	368	Cymbidium	334
Cornus	34	Cynanchum	78
Cornutia	237	Cynoglossum	39
Coronilla	1 292	Cynosurus sieh El	eu-
Correa	137	sine	
Cortusa	44	Cyperas	25
Corydalis ·	282	Cypripedium _	3 35
Corvius	344	Cyrilla sich Tre	vi-
Corypha	127	rana	
Cosmea	326	Cyrtanthus	106
Cosmus sieh Cos	mea	Cytisus	289
Costna	•	•	- •

•

E

D

•	c		
Darradi A	Seit e		· Beile
Dahlia sieh Geor	gina .	Echinops	333
Daphne	139	Echites	. 77
Datisca	3 68	Echium	41
Datura	57	Eckebergia siel	Tri-
Davallia	377	· chilia	
Decumaria ·	168	Ehretia	42
Delphinium	214	Elacagnus	36
Dentaria	251	- Elacodendrum	67
Desmanthus	278	Elephantopu s	333
Dianella	115	Eleusine	26
Dianthus	157	Elichrysum	307
Dichondra	. 83	Ellisia	43
Dictamnus .	150	Embothrium	30
Diervilla	56	Empetrum	359
Digitalis	242	Encelia sieh Pall	lasia
Dillenia 🔍	217	Ephedra	371
Dioscorea	364	Epidendrum	334
Diosma	69	Epilobium	135
Diospyros	3 6 6	Epimedium	34
Diotis	339		ieh
Disándra	132	Ruellia	
Dodecatheon	45		27
Dodonaca	136		138
Dolichos	287	Erigeron	309
Dombeya	269	Eriocephalus	333
Doronicum	317	Eriospermum	111
Dorstenia	340	Erodium	25 8
Dracaena	115	Eryngium	86
Dracocephalum	232	Erythrina	283
Dracontium	133	Eucalyptus	181
Drimia	117	Euclea	368
Dryas	204	Eucomis	109
Duranta	204	Engenia	180

Eupatorium, 302 Geum 204 Eupatorium, 170 Ginkgo sieh Salisbroom 170 Ginkgo sieh Salisbroom 170 Ginkgo sieh Salisbroom 170 Glaucium 206 Exarum 33 Gladiolus 19 Glaucium 206 Gleditschia 365 Globularia 30 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloriosa 247 Fagara 35 Glycine 287 Fagus 340 Glycirrhiaa 291 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guiana 70 Frankenia 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Griajacum 149 Guizuma 268 Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 Galanthus Galega 294 Gardenia 53 Halesia 208
Euphorbia Evonymus Evonymus Exacum The street of the stre
Evonymus Exacum Say Gladiolus Glaucium Glaucium Glaucium Gladitschia Gleditschia Globularia Gloriosa Fagara Fagara Fagara Fagars Ferraria Ferraria Ferrula Ferrula Ferrula Fous Fontanesia Fontanesia Fothergilla Fragaria Fragaria Fragaria Frashenia Fritillaria Fritillaria Frichesia Fritillaria Frichesia Fritillaria Fous Frakenia Fritillaria Fous Fritillaria Fous Fous Frakenia Fous Fritillaria Fous Fous Fous Fous Fous Fous Fous Fous
Exerum 33 Gladiolus 19 Glaucium 206 Glaucium 206 Glaucium 30 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloriosa 247 Fagara 35 Glycine 287 Fagus 340 Glycirrhiaa 291 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Frakinus 358 Fritillaria 109 Grewia 208 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Fritill
F. Glaucium 66 Gleditschia 365 Globularia 30 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloriosa 247 Fagara 35 Glycine 287 Fagus 340 Glycirrhiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 367 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankeniá 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Gruajacum 149 Fruchsia 109 Guazuma 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Frumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 203 Gardenia 203 Gardenia 203 Guarata 268 Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157
F. Gleditschia Globularia 30 Gloriosa 110 Gloriosa 127 Gloriosa 127 Gloriosa 247 Gloriosa 247 Fagara 35 Glycine 2287 Fagus 340 Glycirehiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Guazuma 268 Frichsia 135 Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 294 Gardenia 53 Halesia 208
Fabricia 178 Globularia 30 Gloriosa 110 Gloriosa 110 Gloxinia 247 Fagara 35 Glycine 287 Fagus 340 Glycire 287 Fagus 340 Glycirrhiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 327 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gordenia 327 Fothergilla 213 Goosypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fraxinus 358 Graajacum 249 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Hakea 29 Gardenia 53 Halesia 768
Fabricia 178 Gloriosa 110 Fagara 35 Gloxinia 247 Fagara 35 Gloxinia 247 Fagus 340 Glycine 287 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fottanesia 7 Gorteria 327 Fotthergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 803 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guilandina 316 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fritillaria 109 Guazuma 149 Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Gardenia 53 Halesia 268
Fabricia 178 Gloxinia 247 Fagara 35 Glycine 287 Fagus 340 Glycirrhiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Fraxinus 358 Guiajacum 149 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 208 Fritillaria 109 Grewia 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Gardenia 53 Halesia 208
Fagus 340 Glycine 287 Fagus 340 Glycirrhiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 367 Ferrula 68 Gnidia 140 Ficus 359 Goodenia 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Fraxinus 358 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Frachia 129 Fruchsia 109 Fuchsia 135 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Halasia 768
Fagus 340 Glycirrhiza 291 Ferraria 253 Gnaphalium 307 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 149 Fritillaria 109 Grazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Halasia 768
Ferraria 253 Gnaphalium 3e7 Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Goodenia 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Goorteria 327 Fothergilla 213 Goosypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fruchsia 109 Guazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 208
Ferrula 88 Gnidia 140 Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Goodenia 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 803 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fraxinus 358 Guajacum 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 208
Ficus 359 Gomphrena 73 Flacourtia 368 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 303 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guiajacum 249 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Frumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. Galanthus Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Gardenia 568
Flacourtia 36 8 Goodenia 52 Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 149 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Gardenia 768
Fontanesia 7 Gorteria 327 Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fuchsia 135 Guilandina sich Fumaria sich Corydalis Gypsophila 157 G. Galanthus 104 Galaxia sich Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 208
Fothergilla 213 Gossypium 274 Fragaria 203 Gouania 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 249 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fuchsia 135 Guilandina sich Fumaria sich Corydalis Gypsophila 157 G. Galanthus 104 Galaxia sich Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 208
Frankenia 129 Grewia 70 Frankenia 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 268 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fuchsia 135 Guazuma 268 Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 2968
Frankeniá 129 Grewia 208 Fraxinus 358 Guajacum 149 Fritillaria 109 Guazuma 268 Fuchsia 135 Guilandina sieh Fumaria sieh Corydalis Gypsophila 157 G. Galanthus Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Halesia 768
Fraxinus Fritillaria Fritillaria Fuchsia Fuchsia Fumaria sieh Corydalis Galanthus Galanthus Galaxia sieh Ixia Galega Gardenia Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 H. Haemanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 157 Haemanthus 103 Hakea 29 Hakea 29 Halesia 168
Fritillaria 109 Fuchsia 135 Guazuma 268 Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Halesia 268
Fuchsia Fumaria sieh Corydalis Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus Galaxia sieh Ixia Galega Gardenia 53 Hakea 29 Hakea 29 Halesia 29 Halesia
Galanthus Galega Gardenia Galas Galanthus Galega Gardenia Galas Moringa et Gymnocladus Gypsophila 157 H. Haemanthus Face 194 Hakea 29 Halesia 268
dalis nocladus Gypsophila 157 G. H. Galanthus 104 Galaxia sich Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29
Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Haemanthus 203 Hakea 29 Halasia 268
Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Haemanthus 203 Hakea 29 Halesia 268
Galanthus 104 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Haemanthus 103 Hakea 29 Halasia 268
Galanthus ro4 Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Halesia 29 Halesia 268
Galaxia sieh Ixia Galega 294 Gardenia 53 Hakea 29 Halesia 268
Galega 294 Haemannus 103 Gardenia 53 Halesia 268
Galega 294 Hakea 29 Gardenia 53 Halesia 768
Gardenia 53 Halesia 268
Gaura 135 TT 11 min
Genista 285 Haloragie 143
Gentiana Uamamalit 37
Georgina 318 Hamallia 52
Geranium 200 Hannahin 242
Gesneria 247 Harrachia

	Seite	•	Seite
Hebenstreitia	238	Hostana sieh	Cor-
Hedera	. 71	. nutia	•
Hedychium	2	Houstonia	91
Hedysarum	293	Humea	301
Helenium	325	Humulus	364
Helianthemum	212	Hura	353
Helianthus	`3 ² 5	Hyacinthus	117
	sieh	Hydrangea	155
Elichrysum		Hydrophyllum	43
Heliconia	75	Hymenaea	147
Helicteris	268	Hyosciamus	- 57
Heliocarpus	169	Hyperanthera	sieh
Heliotropium	38	Moringa	
Helieborus	223	Hypericum	216
Hemerocallis	126	Hypoxis.	111
Hemimeris	\$42	Hyssopus	225
Hemionitis	372	•	•
Hepatica	218	I.	
Heracleum	88	•	
Heritiera	3 55	Tagaminia	×-
Hermannia	254	Jacquinia Jasminum	65
Hernandia	337		<i>5</i> 35 °
Hesperis	252	Jatropha Iberis	
Heuchera	8 3	Ilex	, 249
Hibiscus	274	Illecebrum	37
Hieracium	297		74
Hippia	332	Impatiens	73
Hippocrepis	298	Imperatoria	90
Hippomane	353	Indigofera	293 277
Hippophaë	362	Inga Inula	316
Hoffmanseggia	148		48
Homalium	214	Ipomoea Iris	23
Horminum	932	Isatis	95 0
Hortensia sich	Hy-		*30 \$2 5
drangea	•	Isopyrum Itea	47
Hosta sieh Her		Juglans	343
rocallis et Co	rnutia	a ng rama	37 3

	Seite		Seite
Inches	370	Lavandula	226
Juniperus	10	Lavatera	272
Justicia Iva	38 3	Ledum	1,52
Iva Ixia	3120 81	Leea	65
	32	Leptospermum	178
Ixora	-به	Lespedeza sich I	le-
37	** gra	dysarum	
K.		Leucoium	104
	•	Lidbeckia	321
Kaempferia	3	Ligusticum	. 88
Kalmia	151	Ligustrum!	6
Kennedia sieh	Gły-	Lilium	109
cine	100	Limodorum	335
Kiggellaria	367	Limonia	150
Killingia	25	Linaria	239
Kitaibelia	278	Linum	98
Knautia	31	Liunidambar	346
Koelreuteria	135	Liquiritia sieh	aly-
Kookia	. 150	cirrhiza	
•	•	Liriodendron	217
L.		Lithospermum .	39
1		Lobelia	253
Lachenalia	118	Lomandra	129
Lachnaea	140	Lomatophyllum	120
Lagerstroemia	210	Lonicera	55
Lagunaea	276	Lopecia	.4
Lamium	228	Lotus	296
Lancisia sich	Lid-	Ludia .	240
beckia		Lunaria	251
Lantana	235	Lupinus	, 286
Lurochea sieh		Lychnis	167
sula		Lycium	43
Laserpitium	88	Lycopsis	44
Latania	369	Lycopus	1.3
Lathyrus,	··· 288	Lysimachia	46
Laurus	143	Lythrum	169

ı

Seite

Seite

M.

Macrocnemum	53	Metrosideros	179
Madia	309	Meum sieh Aethi	188
Magnolia	217	Mikania	302
Mahernia	256	Mimosa	278
Malachra ·	271	Mimulus	243
Malpighia	160	Mirabili s	47
Malva	271	Modecca	95
Mandragora	58	Moehringia .	141
Manglilla sieh Sc	le-	Moluccella	230
roxylon	•	Momordica.	355
Manulea	238	Monarda	18
Maranta	3	Monetia	35
Marrubium	229	Monsonia	268
Massonia	103	Moraea	22
Matricaria	371	Moringa	148
Maurandia	941	Moras	340
Medeola sieh M		Murraya	150
siphyllum	-	Musa	101
Medicago	296	Muscari'	117
Melaleuca	179	Myosotis	38
Melastoma	151	Myrica	362
Melia	151	Myrsine	64
Melianthus	248	Myrsiphyllum	13 L
Melicocca	1 35	Myrtu s	181
Melissa	232	N.	
Melittis	232	17.	
Melochia	256	Napasa sieh Sida	
Menispermum	368	Narcis sus	104
Mentha	227	Nemesia	240
Mentzelia	209	Nepe ta	226
Menyanthes	45	Nerium	77
Mesembrianthemy		Nicandra	59
Mespilus	r85	Nicotiana	57
Messerschmidia	41	Nîgella .	215
	7-		

1	Seite		Seite
Nissolia	283	Paeonia	213
Nolana		Pallasia .	327
Nymphaea	207	Panax	86
z.y.mp		Pancratium	105
Ο.		Pandanus	357
•		Panicum	26
Ochrosia	75	Papaver	207
Ocymum	233·	Parietaria 🐪	340
Oenothera .	134	Parkinsonia	148
Olea	. 6	Parnassia	96
Onoclea sieh.	Stru-	Pascalia	324
thiopteris		Paspalum sieh	Cere-
Ononis	285	sia	
Onosma	41	Passerina	140
Ophi oxylon s	ieh O- '	Passillora	256
chrosia		Pastinaca	90
Origanum	230	Paullinia	142
Ornithogalum	111	Pavonia	276
Ornus sieh Fra	ixinus	Pelargonium	259
Orobus -	288	Peltaria	250.
Orontium _	127		269
Orontium sieh	An-	Pentstemon	245
tìr r hinum		Pentzia	305
Oryza	1.29	Perilla	228
Osmunda sieh	Stru-	Periphragmos	sieh .
thiopteris et	Blech-	Vestia	•
num		Periploca	78
Osteospermum	332	Petiveria	132
Ostrya	346	Phalangium s	
Osyris	3 59	. Anthericum	-
Othonna	- 332	Phalaris	26
Oxalis _	163		178
•		Phillyrea	6.
Ρ,		Phlomis	230
Packaran Jan		Phlor	49
Pachysandra Paederia	· 3 39	Phoenix	36 . 5
a accerra	54		

:

•

•			٠.
•			
	- 3	89 🖚	•
200	Seite		Seite
Phormium	118	Portulaca	169
Phylica	69	Portulacaria	96
Phyllanthus	353	Potentilla	203
Phyllis	86	Pothos	35
Physalic	59	Prasium	234
Phyteuma	52	Prenanthea	893
Phytolacca	167	Primula	43
Pictamnia	. 363	.Prinos	. 128
Picridium sich So		Priva	235
chus	•	Protea	28
Pinus	349	Prunella	234
Piper	15-	Prunus	182
Piqueria		- Psiadia	309
Pisonia	131	Psidium	180
Pistacia	363	Psoralea	295
Pitcairnia	102	Psychotria	- 54
Pittosporum	. 70	Ptelea	3 ₅
Planera	84	Pteris	375
Plantago	33	Pulmonaria	40
Platanus	346	Pulsatilla	218
Plectranthus	233	Punica -	182
Plinia sieh Eugeni	B	Pyrola -	154
Plumbago	47	Pyrethrum	320
Plumeria	77	Pyrus	187
Podalyria	146	- ,	,
Podocarpus	351	•	
Pogonia	64	V.	•
Polemonium	49		1
Polyanthes	116	Quercus	343
Polygala	282	, .	• *
Polygonum	141	R.	
Polymnia	330		
Polypodium	373	Rafnia	283
Pontederia	102	Randia sieh Gar	denia
Populus	365	Rannnculus	\$22
Porcelia sieh Anno		Ranwolfia	75
	•	Renealmia	2

, `

. **v** .

		•	Seite
В.		Bonapartea	109
		Bonplandia sieh Cal-	
		dasia	• `
The L	Seite	Bontia	244
Baccharis	308	Borago	. 41
Bactyrilobium	148	Borya	359
Balsamita	`305	Bosea	86
Bambos sieh Bambu-		Bromelia	101
_ sa ·		Broussonetia	361
Bambusa	129	BrowaHia	244
Banisteria	161	Brownea	258
Banksia	29	Brucea	361
Barleria	\$48	Brunia -	69
Bartsia	239		245
Basella	95	Brunsfelsia	
Bauhinia	146	Bryonia	35 6
Begonia	342	Bubon	S-4 89
Bellis	320	Bubroma sieh	Cruz-
Berberis	127	zuma	35-
Berckheya	328	Buchnera sieh	Ma-
Besleria	244	nulea	
Beta	85	Buddleja	32
Betonica	229	Balbine	113
Betula	345	Bumelia	66
Bidens	300	Buphthalmum	. 324
Bignonia	300	Bupleurum	87
Billardiera	245	Butomus	145
Biscutella	70	Buttneria .	· 75
	250	Buxus	53 8
Bistropogon Bixa	227	•	
	208	C.	
Blechnum Blitum	376	j.	
	. 4	α (1)	,
Bocconia	168	Cácalia	300
Boehmeria	340	Cactus	174
Boerhaavia	17	Caesalpinia	148
Boltonia	392	Caladium	347
Bombax	gho	Calanchoë	142

	Seite		Seite
Caldasia	50	Cedrela	70
Calendula	-830	Celastrus	. 68
Calla	133	Celosia	74
Callicarpa	32	Celsia	242
Calomeria sieh Hu-		Celtis	. 84
mea		Centaurea .	. 328
Caltha	224	Cephalanthus	30
Calycanthus	205	Ceratonia	· 364 .
Camellia	277	Ceratospermum sieh 🕟	
Campanula	5 0	Diotis	3
Camphorosma .	- 36	Cerbera	76
Canarina	128	Cercis	146
Canella .	168	Ceresia	ક્ષ્
Canna	1	Cerinthe	40
Cantus sieh Vesti	ia	Cestrum	62
Capparis	205	Chaerophyllum	90
Capraria	244	Chamaerops	131
Capsicum.	62	Cheiranthus	251
Cardans	293	Chelidonium	206
Carica	367	Chelone	245
Carissa sieh Arduina		Chenopodium	85
Carlowizia	299	Chionanthus	7
Carolinea	269	Chironia	82
Carpinus ·	346	Chloranthus	36
Carthamus	e 98	Chloris	26
Carum	91	Chrysanthemum	320
Caryota	349	Chrysocoma	3 03
Cassia	147	Chrysophyllum	65
Cassine	94	Cicea	338
Castanea	345	Cinneraria	310
Casuarina	336	Cissampelos	371
Catananche	. , 298	Cissus	33
Cathartocarpus sieh		Cistus	. 211
Bactyrilobium		Citharexylum	236
Caucalis	87	Citrus	210
Ceanothus	68	Claytonia	78
Cecropia	357	Clematis	220

	Seite		Seite
Cleome	128	Cotula sieh Lidbeckia	
Clerodendrum	238	Cotyledon	16 t
Clethra	154	Crambe	249
Cliffortia	369	Crassula	99
Clusia	209	Crataegus sieh Mes-	
Cluytia	372	pil us	
Uneorum	1,8	Cremastostemon .	47
Cnicas	299	Crepis	298
Cobaca	49	Crescentia	245
Coccoloba	141	Crinum	105
Coffea	54	Crithmum	88
Coix	337	Crocus	19
Colchicum	131	Crotalaria	283
Collinsonia	25	Croton	352
Colutea	2 91	Cucubalus ·	158
Commelina .	25	Cucumis	356
Comptonia	337	Cucurbita	35 5
Condalia	67	Cunila sieh Weste-	
Conium	87	ringia	
Convallaria	116	Cupressus	351
Convolvulus	47	Curcuma	3.
Conyza	308	Cussonia	86
Corchorus	209	Cycas .	369
Coedia	42	Cyclamen	45
Coreopsis Coriaria	327	Cydonia .	189
Coriaria	368	Cymbidium	334
Cornus	34	Cynanchum	78
Cornutia	2 37	Cynoglossum	39
Coronilla	1 292	Cynosurus sich Lieu-	
Correa	137	_ sine	_
Cortusa	44	Cyperas	25
Corydalis	282	Cypripedium	ຸ გ 35 .
Corvius	344	Cyrilla sich Tres	7 1 -
Corvoha	127	rana	
Cosmea	326	Cyrtanthus	105
Cosmus sieh Cosmea		Cytisus	289
Castus	•		

E

	C		
Dallianish Com	Seite	*	• Beite
Dahlia sieh Geor	Aina	Echinops	333
. Daphne Datisca	139	Echites	· 77
Datura	368	Echium	41
Datura Davallia	. 57	Echebergia sieh Tri-	
Decumaria.	377	chilia	× '.
Decumaria.	168	Ehretia	42
Delphinium Dentaria	214	Elacagnus	36
Desmanthus	251	Elacodendrum	67
Dianella	278	Elephantopus	333
Dianthus	115	Eleusine	26
Dichondra	157	Elichrysum	307
	83	Ellisia	43
Dictamnus	150		3ø
Diervilla	56	Empetrum	359
Digitalis	242	Encelia sich Pallasia	
Dillenia Dillenia	217	Ephedra	371
Dioscorea	-364	Epidendrum	334
Diosma Di	69	Epilobium	135
Diospyros	36 6	E pimedium	34
Diotis	339		sieh
Disandra	132	Ruelli a	
Dodecatheon	45		27
Dodonaea	136	Erica	138
Dolichos	287	Erigeron	309
Dombeya	` 269	Eriocephalus	333
Doronicum	317	Eriospermum	111
Dorstenia	340	Erodium	258
Dracaena	115	Eryngium	86
Dracocephalum.	232	Ervthrina	283
.Dracontium	133	Eucalyptus	181
·Drimia	117	Euclea	368
Dryas	204	Eucomis	109
Duranta	226	Engenia	100

ZUSÄTZE.

Jasminum, Jasmin. (Diandr, Monogyn.)

1. J. mauritianum. Desfant, Cat., harti bot. paris, p. 53. Moritzischer Jasmin. Auf dar St. Moritzinsel- -. VV. H. b.

Justicia, Justicie.

1. J. kystopifolia. Pers. syn. pl. (12 p. 12. Isoppblättrige Justicie. Auf den Canarischen Inseln. –. Ch. 5.

Salvia, Salbey.

- 1. S. indica. Pers. 1. c. 1. p. 26. Indische Salbey. In Ostindien. Apr. May. W. H. 4. Campanula, Glockenblume, (Pentandr. Monogyn.).

Ribes, Johannisbeere.

1. R. Uva crispa, Pers. l. c. 1. p. 252. Glatte Johannisbeere. Im nördlichen Europa. Apr. May. Im F. h.

Pomaderis, Pomaderis.

1. P. apetula. Labiliardiere specim. Nov. Holl.
1. p. 62. t. 87. Blumenlose Pomaderis. Am Cap VanDiemen in Neuholland. — Ch. h.
Statice. Statice. (Pentandr. Pentagyn.)

1. St. graminifolia. Pers. l. c. 1. p. 334. Grasblättrige Statice. An der Wolga. Jun. — Aug. Im F. 24. 2. St. auricularfolia. Pers. 1. c. Aurikelblättrige Statice. Am Meerstrande der Barbarey. Jun.
— Aug. Im F. 24.
Lachenalia, Lachenalia. (Hexandr. Mo-

nogyn.)

1. L. orchioides. Pers. 1. c. 1. p. 376. Ragwurzartige Lachenalie. Am Cap. März. Ch. 24. Junous, Simse.

1. J. muximus. Pers. I. c. 1. p. 385. Größte Simse. Auf waldigen Bergen in Eur. Apr. May. Im F. 24. J. latifolius. Wulff. in Jacq. coll. 3. p. 59.

Melanthium, Schwarzblume. (Hexandr.

Trigyn.)

1. M. eucomoides. Pers. 1. c. 1. p. 397. SchopflilienartigeSchwarzblume. AmCap.—. Ch. 4. Rhapis, Rhapis.

1. Rh. flabelliformis. Ait. hort. kew. 3. p. 473. Flicherhlättrige Rhapis. In China u. Japan. Jun. Jal. VV. H. L.

Chamaerops excelsa, Pers. l. c. 1. p. 400.

Stammlose Rhapis. In Carolina u. Georgien. Jun. Jul. VV. H. h.
Sabal minor. Pers. l. c. 1. p. 399.
Corypha — Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8.
Chamaerops acaulis. Michaux fl. amer. 2. p. 207.
Cardiospermum, Herzsame. (Octandr.

Trigyn.)

1. C. Halicacahum, Pers. l. c. 1. p. 444.

Glatter Herzsame. In beyden Indien. Jun. — Aug.

VV. H. O.

Cafsia, Cafsie. (Decandr. Monogyn.)
1. C. mexicana. Pers. l. c. 1. p. 458. Mexicanische Cassie. In Mexico. Jun. Jul. VV, H. b.

Cadia, Cadie.

1. C. purpurea. Pers. 1. c. 1. p. 461. Rothe Cadie. Im glücklichen Arabien. —. W. H. b. Clerodendrum, Losbaum. (Didynam.

Angiosp.)

1. Cl. infortunatum. Pers. 1. c. 2. 145. Unglücklicher Losbaum. In Ostindien. — W.H. 5. Ruellia, Ruellie.

1. R. paniculata. Pers. l. c. 2. p. 177. Rispenblättrige Ruellie. Auf Hügeln in Südjamaica. Jun. — Aug. W. H. t. Pelargonium. Kranichschnabel. (Mo-

Pelargonium, Kranichsehnal nadelph. Heptandr.)

1. P. Tormane. Cat. horti carlsruh. p. 119. Tormansscher Kranichschnabel. — May, Jun. Ch. b.

2. P. Burmanni, Cujus? Burmann'scher Kra-

nichschnabel. - . May - Jul. Ch. 24.

3. P. formosissimum. Desfont. cat. horti paris. p. 141. Schönster Kranichschnabel. Am Cap. May — Jul. Ch. b.

4. P. formosum. Cat. horti hot. carlsruh. p. 118. Anmuthiger Kranichschnabel. — May —

Jul. Ch. 5.
5. P. superbum. Cujus? Herrlicher Kranicherschnabel. — May — Jul. Ch. 5.
Hedysarum, Hahnenkopf. (Diadelph.

Decandr.)

1. H. canescens. Pers 1. c. 2. p. 321. Graulicher Hahnenkopf. In Virginien. — K. H. 4. Alnus, Erle. (Monoecia Tetrandr.)

1. A. undulata. Pers. l. c. 2. p. 550. Wellenblättrige Erle. In Canada. Apr. Im F. 5. Betala crispa. Ait hort. kew. 3. p. 339.

Verbesserungen.

```
Seite
       Zeile
      letzte setze hinzu: Coll. 1. p. 143.
         9 zu Jacq ic. etc. setze: Collect. 4.p.117.
   3
         5 von unfen besonders statt hesonders.
   6
        13 lies: 16 statt 6.
   9
         5 von unten dentata st. dendata.
         6 von unten folgende st. folgenden.
  19
  22
         4 Nro. 4 ist überflüssig.
        15 Swertischer st. Schwertischer.
  23
  28
        11 folgende st. folgenden.
        13 übrige st. übrigen.
  29
         7 von unter folgende st. folgenden.
  29
  30
         3 Embothrium st. Embothryum.
       letzte 5 st. 2.
  33
  34
         5 24 st. 5.
         7 5 st. 24.
  34
         7 gefülltvioleter st. gefülltvioletter.
  44
  46
       letzte setze hinzu: May.
         4 von unten violeter st. violetter,
  48
         9 u. 11 Apr. st. Jun. Jul.
  50
       letzte persicifolia st. versicifolia.
  50
  51
        10 von unten nach Kftaib. pl.rar. setze hin-
           zu: 2. p. 65. t. 64.
  53
        13 Hamellia st. Hamelia.
 . 71
         4 setze hinzu: Oesterreichischen.
  76
        15 Apr. st. Jun. Jul.
         2 May st. Jun. Jul.
  95
  96
         3 von unten Grasnelk est. Armerie.
         o tige st. lige.
  97
         8 Ananasblättrige st. Ananasblätttrige.
 102
        10 Bogenlilie st. Bonlilie.
 106
         2 von unten Sibiriens st. Steyermarks.
 108
 110
         9 wildest. willde u. maialis st. mayalis.
        13 'lies: Nr.322 st.319 u.so fort bis an's Ende.
 120
         8 A. saponariast, Asaponaria.
 124
         3 von unten Eidechsenschwanz st. Eide-
           chenschwanz.
         , hispida st. hisvids.
 139
        13 West - indische st. We stindische.
 147
        10 Winkelblütbige st. Winkelblättrige.
 153
```

```
Zeile
Seite
        10 von unten nach Jacq. ic. rar. setze: 1.
 172
        12 fa-ckeldistel st. fa-keldistel.
 177
        11 flügelstielige st. fliegelstielige.
 197
        11 grandiflora st. graodiflora.
 103
 203
        10 von unten Spaltblätt. st Spaltelblätt.
         6 - Canada st. Cschnada.
 203
        13 Tormentille st. Tormentill.
 $04
         1 phoeniceum st. phoenicium
 207
         6 violetes st. violettes.
 207
        16 unterscheidenden st. unterscheidende.
 $15
 216
         2 Erdbeersame st. Erdbarsame.
           statt 117.
 217
         6 von unten zwischen Jun. u. F. setze Im.
 218
 920
        ro v. u.zwischen Nordamer. u. — setze: Jun-
 220
         4 von unten 24 st. b.
         á 24 st. VV.
 221
        16 März - May st. May.
 223
 216
         4 langgriffliger st. langrüfsliger.
 22R
        13 Pulegium st. pulegium.
 $28
         8 von unten Orvala st. onvala.
 228
         4 Berge st. Bergen.
 231
         z vor Steyermarksetze: In.
         4 sibiricum st. Sibiricum.
233
         5 von unten Angiospermia st. Angiosperma.
 224
         4 Jun. Aug. st. Jun. -, und 4 st. W.
 235
 236
         6 von unten oinereum st. cynereum.
 640
        12 v.unten nach Antirrhinum setze: Löwen-
          maul u. dem st. den.
        12 Apr. st. Jun. Jul.
 251
 274
         3 von unten Lampas st. Lampus.
        13 obliqua st: ogliqua.
 279
        17 M. st. A.
 280
         4 Carlowizia st. Carlovizia.
 299
         5 Isopp st. Ysopp.
 312
 331
        15 nach Aug. lies. Ch.
         7 v. unt. Gemeine Fichte st. Weiss- Tanne.
 350
 364
         3 von unten feinbehaarte st. feinbeharrte.
 373
        10 In st., zwischen.
 379
         4 von unten Averrhoa st. Averhoa.
 384 nach 9 v. unten setze : Gymnocladus Seite 367-
```



